



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**

**Алмагель® Т 500 мг**

Magaldrate  
таблетки

<b>СОГЛАСОВАНО</b> <b>МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</b> <b>РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</b> <b>Приказ Министерства здравоохранения</b> <b>Республики Беларусь</b> <b>от 14.01.2013 № 102</b>
--

**СОСТАВ:**

Действующее вещество в одной таблетке: Магалдрат 500 мг.

Вспомогательные вещества: маннитол, сорбитол, микрокристаллическая целлюлоза, магния стеарат.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА**

Круглые плоские белые таблетки с насечкой с одной стороны, диаметр 13 мм.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА**

АТС код A02AD02.

*Антациды. Комбинации и комплексы соединений алюминия, кальция и магния — магалдрат.*

Магалдрат представляет собой антацид, содержащий гидроксиды алюминия и магния. Нейтрализует повышенную кислотность желудка; подавляет активность фермента пепсина. Препятствует агрессивному воздействию желчных кислот на слизистую оболочку желудка. Препарат образует пленку на слизистой, усиливая, таким образом, ее защитное действие.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Симптоматическое лечение боли и повышенной кислотности желудка при:

- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
- остром и хроническом гастрите;
- эрозиях и язвах желудка и двенадцатиперстной кишки;
- неязвенной диспепсии;
- медикаментозных повреждениях слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки;
- раздражении слизистых (при изжоге, эпигастральной боли), после потребления раздражающей пищи и напитков.

**ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА**

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- Сверхчувствительность к магалдрату или сорбитолу;
- Почечная недостаточность, особенно у пациентов на гемодиализе из-за практической невозможности контролировать возрастающие концентрации алюминия и магния в сыворотке и риска достижения токсических концентраций.
- Гипофосфатемия
- Болезнь Альцгеймера
- Дети до 10 лет
- Первый триместр беременности.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ**

Если жалобы появляются ночью, Алмагель Т уместно принимать вечером перед сном. Следует избегать приема пищи, по крайней мере, 2 часа до сна.

Антациды оказывают влияние на всасывание других препаратов. Поэтому Алмагель Т и другие лекарственные средства следует принимать с интервалом не менее часа.

Во время лечения не рекомендуется прием алкоголя и кофеина, из-за уменьшения действия препарата. Лекарственный препарат содержит сорбитол, поэтому пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно проинформируйте об этом врача, а если лечитесь самостоятельно — проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом на счет возможности применения препарата.

Применение Алмагеля Т одновременно с тетрациклинами, фторидом натрия, дигоксином, бензодиазепинами, индометацином, циметидином, стероидами, препаратами железа, фенитоином, хинидином и валпроевой кислотой может уменьшить их всасывание в результате образования комплексных соединений.

**СОГЛАСОВАНО**

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Следует иметь в виду, что Алмагель Т усиливает антикоагулянтное действие дикумароловых препаратов при одновременном приеме.  
Приказ Министерства здравоохранения  
Беларусь

При одновременном применении с сердечными гликозидами и атропином препарат оказывает влияние на их всасывание. Поэтому их следует принимать за 1 – 2 часа до или после приема антацида.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

**Применение во время беременности и кормления грудью**

Назначение АЛМАГЕЛЬ Т в первом триместре беременности противопоказано. Не рекомендуется применение лекарственного средства у беременных женщин из-за отсутствия достаточного опыта клинического применения. Нет данных о тератогенном и эмбриотоксичном действии АЛМАГЕЛЬ Т. В период кормления грудью прием препарата возможен после оценки соотношения польза/риска.

**Управление транспортными средствами и работа с техникой**

Алмагель Т не влияет на способность вождения автомобиля и при работе с техникой, требующей повышенной осторожности.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

**Не разжевывать!**

Алмагель Т принимают внутрь по 1-2 таблетки при необходимости, не более 6 раз в сутки.

Дети старше 10 лет — по 1 таблетке 3 раза в день. Перед применением проконсультироваться с врачом.

При приеме натощак симптомы проходят через 30 до 60 минут. При приеме с пищей эффект длится около 2-3 часов.

Продолжительность лечения составляет 10-15 дней, после чего, если симптомы не проходят, уместно проконсультироваться с врачом.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Нет данных о передозировке препарата.

При подозрении на передозировку необходимо принять меры по снижению всасывания препарата через ЖКТ и проведения симптоматической терапии.

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

*В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо посоветоваться с врачом!*

При максимальной дозировке в редких случаях может вызвать диарею. В редких случаях возможны тошнота, рвота, жажда, изменение цвета кала, запор.

При длительном применении в высоких дозах возможно развитие гиперфосфатемии, гипокальциемии, остеомаляция, остеопороз, гиперкальциурия, гипермагнеземия, энцефалопатия, нефропатия, нефрокальциноз.

*С появлением этого нежелательного явления остановите применение препарата и незамедлительно обратитесь к врачу!*

**УПАКОВКА**

12 таблеток в блистере. 1 или 2 блистера в картонной пачке с листком вкладышем.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

**СРОК ГОДНОСТИ**

2 (два) года с даты выпуска.

Препарат не следует использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА**

Без рецепта.

**НАЗВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Балканфарма-Дупница АД

ул. Самоковское шоссе 3, 2600 Дупница, Болгария

Тел. (+359 701) 58 196

Факс: (+359 701) 58 555