



Инфлюцид

Капли для приема внутрь

Листок-вкладыш. Информация для пациентов

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните этот листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его снова. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Основные физико-химические свойства

Прозрачный раствор светло-желтого цвета, возможен зеленоватый оттенок.

Состав:

В 10 г раствора содержится:

Действующие вещества: Aconitum (аконит аптечный) D3 1 г, Gelsemium (гельземий вечнозеленый) D3 1 г, Ipecacuanha (ипекакуана) D3 1 г, Phosphorus (фосфор) D5 1 г, Bryonia (переступень двудомный) D2 1 г, Eupatorium perfoliatum (посконник пронзеннолистный) D1 1 г.
вспомогательные вещества: этиловый спирт 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

Фармакологические свойства

Инфлюцид представляет собой гомеопатическое комбинированное лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав. Инфлюцид применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний, в т.ч. сопровождающихся повышением температуры.

Фармакокинетика

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Показания к применению

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Традиционно применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний.

Противопоказания

Препарат противопоказан пациентам с реакцией гиперчувствительности к любому компоненту в составе препарата. Вследствие содержания спирта препарат Инфлюцид не следует применять в терапии пациентов, страдающих алкогольной зависимостью.

Меры предосторожности

Необходимо обратиться к врачу в случае сохранения высокой температуры тела или ее повышении до 39 °С, а также при отсутствии улучшения состояния или его ухудшении, при наличии неясных симптомов, при сохранении симптомов или появлении новых симптомов, так как может потребоваться назначение дополнительных обследований и другого лечения.

Инфлюцид содержит 46% (объемное соотношение) спирта. Возможны особые риски для пациентов, страдающих заболеваниями печени или эпилепсией, а также в период беременности и лактации. По той же причине Инфлюцид, капли для приема внутрь, не назначают детям возрастом до 12 лет.

Гомеопатические лекарственные средства не должны использоваться в течение длительного времени без консультации врача.

Информация о вспомогательных веществах

Инфлюцид содержит 46% (объемное соотношение) спирта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны. Вследствие содержания спирта возможно влияние на действие других лекарственных средств.

Следует уведомить лечащего врача или фармацевта о любых других лекарственных средствах, принимаемых Вами в настоящее время, принимавшихся недавно или планируемых к приему.

Применение в период беременности и лактации

В связи с отсутствием достаточных клинических данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием

В связи с содержанием этилового спирта прием лекарственного средства может оказать отрицательное влияние на способность управления транспортными средствами и работу с другими механизмами.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, Инфлюцид следует принимать следующим образом:

при острых симптомах заболевания: взрослым и детям старше 12 лет следует принимать каждые полчаса-час по 5 капель лекарственного средства (до 6 раз в сутки).

Увеличение суточной дозы и увеличение длительности приема более одной недели может осуществляться только после консультации с врачом. При уменьшении выраженности симптомов частота приема снижается – взрослым и детям старше 12 лет следует принимать по 5 капель лекарственного средства 1-3 раза в сутки. В дальнейшем по мере улучшения состояния частота приема снижается дополнительно.

Для обеспечения правильного дозирования лекарственного средства следует удерживать бутылку вертикально.

Следует принимать лекарственное средство за полчаса до или через полчаса после еды, перед проглатыванием рекомендовано немного подержать капли во рту. В случае необходимости капли могут быть разбавлены перед приемом в небольшом количестве воды.

Передозировка

Неблагоприятные явления в случаях передозировки препаратом Инфлюцид до настоящего времени не известны.

Побочные действия

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, такие, как аллергические реакции или желудочно-кишечные нарушения. В подобных случаях дальнейший прием препарата следует отменить и назначить соответствующее лечение.

В случае любого побочного явления следует обратиться к врачу или фармацевту. Это касается и любых других побочных явлений, не указанных в настоящем листке-вкладыше.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Примечание: При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение имеющихся симптомов заболевания (первоначальное ухудшение). В подобных случаях дальнейший прием лекарственного средства следует отменить и обратиться за консультацией к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте Инфлюцид после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Упаковка и содержимое

По 30 мл раствора во флаконе из коричневого стекла, с капельницей и с пластмассовой навинчивающейся крышкой. По 1 флакону пакуют в коробку вместе с листком-вкладышем.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмБХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь