

12.01.15  
НД РБ 7595 - 2015

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохране  
Республики Беларусь № 106  
от « 09.02.2015 » №

КАС № 1 от 22.01.2015

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

### Эреспал 80 мг Фенспирида гидрохлорид

**Внимательно прочтите этот вкладыш до конца перед тем, как начать прием препарата, поскольку в нем содержится важная для вас информация.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Он может вам еще понадобиться.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.
- Этот препарат был выписан для приема лично вам. Не следует передавать его другим лицам. Это может повредить им, даже если их признаки болезни сходны с вашими.
- Если вы отметили какие-либо нежелательные эффекты, сообщите об этом своему врачу или фармацевту. Это касается и побочных эффектов, которые не перечислены в этом вкладыше.

**В этом вкладыше содержится следующая информация:**

1. Что такое Эреспал и в каких случаях он применяется
2. Что вы должны знать перед тем, как начать прием Эреспала
3. Как принимать Эреспал
4. Возможное побочное действие
5. Как хранить Эреспал
6. Содержимое упаковки и другая информация

### 1. ЧТО ТАКОЕ ЭРЕСПАЛ И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Прочие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для системного применения (R: дыхательная система).

Лечение симптомов (кашель, отхождение мокроты и др.), проявляющихся при бронхо-легочных заболеваниях.


Лечение фенспиридом не заменяет антибактериальную терапию и не может служить причиной для откладывания адекватного назначения антибактериальных лекарственных средств.

### 2. ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ЭРЕСПАЛА

**В каких случаях не следует принимать Эреспал:**

- Известная повышенная чувствительность к фенспириду или одному из вспомогательных веществ.

*ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ИЛИ ФАРМАЦЕВТОМ.*



### **Особые указания и предосторожности:**

*Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.*

#### **Другие препараты и Эреспал:**

Всегда сообщайте своему врачу или фармацевту, какие препараты вы принимаете или недавно принимали, даже если это препараты, отпускаемые без рецепта.

При терапии Эреспалом не рекомендуется принимать седативные препараты.

#### **Прием Эреспала с едой и питьем:**

При терапии Эреспалом не рекомендуется употреблять алкоголь.

#### **Беременность и кормление грудью:**

Если вы беременны или кормите грудью, или думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом, перед тем, как начинать прием любого медицинского препарата.

Прием данного препарата во время беременности не рекомендуется.

Если беременность обнаруживается во время курса лечения, необходимо прервать его и обратиться к врачу, который назначит вам другой препарат.

Прием данного препарата при грудном вскармливании не рекомендуется.

Общее правило: если вы беременны или кормите грудью, всегда советуйтесь с врачом или фармацевтом перед тем, как начать прием какого-либо медицинского препарата.

#### **Вождение автотранспорта и управление механизмами:**

Этот препарат может вызвать сонливость и головокружение, особенно в начале лечения или при приеме алкоголя, что может повлиять на способность вождения автотранспорта и использования механизмов.

Если у вас проявились эти побочные эффекты, не водите автотранспорт и не управляйте машинным оборудованием.

### **3. КАК ПРИНИМАТЬ ЭРЕСПАЛ**

При приеме Эреспала всегда строго соблюдайте указания врача. Если вы сомневаетесь в правильности приема препарата, вы должны посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Пероральный прием.

Только для взрослых: по 1 таблетке 2-3 раза в день.

#### **Продолжительность лечения:**

Согласно предписанию врача.

#### **Если вы приняли больше Эреспала, чем вам рекомендовано:**

Если вы приняли слишком большую дозу Эреспала, немедленно свяжитесь с врачом или фармацевтом.

В случае приема слишком большой дозы препарата могут быть отмечены следующие признаки передозировки: сонливость или перевозбуждение, тошнота, рвота, синусная тахикардия.

Действия при передозировке должны включать в себя промывание желудка и мониторинг ЭКГ.

**Если вы забыли принять Эреспал:**

Не удваивайте последующую дозу. Просто примите следующую дозу в обычное время.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по приему препарата, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.

#### **4. ВОЗМОЖНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Как и все остальные лекарственные препараты, данное лекарственное средство может вызывать побочные эффекты, хотя и не у каждого пациента.

Эти побочные эффект могут включать в себя:

Частые побочные эффекты (могут наступить у 1 пациента из 10):

- нарушения пищеварения, тошнота, боль в желудке.

Редкие побочные эффекты (могут наступить у 1 пациента из 1 000):

- умеренное повышение частоты сердцебиения, которое уменьшается при снижении дозы,
- сонливость,
- покраснение кожи, сыпь, крапивница, ангиоотек (отек лица, губ, рта, языка или горла, который может привести к затрудненному глотанию или дыханию), кожные высыпания.

Побочные эффекты, частота которых неизвестна (частота не может быть установлена исходя из имеющихся данных):

- серьезное заболевание с образованием волдырей на коже,
- зуд,
- ощущение сердцебиения (сердцебиение), возможно связанное с тахикардией,
- низкое артериальное давление, которое может вызывать головокружение, легкая головная боль или утомление, возможно связанные с умеренной тахикардией,
- диарея, рвота,
- ощущение слабости, утомление,
- головокружение.

Если вы отметили какой-либо нежелательный эффект, сообщите об этом своему врачу или фармацевту. Это касается любых нежелательных эффектов, включая не перечисленные в этом вкладыше.

## 5. КАК ХРАНИТЬ ЭРЕСПАЛ

Держать вне видимости и вне досягаемости детей.

Хранить при температуре не выше 30°C.

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как избавиться от лекарств, прием которых закончен. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Что содержит Эреспал

Фенспирида гидрохлорид .....80 мг на таблетку

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, гипромеллоза, повидон, диоксид кремния коллоидный безводный, магния стеарат, титана диоксид (E171), глицерол, макрогол 6000.

### Как выглядит Эреспал и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Белые, круглые, покрытые оболочкой, двояковыпуклые таблетки.

Пачки, содержащие по 30 таблеток.

Пачка, содержащая 30 таблеток в контурной ячейковой упаковке (ПВХ/алюминий).

Картонная пачка содержит 2 контурных ячейковых упаковки, каждая из которых содержит по 15 таблеток, покрытых оболочкой, а также памятку с информацией для пациента.

### Условия отпуска

По рецепту.

### Информация о производителе (заявителе)

#### Заявитель

Les Laboratoires Servier  
Ле Лаборатуар Сервье  
50 rue Carnot  
92284 Suresnes cedex  
Франция

#### Изготовитель

Les Laboratoires Servier Industrie  
Ле Лаборатуар Сервье Индустри  
905, route de Saran  
45520 Gidy - Франция

По любым вопросам о данном лекарственном средстве, пожалуйста, обращайтесь в местное представительство Держателя разрешения на маркетинг.

**БЕЛАРУСЬ**

Ул.Мясникова, 70, офис 303  
220030 Минск, Республика Беларусь  
Тел.: +375 173 06 54 55

**Данный листок-вкладыш одобрен:**