


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

БОЯРЫШНИК

**ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА:**

Боярышник

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА:

Таблетки для рассасывания

СОСТАВ на одну таблетку:

Боярышника экстракт сухой* - 100,00 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол, ментол, кремния диоксид, ароматическая добавка «мёд», аспартам, магния стеарат.

* Примечание: Боярышника экстракт получен водной экстракцией листьев и цветков Боярышника (*Crataegus*); соотношение сырья к конечному продукту (4-5 : 1). Содержание суммы Витексин-2"-рамнозида и Гиперозида не менее 1,6мг/таб.

Код АТХ: [C01EB04] Прочие средства, применяемые при заболеваниях сердца.

ОПИСАНИЕ:

Круглые плоские со скошенным краем коричневато-серые с более светлыми и более тёмными вкраплениями, со специфическим запахом таблетки. На обеих сторонах гравировка «NP» на фоне дерева.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Прочие средства, применяемые при заболеваниях сердца.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Оказывает умеренное кардиотоническое, гипотензивное, спазмолитическое и седативное действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

В составе комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности после консультации врача.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Держать во рту до полного рассасывания.

Препарат применяется у взрослых по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

Возможно возникновение сонливости, брадикардии, артериальной гипотензии, головокружения, что требует отмены лекарственного средства. Лечение симптоматическое.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможны сонливость, артериальная гипотензия, брадикардия.



В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача для точной диагностики заболевания. Во время лечения необходим контроль артериального давления и ЭКГ-мониторирование.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу.

Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

При комбинированном применении боярышника и сердечных гликозидов (строфантин, дигоксин и др.) возможно усиление кардиотонического эффекта.

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмическими средствами III класса, а также с цизапридом.

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ:

В период лечения рекомендовано воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ:

В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

ПРИМЕНЕНИЕ У ДЕТЕЙ:

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендуется.

ФОРМА ВЫПУСКА:

По 10 таблеток в блистере из ПВХ/Al. По 2 блистера в картонной пачке с инструкцией по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

Без рецепта.

ЗАЯВИТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИИ:

ООО «ВАЛЕАНТ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, Россия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Херкель Б.В., Нобельвег 6, 3899 ВН Зеевольде, Нидерланды