

НД РБ 7936 - 2016

## Листок-вкладыш

**Следует внимательно прочитать весь листок-вкладыш поскольку он содержит важную для пациента информацию.**

### ГЕВИРАН

**Торговое название препарата:** Гевиран

**Международное непатентованное название:** ацикловир

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

**Состав:** 1 г мази содержит:

*активное вещество:* ацикловир – 0,05 г;

*вспомогательные вещества:* пропиленгликоль – 0,4 г, вазелин – 0,125 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) – 0,075 г, воск эмульсионный – 0,05 г, макрогол (полиэтиленоксид 1500) – 0,01 г, вода очищенная до 1 г.

**Описание:** мазь белого или почти белого цвета. Допускается наличие характерного запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** противовирусное средство для местного применения

**Код АТХ:** D06BB03

#### Показания к применению

Ацикловир предназначен для лечения инфекции губ и лица, вызванных вирусом *Herpes simplex* (рецидивирующий лабиальный герпес).

*Применение у пациентов с ослабленным иммунитетом*

Пациентам с ослабленным иммунитетом применять не рекомендуется и следует проконсультироваться с врачом относительно лечения любой инфекции.

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к ацикловиру и другим компонентам препарата, а также – к валацикловиру.

#### Беременность и лактация

Применение во время беременности и кормления грудью возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Существуют ограниченные данные, что при системном применении ацикловир проникает в грудное молоко. Предполагается, что системное воздействие при местном применении ацикловира низкое, доза, полученная ребенком, находящемся на грудном вскармливании, при использовании ацикловира матерью будет невелика.

#### Способ применения и дозы

Лекарственное средство предназначено только для наружного применения.

*Взрослые (включая пожилых):*

Препарат рекомендуется наносить 5 раз в день (примерно каждые 4 часа) тонким слоем на пораженные и граничащие с ними участки кожи, за исключением ночного времени.

Для достижения максимального терапевтического эффекта необходимо применять препарат уже при первых признаках заболевания (жжение, зуд, покалывание, ощущение напряженности и покраснение). Однако лечение может быть начато и на более поздней

стадии (наличие папулы или везикулы).

Длительность лечения не менее 4 дней. В случае отсутствия заживления лечение может быть продолжено до 10 дней. Если симптомы заболевания сохраняются более 10 дней, следует обратиться к врачу.

Чтобы не допустить ухудшения состояния и предупредить передачу инфекции, необходимо мыть руки до и после нанесения препарата, не тереть и не прикасаться к пораженным участкам кожи полотенцем.

#### *Применение у детей:*

В связи с отсутствием адекватных данных применение лекарственного средства у детей до 12 лет не рекомендовано.

#### **Побочное действие**

Побочные реакции указаны с использованием следующей классификации нежелательных эффектов по частоте: очень часто  $\geq 1/10$ , часто  $\geq 1/100$  и  $< 1/10$ , нечасто  $1/1000$  и  $< 1/100$ , редко  $\geq 1/10000$  и  $< 1/1000$ , очень редко  $< 1/10000$ .

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:* нечасто – проходящее жжение или покалывание после применения препарата, сухость или шелушение кожи, зуд; редко – эритема, контактный дерматит в месте нанесения, чаще связанный с реакцией на вспомогательные вещества, а не на ацикловир.

*Нарушения со стороны иммунной системы:* очень редко – реакции гиперчувствительности немедленного типа, в том числе отек Квинке и крапивница.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

#### **Передозировка**

При случайном проглатывании или местном применении всей упаковки, содержащей в 10 г мази 500 мг ацикловира, не было выявлено неблагоприятного воздействия. Однако описано возникновение желудочно-кишечных (тошнота и рвота) и неврологических эффектов (головная боль и спутанность сознания) в результате случайной повторной передозировки при приеме ацикловира внутрь в течение нескольких дней. Ацикловир выводится при гемодиализе.

При подозрении на передозировку следует обратиться к врачу.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**


При наружном применении не выявлено взаимодействия с другими лекарственными средствами. Усиление эффекта отмечается при одновременном назначении иммуностимуляторов.

#### **Особые указания**

Мазь можно применять только при герпесе кожи губ и лица. Не рекомендуется наносить мазь на слизистые оболочки полости рта и глаз, а также использовать для лечения генитального герпеса. Избегать случайного попадания в глаза.

При выраженных проявлениях герпеса губ рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам, имеющим герпес на губах (особенно при наличии открытых поражений), необходимо строго соблюдать правила предосторожности, чтобы не допустить инфицирования других людей.

Наполнитель пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.



**Влияние на способность управлять транспортом и другими потенциально опасными механизмами**  
Не применимо.

**Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 5 %.

По 5 г в тубу алюминиевую. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Производитель/ Организация, принимающая претензии потребителей**

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»  
(АО АКРИХИН), Россия

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03

