




Листок-вкладыш
Информация для пациентов
ВИРОЛЕКС® крем 50 мг/г

ВИРОЛЕКС® крем 50 мг/г
Ацикловир



Торговое название препарата
Виролекс® (Virolex®)

Общая характеристика

Международное непатентованное название
Ацикловир (Aciclovir)

Описание

Гомогенный крем белого или почти белого цвета с характерным запахом. Крем однородный не содержит гранул, комочков или каких-либо других включений.

Состав

1 г крема содержит активного вещества ацикловира 50 мг.
Вспомогательные вещества: полоксамер, цетостеариловый спирт, натрия лаурилсульфат, вазелин белый, масло вазелиновое, пропиленгликоль, вода очищенная.

Форма выпуска крем.

Фармакотерапевтическая группа и код классификации лекарственного средства

Противовирусное средство для наружного применения.
Код АТХ [D06BB03].

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Ацикловир - противовирусное средство с местным и системным действием. Он оказывает противовирусное действие и является эффективным препаратом при лечении вирусов простого герпеса 1 и 2 типов (HSV-1 и HSV-2), и вируса опоясывающего лишая (Varicella-zoster virus (VZV)).

В клетке, пораженной вирусом, под действием вирусного фермента тимидинкиназы ацикловир фосфорилируется до ацикловира монофосфата. Далее клеточные ферменты фосфорилируют его до активного соединения ацикловира ди- и трифосфата - ингибирующей субстрата для вирусной ДНК-полимеразы. Ацикловира трифосфат предотвращает дальнейший синтез вирусной ДНК и останавливает размножение вируса в организме человека, не оказывая влияния на нормальные клеточные процессы.

Фармакокинетика

Системным всасыванием препарата после местного нанесения можно пренебречь.

Показания для применения

Лечение инфекций кожи и слизистых, вызванных вирусом простого герпеса (герпес губ, генитальный герпес).

Способ применения и дозировка

Лечение следует начать как можно раньше, при появлении первых признаков заболевания (в продромальной фазе).

Крем наносят на пораженный участок 5 раз в день с интервалом 4 часа. Длительность лечения обычно составляет 5 дней, в более тяжелых случаях после консультации врача лечение может быть продолжено до 10 дней.

Побочное действие

В месте нанесения препарата может отмечаться легкое чувство жжения. Также может отмечаться преходящая эритема, эксфолиация и небольшая сухость кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ацикловиру или вспомогательным веществам.

Передозировка

Случаев передозировки не отмечено.

Прием внутрь даже большого количества крема вряд ли может вызвать клиническую картину интоксикации.

Меры предосторожности

Виролекс, крем 50 мг/г не предназначен для нанесения на слизистые оболочки полости рта, глаз, влагалища. Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не допустить даже случайного попадания крема Виролекс в глаза.

Особые указания

Эффективность лечения будет тем выше, чем раньше оно начато. У пациентов с иммунодефицитом при многократных повторных курсах лечения иногда происходит формирование устойчивости вирусов к ацикловиру.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат не рекомендуется применять беременным женщинам, хотя доклинические исследования не продемонстрировали тератогенного или эмбриотоксического действия. Применение оправдано только если польза для матери превышает риск для плода.

Ацикловир выделяется с грудным молоком, поэтому при грудном вскармливании применение препарата не рекомендуется.



Влияние на способность управлять автомобилем и работать с потенциально опасными механизмами

Не отмечалось какого-либо влияния на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не было сообщений о лекарственном взаимодействии при местном применении ацикловира.

Условия хранения и срок годности

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года.

Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

Крем 50 мг/г в алюминиевой тубе 5 г вместе с листком-вкладышем (одновременно инструкцией по применению) в картонной коробке.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьска цеста, 6, 8501 Ново место, Словения.

Дополнительная информация

Адрес Представительства в Республике Беларусь АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения): 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 29, офис 28. Тел. (017) 290 05 11.