

8394 - 2016 1

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

АФЛУБИН® (AFLUBIN®)

Гомеопатическое лекарственное средство.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от « 14 » ноября 2016 № 1114

Торговое название препарата: Афлубин®

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические

Состав:

1 таблетка содержит:

Активные вещества: Горечавка желтая (Gentiana) D1- 3,6 мг, Аконит аптечный (Aconitum) D6 - 37,2 мг, Бриония двудомная (Bryonia) D6- 37,2 мг, Железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12- 37,2 мг, Кислота молочная (Acidum sarcolacticum) D12- 37,2 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

Описание: круглые, плоские, белые таблетки с возможными вкраплениями и одной разделительной полосой.

Таблетка может быть разделена на две части.

Фармакотерапевтическая группа: прочие лекарственные средства.

МНН: отсутствует.

Код ATХ: V03AX

Фармакологические свойства

Афлубин® представляет собой гомеопатическое лекарственное средство, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины.

Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров гомеопатических средств невозможно.

Область применения: Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии острых респираторных заболеваний. Применение по указанному назначению основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 лет, период беременности и лактации.

Применение при беременности и в период лактации: В связи с отсутствием достаточных данных гомеопатическое средство противопоказано принимать во время беременности и лактации.

95.10.2016 2

Способ применения и дозы: Афлубин® следует принять за 30 минут до приема пищи через 1 час после приема пищи, таблетку держать под языком до полного рассасывания.

<i>Возраст</i>	<i>Разовая доза</i>	<i>Кратность приема</i>
1 - 2 день острого респираторного заболевания		
Взрослые и дети старше 12 лет	1 таблетка	3 раза в день
Дети от 6 до 12 лет	½ таблетки	
Продолжение лечения (3-7 день) острого респираторного заболевания		
Взрослые и дети старше 12 лет	1 таблетка	2 раза в день
Дети от 6 до 12 лет	½ таблетки	

Длительность курса лечения

Продолжительность применения гомеопатического средства определяется врачом. Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей: противопоказано применение гомеопатического средства Афлубин® у детей до 6 лет. Применение у детей старше 6 лет возможно только после консультации врача.

Побочное действие: возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка: информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Особые указания: прием гомеопатического лекарственного средства Афлубин® не заменяет профилактической вакцинации против гриппа.

Если во время применения препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

В начале лечения гомеопатическими лекарственными средствами возможно временное ухудшение симптомов заболевания. В случае ухудшения состояния прием гомеопатического лекарственного средства следует прекратить и обратиться к врачу.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

8394 - 2016 СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

3

В связи с содержанием лактозы гомеопатическое средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

Применение у детей: применение гомеопатического средства Афлубин® противопоказано для детей до 6 лет. Применение у детей старше 6 лет возможно только после консультации врача.

Влияние лекарственного средства на вождение автомобиля и работу с механизмами: лекарственное средство не оказывает влияния или оказывает незначительное влияние на способность управления автотранспортом или работу с движущимися механизмами.

Форма выпуска: по 12 таблеток в блистере из алюминиевой фольги ПВХ/ПВДХ. По 1, 2 или 4 блистера помещают вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку.

Условия хранения: при температуре не выше 30° С в защищенном от света месте.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок хранения: 3 года. **Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.**

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель:

«Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55 - 57, A-1030, Вена, Австрия.