


ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

(информация для пациентов)

ПРОПОЛИС



Лекарственная форма: спрей для слизистой ротовой полости.

Описание

Раствор от темно-желтого до красновато-коричневого цвета, с характерным запахом прополиса.

Состав лекарственного средства

20 г раствора содержат действующего вещества: прополиса экстракта жидкого 1:3 - 4,0 г (экстрагент спирт этиловый 96 %); *вспомогательных веществ:* глицерина и спирта этилового разведенного 80 %.

40 г раствора содержат действующего вещества: прополиса экстракта жидкого 1:3 - 8,0 г (экстрагент спирт этиловый 96 %); *вспомогательных веществ:* глицерина и спирта этилового разведенного 80 %.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие антисептические средства для лечения заболеваний горла.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Прополис содержит комплекс биологических активных веществ: 55 % смол, 7,5-35 % воска, 10 % эфирных масел, 5 % пыльцы растений, 5 % жирных кислот (коричная, ванилиновая, п-оксибензойная, феруловая), флавоны (кризин, тектокрин, галангин, кемпферол, кверцитин, бетулетол, апигенин, рамназин, рамнетин), флавононы (альпинетин, пиноцембрин, пиностробин, пинобанксин), терпены (гераниол, α-ацетоксибетулинол, β-бисаболол), терпеноиды (лимонен, кимен, 1,8-цинеол), сексвитерпены, полисахариды, углеводы, фенолкарбоновые кислоты, 24 аминокислот, 7 из них незаменимые, витамины А, В₁, В₂, В₆, С, Е, РР, Н (биотин), 19 микроэлементов (Al, Fe, Cu, Mn, Mg, Co, Na, K, Ca, Si, P, Ni и др.).

Биологические активные вещества прополиса оказывают антибактериальное, противогрибковое, противовоспалительное, регенерирующее, антиоксидантное, местноанестезирующее и дезодорирующее действие.

Прополис активен по отношению к большинству грамположительных бактерий: *Streptococcus haemolyticus*, *Staphylococcus aureus*; грамотрицательных бактерий: *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*; патогенных грибов: *Candida albicans*, *Cladosporium*.



Прополис образует защитную пленку на поверхности миндалин, уменьшает болезненность и раздражающее воздействие внешних факторов, ускоряет процессы регенерации.

Глицерин и спирт этиловый оказывают смягчающее и антисептическое действие.

Показания к применению

Прополис может быть эффективен при лечении заболеваний ЛОР-органов: ринофарингиты, фарингиты, ларингиты.

Противопоказания

Гиперчувствительность к прополису и другим компонентам препарата, а также на пчелиный яд или продукты пчеловодства, тополиный пух, хвойные деревья, ацетилсалициловую кислоту; бронхиальная астма, детский возраст до 12 лет, беременность, период лактации.

Меры предосторожности

Перед началом применения препарата рекомендуется проводить тест на чувствительность к прополису. Небольшую дозу препарата наносят на заднюю стенку глотки или мягкого неба. Если в течение 30 мин на месте аппликации гиперемия и/или отечность усиливаются, препарат не следует применять.

Препарат не предназначен для приема внутрь (нельзя вдыхать или проглатывать). У детей спрей применяют, если они способны задержать дыхание при впрыскивании.

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании их следует промыть большим количеством теплой воды.

Если после нескольких дней применения препарата симптоматика не улучшится, необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с лечащим врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не известны. Если одновременно планируете осуществлять или принимаете другие лекарственные средства, необходимо проконсультироваться с врачом.


Особенности применения

Туб распылителя до и после применения промывают горячей водой.

Для более продолжительного воздействия препарата на пораженные слизистые оболочки, после орошения не рекомендуется употреблять пищу и напитки в течение 15-30 мин.

Препарат противопоказан при беременности. Кормящие женщины на время лечения должны приостановить грудное вскармливание.

Препарат не оказывает влияния на скорость реакции водителей транспортных средств и лиц, обслуживающих установки, требующие особого внимания.



Способ применения и дозировка

Местно, после еды.

Снимают крышку флакона и навинчивают распылительную насадку. Для заполнения насадки делают 3-5 нажатий на головку распылителя, направив струю на кусочек бумаги.

При ЛОР-заболеваниях вводят туб для направления струи в полость рта, как можно ближе к лакунам и супратонзиллярным пространствам, задерживают дыхание и равномерно орошают слизистую оболочку глотки и гортани, нажимая на головку распылителя. Орошение проводят 2-4 раза в день (при необходимости - через каждые 4 ч).

Продолжительность курса лечения определяется лечащим врачом в зависимости от характера и тяжести заболевания и составляет около 3-7 дней.

Передозировка

При ошибочном приеме внутрь большого количества препарата возможны следующие симптомы: сильное чувство жжения, сухость в полости рта, боли в эпигастральной области, тошнота, рвота.

Лечение: промывание полости рта и желудка теплой кипяченой водой.

При подозрении на передозировку обратитесь к лечащему врачу. В зависимости от тяжести состояния, врач примет решение о соответствующих мерах лечения.

Побочное действие

Чувство жжения и покраснение на месте аппликации.

При индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции: зуд, крапивница, отек Квинке.

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других побочных реакций, не упомянутых в инструкции, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

Условия хранения и срок годности

В защищенном от влаги и света месте, при температуре 15-25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: без рецепта врача.


Упаковка: по 20 г или 40 г в полимерных флаконах коричневого цвета. Каждый флакон в комплекте с распылительной насадкой и вместе с инструкцией по применению помещают в индивидуальную пачку из картона.

Фирма-производитель

ООО «ДЕПОФАРМ»

Республика Молдова,

МД-6501, г. Анений Ной,
пер. Артезианский, 13
Тел./Факс: +(373 265) 2-60-57



Представитель ООО «ДЕПОФАРМ» в Республике Беларусь

Фармацевт Мариана Стати
Республика Молдова,
МД-6501, г. Анений Ной,
пер. Артезианский, 13
Тел.: +(373 265) 2-58-74
depofarm@mail.ru

*Предъявляйте любые жалобы и пожелания вместе с номером серии,
указанной на упаковке.*