

17.08.2017
/

НД РБ

8584 - 2017

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Торговое название лекарственного средства: Тонзипрет®


Лекарственная форма: капли для приема внутрь

СОСТАВ:

10 г (=10,9мл) капель Тонзипрет® содержат:

Capsicum annuum (Перец стручковый) Dil. D4	4,0 г
Guaiacum (Гваяковое дерево) Dil. D4	4,0 г
Phytolacca americana (Лаконос американский) Dil. D1	2,0 г

Содержание этанола 55% (в объемном соотношении)



ОПИСАНИЕ

Прозрачная, слегка желтоватая жидкость с ароматическим запахом. В процессе хранения возможно легкое помутнение и выпадение осадка.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Гомеопатическое лекарственное средство.
Код АТХ: V03AX. Прочие лекарственные средства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению.
Область в рамках гомеопатического применения включает симптоматическое лечение воспалительных заболеваний глотки, горла или миндалин (тонзиллит).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Беременность и период лактации. Из-за содержания алкоголя лекарственное средство не следует назначать пациентам с алкогольной зависимостью, циррозом печени, эпилепсией и детям до 2 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Препарат противопоказан для приема женщинам во время беременности и кормления грудью. Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях могут развиваться тошнота и расстройства желудочно-кишечного тракта, в очень редких случаях - гиперчувствительность / аллергические реакции.

При первых симптомах аллергической реакции следует немедленно прекратить прием капель Тонзипрет®.

На фоне применения гомеопатических средств возможно временное обострение симптоматики. В этом случае необходимо прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Если какие-либо из указанных побочных эффектов являются довольно сильными или Вы наблюдаете побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки описаны не были. В случае передозировки лечение симптоматическое.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Если врач не назначил другой дозировки:

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать -

При острых состояниях каждые полчаса или час, но не более 12 раз в сутки, по 5-10 капель.

При хронических состояниях по 5-10 капель 1-3 раза в день.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет не более двух третей от взрослой дозы.

При острых симптомах по 5-10 капель не более 8 раз в день.

При хронических состояниях – по 5-10 капель 2 раза в день.

Детям в возрасте от 2 до 5 лет следует применять не более половины от взрослой дозы.

При острых симптомах по 5-10 капель не более 6 раз в день.

При хронических состояниях – по 5-10 капель 1-2 раза в день.

Капли следует принимать либо в неразбавленном виде, подержав некоторое время во рту, либо разбавив небольшим количеством воды.

Детям рекомендуется приём препарата в разбавленном водой виде.

Гомеопатические препараты не следует принимать длительное время без консультации врача.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. Действие гомеопатического средства может уменьшиться при несоблюдении правил здорового образа жизни.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Отсутствуют достаточные данные о применении препарата у детей раннего возраста.

Препарат противопоказан для применения у детей до 2 лет.

В случае развития стойких или неясных симптомов, при появлении новых симптомов, а также при подъеме температуры, сохраняющемся в течение более 3 дней или достигающем 39 °С и выше, следует обратиться к врачу.

Данный лекарственный препарат содержит 55 % (об/об) этанола, то есть 115 – 230 мг на разовую дозу (5 -10 капель), что равно 3 - 6 мл пива или 1 - 2 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом. Необходимо учитывать детям и таким группам высокого риска, как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсией.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ МЕХАНИЗМАМИ

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы темного стекла с дозирующим устройством по 30 мл и 50 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению помещаются в складную картонную коробку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года. Срок годности после вскрытия флакона 6 месяцев.
Не допускается применение препарата после истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**БИОНОРИКА СЕ**

Кершенштайнерштрассе 11-15
92318 Ноймаркт
Германия

Представительство в Республике Беларусь
220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н
тел/факс (+375 17) 342-40-08, 271-40-13
e-mail office@bionorica.by