

Листок-вкладыш – информация для пациента  
**Кордафлекс®, 20 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой**

Действующее вещество: нифедипин

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Кордафлекс®, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Кордафлекс®
3. Прием препарата Кордафлекс®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Кордафлекс®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

### **1. Что из себя представляет препарат Кордафлекс®, и для чего его применяют**

Препарат Кордафлекс® содержит действующее вещество нифедипин, который относится к селективным блокаторам кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды. Нифедипин снижает концентрацию ионов кальция в клетках сердца и кровеносных сосудов, расширяет артерии, которые доставляют кровь к сердцу (коронарные артерии), а также периферические артерии. Это приводит к снижению кровяного давления и уменьшению потребности сердечной мышцы (миокарда) в кислороде.

### **Показания к применению**

Препарат Кордафлекс® применяется для лечения взрослых пациентов в возрасте от 18 лет.

- Артериальная гипертензия (повышенное кровяное давление).
- Стабильная стенокардия и вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала, вариантная стенокардия).

### **Способ действия препарата Кордафлекс®**

При повышенном кровяном давлении: препарат Кордафлекс® действует путем расслабления и расширения кровеносных сосудов. Благодаря этому кровоток улучшается, а кровяное давление снижается, что уменьшает нагрузку на сердце.

При стенокардии: препарат Кордафлекс® действует путем расслабления и расширения коронарных артерий. Это увеличивает поступление крови и кислорода к сердцу и снижает нагрузку на сердце. Приступы стенокардии становятся менее тяжелыми и менее частыми, если нагрузка на сердце уменьшается.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## 2. О чем следует знать перед приемом препарата Кордафлекс®

### **Противопоказания**

#### **Не принимайте препарат Кордафлекс®:**

- если у Вас аллергия на нифедипин, другие производные дигидропиридина (например, амлодипин, фелодипин, нимодопин и др.) или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас есть умеренное или тяжелое нарушение функции печени;
- если у Вас возникло резкое снижение кровяного давления с угнетением сознания, вызванное тем, что Ваше сердце не работает должным образом (кардиогенный шок);
- если у Вас возникло резкое снижение кровяного давления, которое может приводить к слабости или обмороку (коллапс);
- если у Вас страдаете выраженной артериальной гипотензией, сопровождающейся пониженным систолическим («верхним») кровяным давлением (ниже 90 мм рт. ст.);
- если у Вас недавно был инфаркт миокарда (не более 4 недель назад);
- если Вы страдаете нестабильной стенокардией (серьезное осложнение заболевания сердца, вызванного его недостаточным кровоснабжением [ишемической болезни сердца], которое может привести к инфаркту миокарда или даже к внезапной смерти);
- если у Вас выявлена патология сердца, называемая динамической обструкцией выносящего тракта левого желудочка (например, сужение аорты);
- если Вы принимаете рифампицин (антибиотик);
- если Вы находитесь в первом или втором триместре беременности (до 20 недель);
- если Вы кормите грудью.

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Кордафлекс® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Это особенно важно, если:

- у Вас есть артериальная гипотензия (пониженное кровяное давление);
- у Вас страдаете злокачественной артериальной гипертензией (тяжелая форма повышенного кровяного давления);
- если у Вас есть проблемы с сердцем, в том числе ишемическая болезнь сердца, особенно при тяжелом обструктивном поражении коронарных артерий, хроническая сердечная недостаточность, цереброваскулярные заболевания (заболевания сосудов головного мозга);
- если у Вас есть порок сердца, называемый аортальным стенозом или митральным стенозом;
- если у Вас есть генетическое заболевание сердца, называемое гипертрофической обструктивной кардиомиопатией (симптомы включают чувство сдавления и боли в груди [ангинозные боли], нарушение дыхания [одышка], головокружение и обмороки, артериальную гипотензию, нарушения ритма сердца);
- если у Вас есть сахарный диабет;
- если у Вас есть нарушение функции печени легкой степени тяжести;
- если у Вас есть злокачественная артериальная гипертензия и Вы проходите процедуры гемодиализа;
- если Вы находитесь во втором или третьем триместре беременности (более 20 недель);
- если Вы старше 65 лет.

Если во время курса лечения препаратом Кордафлекс® у Вас появились отеки конечностей, обычно нижних конечностей (периферические отеки), сообщите об этом лечащему врачу.

В редких случаях сообщалось о нарушении функции печени у пациентов, принимавших нифедипин. Если во время курса лечения препаратом Кордафлекс® у Вас появились такие признаки повреждения печени, как повышение температуры тела, кожная сыпь, снижение аппетита, тошнота, рвота, усталость, боль в правом подреберье, темное окрашивание мочи или желтуха (окрашивание кожи и слизистых оболочек в желтый цвет), немедленно прекратите прием препарата и обратитесь за медицинской помощью.

Нифедипин может изменять результаты некоторых лабораторных диагностических анализов крови и мочи.

Если во время курса лечения Вам требуется провести хирургическое вмешательство под общим наркозом, сообщите хирургу или врачу-анестезиологу о том, что Вы принимаете препарат Кордафлекс®.

**Не используйте** препарат Кордафлекс® в качестве неотложной помощи для снижения кровяного давления при гипертоническом кризе (чрезмерное повышение кровяного давления, симптомы которого включают головную боль и головокружение, учащенное сердцебиение [тахикардия], повышенное потоотделение, ощущение нехватки воздуха [одышка], слабость) или для лечения острого приступа боли в груди (острого приступа стенокардии).

### **Дети и подростки**

Не давайте препарат Кордафлекс® детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения лекарственного препарата Кордафлекс® у детей и подростков не установлены. Данные отсутствуют.

### **Другие препараты и препарат Кордафлекс®**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это особенно важно, если Вы принимаете:

- другие антигипертензивные препараты (препараты для снижения кровяного давления);
- рифампицин (антибактериальное средство);
- фенитоин, карбамазепин, вальпроєвую кислоту или фенобарбитал (препараты для лечения эпилепсии);
- антибиотики из группы макролидов (например, эритромицин);
- ингибиторы ВИЧ-протеазы (например, ритонавир);
- противогрибковые препараты из группы азолов (например, кетоконазол, флуконазол);
- циметидин, ранитидин (препараты для лечения язвенной болезни);
- нефазодон, флуоксетин, имипрамин (антидепрессанты);
- дилтиазем (препарат для снижения кровяного давления);
- хинидин, пропafenон, амиодарон, дизопирамид, флекаинамид (препараты для лечения нарушений ритма сердца);
- комбинацию антибиотиков хинупристин/дальфопристин;
- дигоксин (препарат для лечения сердечной недостаточности из группы сердечных гликозидов);
- цизаприд (препарат для улучшения моторики желудочно-кишечного тракта);
- такролимус (препарат, подавляющий иммунитет);
- бензодиазепины (препараты для лечения бессонницы и тревожных расстройств), например, диазепам;

• **терфенадин (препарат для лечения аллергии);**

- варфарин (препарат, снижающие свертываемость крови);
- теофиллин (препарат для лечения заболеваний легких);
- винкристин (противоопухолевый препарат);
- антибиотики из группы цефалоспоринов (например, цефексим);
- нитраты (препараты для лечения стенокардии);
- сульфат магния;
- фентанил (опиоидный анальгетик);
- препараты кальция;
- нестероидные противовоспалительные препараты, например, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, диклофенак;
- симпатомиметики (например, эфедрин, фенамин);
- эстрогены (препараты женских половых гормонов);
- препараты лития (препараты для лечения психических заболеваний).

**Препарат Кордафлекс® с пищей, напитками и алкоголем**

Не употребляйте грейпфруты, грейпфрутовый сок или алкоголь во время курса лечения препаратом Кордафлекс® из-за риска чрезмерного снижения кровяного давления.

**Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Применение препарата Кордафлекс® при беременности на сроке до 20 недель противопоказано.

Применение препарата Кордафлекс® после 20-й недели беременности возможно только по назначению лечащего врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Грудное вскармливание

Нифедипин проникает в грудное молоко. При необходимости применения препарата Кордафлекс® в период грудного вскармливания на время лечения следует прекратить кормление грудью.

Фертильность

Нифедипин может оказывать неблагоприятное действие на функцию сперматозоидов. Не применяйте препарат Кордафлекс®, если Вы мужчина, который проходит обследование и лечение по поводу бесплодия, или у Вашей пары было несколько неудачных попыток искусственного (экстракорпорального) оплодотворения.

**Управление транспортными средствами или работа с механизмами**

Препарат Кордафлекс® может вызывать головокружение, особенно в начале лечения, и нарушение зрения (см. раздел 4). Если на фоне приема препарата Кордафлекс® Вы почувствовали головокружение или у Вас ухудшилось зрение, воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

**Препарат Кордафлекс® содержит лактозу**

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом препарата.



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 12.09.2023 № 17634  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

### **Препарат Кордафлекс® содержит натрий**

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну таблетку, то есть по сути не содержит натрия.

### **3. Прием препарата Кордафлекс®**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза**

Лечащий врач подберет Вам необходимую дозу препарата Кордафлекс® в зависимости от степени тяжести заболевания и терапевтического эффекта.

#### *Артериальная гипертензия*

Начальная доза препарата Кордафлекс® составляет 40 мг в сутки (по 1 таблетке 2 раза в сутки), в дальнейшем доза препарата может быть увеличена до 80 мг в сутки (в 2 или 3 приема).

#### *Стабильная стенокардия и вазоспастическая стенокардия*

Начальная доза препарата Кордафлекс® составляет 40 мг в сутки (по 1 таблетке 2 раза в сутки), в дальнейшем доза препарата может быть увеличена на 20 мг в сутки. Поддерживающая доза нифедипина при стабильной стенокардии составляет 10–20 мг 3 раза в сутки. В некоторых случаях (например, при вазоспастической стенокардии) возможно применение нифедипина в дозе 20–30 мг 3–4 раза в сутки.

Максимальная разовая доза нифедипина составляет 40 мг (2 таблетки).

Максимальная суточная доза не должна превышать 120 мг нифедипина в сутки.

Если Вы получаете принимаете другие препараты для лечения артериальной гипертензии или стенокардии, Вы старше 65 лет и/или у Вас есть легкое нарушение функции печени, лечащий врач назначит Вам меньшую дозу препарата Кордафлекс®.

#### **Путь и (или) способ введения**

Препарат Кордафлекс® принимают внутрь, запивая стаканом воды.

Таблетки необходимо проглатывать целиком, не разжевывая, не разламывая.

Не следует запивать таблетки грейпфрутовым соком.

Препарат рекомендуется принимать 2 раза в сутки, в одно и то же время, предпочтительно утром и вечером.

#### **Продолжительность терапии**

Продолжайте принимать препарат Кордафлекс® в соответствии с рекомендациями врача.

#### **Если Вы приняли препарата Кордафлекс® больше, чем следовало**

Если Вы приняли слишком много таблеток препарата Кордафлекс®, **немедленно обратитесь к врачу**. По возможности покажите врачу упаковку препарата Кордафлекс®.

Признаками передозировки являются длительное выраженное снижение кровяного давления, головная боль, гиперемия (покраснение) кожи лица, угнетение деятельности синусового узла (нарушение ритма сердца), брадикардия (уреженное сердцебиение) и/или тахикардия, брадиаритмия (выраженное урежение частоты сердечных сокращений до менее 60 в минуту), в тяжелых случаях – потеря сознания, кома.

### **Если Вы забыли принять препарат Кордафлекс®**

Примите пропущенную дозу сразу же, как вспомните об этом. Однако если время приема следующей дозы почти наступило, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

### **Если Вы прекратили прием препарата Кордафлекс®**

Не прекращайте прием препарата без соответствующего указания лечащего врача. Прекращение приема препаратов нифедипина осуществляется постепенно, поскольку существует риск развития симптомов отмены – резкого возвращения симптомов Вашего заболевания.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Кордафлекс® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Прекратите прием препарата Кордафлекс® и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если заметите любую из перечисленных ниже серьезных нежелательных реакций:**

**Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):**

- Ангионевротический отек (отек Квинке) – быстро развивающийся отек кожи, слизистых оболочек и подкожной жировой клетчатки, в том числе отек лица, языка, губ и гортани.
- Аллергические реакции (покраснение кожи, сильный зуд кожи, появление сыпи или сильно зудящих волдырей на коже [крапивница]).

**Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):**

- Неожиданное или необычное кровотечение или синяки. Это может быть связано с уменьшением количества кровяных пластинок (тромбоцитов) в крови (тромбоцитопенией), что повышает риск развития кровотечения, или вызвано заболеванием, которое характеризуется тромбоцитопенией и повышенным риском кровотечений (тромбоцитопеническая пурпура).
- Появление приступов стенокардии или острого инфаркта миокарда, особенно в начале лечения или при увеличении дозы препарата. Симптомы могут включать давящую, сжимающую или жгучую боль за грудиной, которая отдает в левую руку, лопатку или нижнюю челюсть, слабость, одышку, ощущение нехватки воздуха.
- Затруднение дыхания.
- Тяжелая кожная реакция – эксфолиативный дерматит. Симптомы могут включать покраснение и шелушение кожи с образованием пузырей, трансформирующихся в эрозии.

**Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):**

- Сужение просвета бронхов (бронхоспазм).

**Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):**

- Тяжелые аллергические реакции (анафилактоидные или анафилактические реакции), симптомы которых могут включать сыпь и слизистых оболочек (цианоз), бледность, остановку дыхания, бронхоспазм, отек лица, век,

языка или гортани, одышку, снижение или повышение кровяного давления, тахикардию.

- Снижение количества белых клеток крови (лейкопения), снижение количества специфических белых клеток крови – гранулоцитов (агранулоцитоз). Симптомы могут включать лихорадку (повышение температуры тела), боль в горле, поверхностные язвы полости рта, гриппоподобные симптомы (такие как боль в горле, насморк или заложенность носа), сильное истощение.
- Тяжелая кожная реакция – синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз). Симптомы могут включать высыпания на коже с волдырями, которые сопровождается повышением температуры тела и ознобом, мышечной болью и общим плохим самочувствием.
- Отек легких. Симптомы могут включать выраженную одышку, потливость, появление хрипов и иногда пенистой мокроты, окрашенной кровью.

**Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Кордафлекс®**

**Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):**

- головная боль;
- слабость;
- отеки конечностей (периферические отеки);
- проявления чрезмерного расширения сосудов (бессимптомное снижение кровяного давления, развитие или усугубление течения сердечной недостаточности [чаще усугубление уже имевшейся]);
- «приливы» крови к коже лица;
- гиперемия кожи лица;
- ощущение жара;
- запор;
- выраженная усталость (астения).

**Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):**

- тревога;
- нарушения сна;
- мигрень;
- головокружение;
- нарушение зрения (в том числе временная потеря зрения);
- тахикардия;
- ощущение сердцебиения;
- выраженное снижение кровяного давления;
- обморок;
- носовое кровотечение;
- заложенность носа;
- боль в животе (гастроинтестинальная и абдоминальная боль);
- нарушение пищеварения (диспепсия), сопровождающееся тошнотой, диареей или запором,
- сухость слизистой оболочки полости рта;
- повышенное газообразование в кишечнике (метеоризм);
- повышение активности «печеночных» ферментов (трансаминаз);
- покраснение кожи (эритема);
- мышечные судороги;
- отечность суставов;
- повышенное мочеиспускание (полиурия);

● **нарушение мочеиспускания (дизурия);**

- эректильная дисфункция (импотенция);
- неспецифические боли;
- озноб.

**Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):**


- кожный зуд;
- кожная сыпь;
- крапивница;
- нарушение чувствительности, проявляющееся покалыванием или жжением (парестезия);
- извращение чувствительности (дизестезия);
- кашель;
- разрастание тканей десен (гиперплазия десен), сопровождающееся кровоточивостью, болезненностью, отечностью;
- при длительном приеме нарушение функции печени (внутрипеченочный холестаз);
- воспаление кожи, вызванное воздействием солнечного излучения (фотодерматит);
- боль в суставах (артралгия);
- боль в мышцах (миалгия).

**Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):**

- снижение количества красных кровяных телец и/или гемоглобина в крови (анемия);
- воспаление печени (аутоиммунный гепатит);
- увеличение концентрации глюкозы в крови (гипергликемия);
- увеличение массы тела;
- увеличение грудных желез (гинекомастия) у пожилых пациентов, полностью исчезающая после отмены препарата;
- выделения грудного молока у мужчин или у женщин вне периода грудного вскармливания (галакторея).

**Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):**

- ослабление чувствительности (гипестезия);
- повышенная утомляемость;
- сонливость;
- парестезия конечностей;
- чувство тревоги;
- паркинсонические (экстрапирамидные) нарушения (нарушение координации произвольных движений [атаксия], маскообразное лицо, шаркающая походка, дрожание [тремор] кистей и пальцев рук, затрудненное глотание);
- ухудшение настроения (депрессия);
- боль в глазах;
- нарушение ритма сердца (аритмия);
- загрудинная боль;
- одышка;
- рвота;
- недостаточность гастроэзофагеального сфинктера, сопровождающаяся забросом содержимого желудка в пищевод;
- повышенный аппетит;
- артрит;
- ухудшение функции почек (у пациентов с почечной недостаточностью).



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 12.09.2023 № 17634  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

#### Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Сайт: <https://www.rceth.by>

### 5. Хранение препарата Кордафлекс®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и пачке картонной после слов «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 30 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

### 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

#### **Препарат Кордафлекс® содержит**

Действующим веществом является нифедипин.


Каждая таблетка пролонгированного действия, покрытая пленочной оболочкой, содержит 20 мг нифедипина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, кроскармеллоза натрия, метилметакрилата и этилакрилата сополимер [1:2], тальк, магния стеарат, гипролоза, гипромеллоза, титана диоксид, краситель железа оксид красный (Е 172), краситель железа оксид черный (Е 172), магния стеарат.

#### **Внешний вид препарата Кордафлекс® и содержимое упаковки**

Препарат представляет собой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой.

Двойковыпуклые круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой коричнево-фиолетового цвета с матовой или слегка блестящей поверхностью. Без запаха или со



слабым характерным запахом. Вид на изломе: желтый по краям с узкой полосой коричневатого-фиолетового цвета.

Первичная (внутренняя) упаковка: флаконы из коричневого стекла гидролитического класса III укупоренные полиэтиленовыми крышками с контролем первого вскрытия и снабженные амортизатором-гармошкой.

Вторичная (потребительская) упаковка: картонная пачка.

По 30 или 60 таблеток во флаконе. 1 флакон вместе с листком-вкладышем упакован в картонную пачку.

#### **Держатель регистрационного удостоверения**

Венгрия

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

1106 Будапешт, ул. Керестури 30–38

Телефон: (+36–1) 803–5555

Электронная почта: [mailbox@egis.hu](mailto:mailbox@egis.hu)

**Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

ООО «ЭГИС-РУС»

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д.19, блок В, этаж 13

Телефон: +7(495) 363-39-66

Электронная почта: [pharmacovigilance@egis.ru](mailto:pharmacovigilance@egis.ru)

Республика Беларусь

Представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия) в Республике Беларусь

220053, г. Минск, пер. Ермака, д. 6А.

Телефон: (017) 380-00-80, (017) 227-35-51, (017) 227-35-52.

Факс: (017) 227-35-53.

Электронная почта: [info@egis.by](mailto:info@egis.by)

**Листок-вкладыш пересмотрен**

#### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org/>