

**Листок-вкладыш – информация для пациента****Камистад®**, 20 мг/г + 185 мг/г, гель для местного применения**Действующие вещества: лидокаин + ромашки аптечной цветков экстракт**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Камистад®, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Камистад®
3. Применение препарата Камистад®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Камистад®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Камистад®, и для чего его применяют
Препарат Камистад® содержит действующие вещества лидокаин и ромашки аптечной цветков экстракт и относится к группе препаратов, применяемых в стоматологии для местного лечения заболеваний полости рта. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, которое способствует быстрому и продолжительному уменьшению боли при воспалении и повреждении слизистой оболочки полости рта и десен. Экстракт цветков ромашки обладает противовоспалительными, антисептическими и регенерирующими свойствами.

Показания к применению

Препарат Камистад® применяется у взрослых и детей в возрасте от 12 до 18 лет для лечения следующих заболеваний: болевой синдром при воспалении слизистой оболочки полости рта и губ (при стоматите, хейлите, глетчерной эритеме губ), гингивите (воспалении десен), раздражении слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов и брекетов, прорезывании зубов «мудрости», стоматологических процедурах, после ортопедических операций в челюстно-лицевой хирургии.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Камистад®**Противопоказания****Не применяйте препарат Камистад®:**

- если у Вас аллергия на лидокаин, ромашки аптечной цветков экстракт или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Камистад® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не допускается попадание препарата в глаза. До и после применения геля рекомендуется вымыть руки.

Камистад® содержит сахарозаменитель натрия сахаринат.

Дети и подростки

Не применяйте препарат у детей от 0 до 12 лет, поскольку безопасность и эффективность применения лекарственного препарата Камистад® у детей в возрасте до 12 лет не установлены.

Перед применением препарата Камистад® у детей старше 12 лет проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Другие препараты и препарат Камистад®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Камистад® содержит бензалкония хлорид 50 % раствор

Бензалкония хлорид – раздражитель, может вызывать кожные реакции.

3. Применение препарата Камистад®

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Взрослые и дети старше 12 лет

Полоску препарата длиной 0,5 см наносят на болезненные или воспаленные участки слизистой оболочки полости рта и губ 3 раза в день.

На период привыкания к зубным протезам в места сдавливания втирать полоску геля длиной 0,5 см.

Путь и способ введения

Местно. Препарат наносят, втирая легкими массирующими движениями.

Продолжительность терапии

Курс лечения зависит от тяжести заболевания.

Если Вы применили препарата Камистад® больше, чем следовало

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции.

Если во время применения препарата Камистад® появились признаки аллергии, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

e-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон/факс: +375 (17) 242-00-29

e-mail: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by/>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, 13

Телефон: +7 (7172) 235 135

e-mail: farm@dari.kz

Сайт: <https://www.ndda.kz/>

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25

Телефон: 0800 800 26 26

e-mail: dlomt@pharm.kg

Сайт: <http://www.pharm.kg/>

5. Хранение препарата Камистад®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и алюминиевой тубе после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

При температуре не выше 25 °С.

После вскрытия тубы использовать гель в течение 12 месяцев.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Камистад® содержит

Действующими веществами являются лидокаин + ромашки аптечной цветков экстракт.

1 г геля содержит лидокаина гидрохлорида моногидрат – 20,0 мг, ромашки аптечной цветков экстракт (1:4-5) (экстрагент – этанол 50 % (об) с триметамолом 1,37 %) – 185,0 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются бензалкония хлорид 50 % раствор, коричника цейлонского коры масло, натрия сахаринат, карбомер, триметамол, муравьиная кислота, этанол 96 %, вода очищенная.

Внешний вид препарата Камистад® и содержимое упаковки

Гель для местного применения.

Гель желто-коричневого цвета.

По 10 г в тубы алюминиевые с навинчивающейся крышкой из полиэтилена. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ШТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия

Штадаштрассе 2-18, 61118 Бад-Фильбель

Тел.: (+49) 6101-60 30

Факс: (+49) 6101-60 32 59

Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Республика Беларусь

АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88

E-mail: med@nizhpharm.ru

Республика Казахстан

ТОО «STADA Kazakhstan», Республика Казахстан

050044, г. Алматы, ул. Нурлана Каппарова, д. 408

тел.: (727) 2222-100

e-mail: almaty@stada.kz

Кыргызская Республика

ОсОО «Штада Кыргызстан», Кыргызская Республика

720005, г. Бишкек, ул. Игембердиева 1а, БЦ "Аврора", офис 604

Листок-вкладыш пересмотрен

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на вебсайте Союза:
<https://eec.eaeunion.org/>