

Листок-вкладыш: информация для пациента

Флавамед® форте шипучие таблетки

Шипучие таблетки, 60 мг

Действующее вещество: амброксола гидрохлорид



Перед началом приема данного лекарственного препарата внимательно прочтите весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат всегда принимайте в точности так, как описано в данном листке-вкладыше, или же так, как Вам объяснил Ваш врач, работник аптеки или медицинская сестра.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочесть его снова.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или совет, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 4-5 дней Вам следует обратиться к врачу

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Флавамед® форте шипучие таблетки и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед началом приема препарата Флавамед® форте шипучие таблетки
3. Прием препарата Флавамед® форте шипучие таблетки
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Флавамед® форте шипучие таблетки
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 Что из себя представляет препарат Флавамед® форте шипучие таблетки и для чего его применяют

В препарате Флавамед® форте шипучие таблетки содержится действующее вещество амброксола гидрохлорид, который относится к терапевтической группе «Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях, муколитики». Амброксола гидрохлорид применяется для лечения при кашле, сопровождающемся откашливанием мокроты, который связан с острыми или хроническими заболеваниями легких и бронхов.

Показания к применению

Под влиянием препарата Флавамед® форте шипучие таблетки слизь становится более жидкой, и ее легче откашливать.

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки, 60 мг показан взрослым и подросткам старше 12 лет.

2 О чем следует знать перед началом приема препарата Флавамед® форте шипучие таблетки

Противопоказания

Не принимайте препарат Флавамед® форте шипучие таблетки

- Если у Вас аллергия на амброксола гидрохлорид или любой другой из компонентов данного лекарственного препарата (см. раздел 6).
- У детей в возрасте до 12 лет.



Особые предупреждения и меры предосторожности при применении

Перед приемом препарата Флавамед® форте шипучие таблетки обратитесь за консультацией к своему врачу или работнику аптеки

- Если у Вас в прошлом имели место очень тяжелые реакции повышенной чувствительности со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла).

- Синдром Стивенса-Джонсона представляет собой заболевание, характеризующееся высокой температурой тела и сыпью с образованием пузырей на коже и слизистых оболочках.
- Синдром Лайелла, представляющий угрозу для жизни, известен также, как синдром ошпаренной кожи. Его признаками являются крупные пузыри на коже – как при ожоге.

Имеются сообщения о тяжелых кожных реакциях, связанных с приемом амброксола. Если у Вас появилась кожная сыпь (включая поражения слизистых оболочек рта, горла, носа, глаз, половых органов), прекратите использование препарата Флавамед® форте шипучие таблетки и немедленно обратитесь к своему врачу.

- Если Вы страдаете непереносимостью гистамина. В этом случае следует избегать длительного приема препарата Флавамед® форте шипучие таблетки, так как его действующее вещество оказывает влияние на обмен гистамина и может вызвать симптомы непереносимости (например, головная боль, насморк, зуд).
- Если Вы страдаете нарушением функции почек или тяжелым заболеванием печени. В таких случаях Вам следует принимать препарат Флавамед® форте шипучие таблетки лишь с соблюдением особой осторожности (т.е. с более длительными промежутками времени между приемами или в меньшей дозе – обратитесь за советом к своему врачу). При тяжелых нарушениях функции почек возможно накопление продуктов распада действующего вещества препарата Флавамед® форте шипучие таблетки.
- Если Вы страдаете редким заболеванием бронхов, сопровождающемся усиленной выработкой слизи (например, синдром неподвижных ресничек). При этом удаление слизи из легких становится невозможным. В этом случае Вам следует принимать Флавамед® форте шипучие таблетки только под наблюдением врача.
- Если Вы в прошлом страдали язвенной болезнью, Вам следует посоветоваться со своим врачом, как принимать препарат Флавамед® форте шипучие таблетки, поскольку муколитики могут нарушать барьерные свойства слизистой оболочки желудка. Перед приемом препарата Флавамед® форте шипучие таблетки проконсультируйтесь со своим врачом.

Дети и подростки

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки можно применять у подростков только старше 12 лет.

Другие препараты и препарат Флавамед® форте шипучие таблетки


Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта.

Средства, подавляющие кашель (противокашлевые средства)

Во время приема препарата Флавамед® форте шипучие таблетки какие-либо лекарственные средства, подавляющие кашлевой рефлекс (так называемые противокашлевые средства) использовать нельзя. Кашлевой рефлекс важен для откашливания разжиженной мокроты и, таким образом, для ее удаления из легких.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.



Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки допустимо принимать во время беременности или кормления грудью исключительно по прямому указанию Вашего врача!

Беременность

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки не рекомендуется применять, главным образом, в течение первых трех месяцев беременности.

Грудное вскармливание

Установлено, что действующее вещество препарата Флавамед® форте шипучие таблетки переходит в молоко матери. В период кормления грудью препарат Флавамед® форте шипучие таблетки к использованию не рекомендуется.

Фертильность

В исследованиях на животных вредного воздействия амброксола на фертильность не обнаружено.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки не влияет или же оказывает незначительное воздействие на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов.

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки содержит лактозу, сорбит и натрий

Лактоза

Если у Вас непереносимость сахара некоторых видов, то, прежде чем принимать данный лекарственный препарат, посоветуйтесь со своим врачом.

Сорбит

В одной шипучей таблетке данного лекарственного препарата содержится 29,29 мг сорбита. Если у Вас непереносимость сахара некоторых видов, то, прежде чем принимать данный лекарственный препарат, посоветуйтесь со своим врачом.

Натрий

В одной шипучей таблетке данного лекарственного препарата содержится 126,5 мг натрия (основной компонент поваренной/столовой соли). Это соответствует 6,33% от рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления натрия с пищей для взрослого человека.

3 Прием препарата Флавамед® форте шипучие таблетки

Всегда принимайте препарат в точности так, как описано в данном листке-вкладыше, или же в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При отсутствии дополнительных указаний врача Флавамед® форте шипучие таблетки принимают так, как описано ниже. Соблюдайте инструкцию по применению, поскольку в противном случае препарат Флавамед® форте шипучие таблетки не будет действовать должным образом!

Рекомендуемая доза:

Возраст	Доза при однократном приеме	Макс. суточная доза
Подростки старше 12 лет и взрослые	В первые 2-3 суток по ½ таблетки 3 раза в сутки (соответствует 30 мг амброксола гидрохлорида 3 раза в сутки),	1½ шипучей таблетки (соответствует 90 мг амброксола гидрохлорида)

	затем по ½ таблетки 2 раза в сутки (соответствует 30 мг амброксола гидрохлорида 2 раза в сутки)	ЛП-№008364-ГП-BY УТВЕРЖДЕНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИКАЗОМ от 24.04.2026 № 450 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008
--	---	--

Примечание:

Взрослым суточная доза может быть повышена до 1 таблетки два раза в сутки.

Безопасность и эффективность препарата Флавамед® форте шипучие таблетки при лечении детей младше 12 лет пока не установлены.

Способ применения

Для приема внутрь. Шипучие таблетки следует растворить в стакане воды и после еды этот раствор выпить.

Шипучую таблетку можно разделить на части с равными дозировками.

Длительность лечения

Флавамед® форте шипучие таблетки не следует принимать дольше 4-5 дней без консультации с врачом.

Если на протяжении 4-5 дней Ваше состояние не улучшится или даже ухудшится, следует немедленно обратиться к врачу!

Если Вам кажется, что действие препарата Флавамед® форте шипучие таблетки слишком сильное или же слишком слабое, сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки.

Если Вы приняли препарата Флавамед® форте шипучие таблетки больше, чем следовало

Как сообщалось, симптомы, наблюдаемые при случайной передозировке и/или ошибке при использовании препарата, схожи с возможными побочными действиями препарата Флавамед® шипучие таблетки, 60 мг при его приеме в рекомендуемых дозах.

В случае передозировки обратитесь к врачу, который должен назначить лечение в соответствии с возникшими признаками передозировки.

Если Вы забыли принять препарат Флавамед® форте шипучие таблетки

или приняли его слишком мало, просто примите лекарственный препарат в назначенной дозе в обычное время следующего приема.

Не принимайте препарат в двойной дозе для восполнения забытого приема.

Если у Вас имеются дальнейшие вопросы относительно использования данного лекарственного средства, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.

4 Возможные нежелательные реакции

Как и все лекарственные средства, этот препарат может вызывать побочные действия, хотя они возникают не у всех.

Побочные действия

Часто (могут наблюдаться у 1 из 10 человек):

- дисгевзия (т.е. изменение вкусовых ощущений)
- тошнота, снижение чувствительности рта и горла.

Иногда (могут наблюдаться у 1 из 100 человек):


- рвота, понос, нарушение пищеварения, болевые ощущения в желудке и сухость во рту
- повышение температуры тела.

Редко (могут наблюдаться у 1 из 1000 человек):

- реакции повышенной чувствительности
- сыпь, крапивница.

Неизвестно (на основании имеющихся данных частота оценке не поддается):

- анафилактические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек (быстро развивающийся отек кожи и тканей подкожной клетчатки, слизистой оболочки тканей подслизистого слоя) и зуд;
- тяжелые нежелательные реакции со стороны кожи (включая многоформную эритему, синдром Стивенса-Джонсона /токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез);
- сухость в горле.



Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные побочные действия, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о побочных действиях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата. Вы также можете сообщить о побочных действиях непосредственно через систему оповещения государств-членов Евразийского экономического союза.

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

Адрес: 0051, Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Тел.: +(374 10) 20-05-05, +(374 96) 22-05-05, эл. почта: vigilance@pharm.am

Веб-страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pharm.am

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242-00-29, факс: +375 (17) 242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

Веб-страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rceth.by

5 Хранение препарата Флавамед® форте шипучие таблетки

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не используйте данный лекарственный препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке мультидозовой емкости и на складной коробочке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 30°C.

С целью защиты от света и влаги мультидозовую емкость хранить плотно закрытой.

Никакие лекарственные препараты не выбрасывайте в канализацию или с бытовым мусором. В отношении утилизации уже ненужного Вам лекарственного препарата проконсультируйтесь у работника аптеки. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6 Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки содержит

Действующим веществом является амброксола гидрохлорид.

В одной шипучей таблетке содержится 60 мг амброксола гидрохлорида.

Прочие компоненты:

Лимонная кислота безводная

Натрия гидрокарбонат

Натрия карбонат безводный

Сахарина натриевая соль

Натрия цикламат

Натрия хлорид


Натрия цитрат

Лактоза безводная

Маннит (Е 421)

Сорбит (Е 420)

Вишневый ароматизатор «ALH» (код 801), в котором содержатся пропиленгликоль и бензиловый спирт
Симетикон



Внешний вид препарата Флавамед® форте шипучие таблетки и содержимое упаковки

Круглые, белые таблетки диаметром 18 мм и насечкой для деления на одной стороне.
Шипучую таблетку можно разделить на части с равными дозировками.

Препарат Флавамед® форте шипучие таблетки выпускается в упаковках по 10 шипучих таблеток.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
Глиникер Вег 125
12489 Берлин, Германия

Представитель держателя регистрационного удостоверения

Все претензии потребителей следует направлять местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Армения
Представительство компании «Берлин-Хеми АГ»
Адрес: 0010, Ереван, ул. Арами д. 4, кв. 3
Тел.: +(374 11) 500-771; +(374 11) 500-773
Факс: +(374 11) 500-772
Эл. почта: office-armenia@berlin-chemie.com

Республика Беларусь
Представительство компании «Берлин-Хеми АГ»
Адрес: 220004, Минск, ул. Замковая, 27, офис 2
Тел.: +(375 17) 270-26-80, +(375 17) 270-26-81
Факс: +(375 17) 270-26-84
Эл. почта: bc-bel-minsk@berlin-chemie.com

Листок-вкладыш пересмотрен: 12.2020.

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза – www.eaeunion.org