

Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш  
по медицинскому применению лекарственного средства

**Эликсир грудной**  
**раствор для внутреннего применения**

**Название лекарственного средства** Эликсир грудной.

**Название лекарственной формы** Раствор для внутреннего применения.

**Общая характеристика** Жидкость темно-коричневого цвета, сладкого вкуса, с запахом аммиака и масла анисового. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

**Состав лекарственного средства**

|                                                                                      | <u>на 30 мл:</u> | <u>на 50 мл:</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>Действующие вещества:</i>                                                         |                  |                  |
| Солодкового корня экстракт густой<br>(DER соотношение: 4 – 4,5:1, экстрагент - вода) | - 6,21 г         | - 10,35 г        |
| Аммиака раствор концентрированный                                                    | - 0,414 г        | - 0,69 г         |
| <i>Вспомогательные вещества:</i>                                                     |                  |                  |
| Анисовое масло                                                                       | - 0,102 г        | - 0,17 г         |
| Этиловый спирт 90 %                                                                  | - 6,123 мл       | - 10,205 мл      |
| Вода очищенная                                                                       | - до 30 мл       | - до 50 мл       |

В 1 мл лекарственного средства содержится не менее 29 мг кислоты глицирризиновой.

Лекарственное средство содержит не менее 14,0 % (об/об) этанола.

**Фармакотерапевтическая группа** Отхаркивающие средства в комбинации.

**Фармакологические свойства**

Фармакологические свойства лекарственного средства обусловлены наличием в нем экстракта солодкового корня густого и раствора аммиака. Комбинированное лекарственное средство оказывает отхаркивающее действие.

**Показания к применению**

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы**

Эликсир грудной содержит растительные природные компоненты, при хранении возможно появление незначительного осадка. Перед употреблением необходимо взбалтывать.

Взрослым (включая пациентов пожилого возраста) внутрь по 20-30 капель, желательно разведенных в небольшом объеме теплой воды, 3-4 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.

Длительность применения составляет 1 неделю. Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Если был пропущен очередной прием лекарственного средства, то не следует увеличивать следующую за ним дозу, а продолжить употребление лекарственного средства в рекомендованной врачом дозе.

*Применение у детей*

Применение у детей до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием данных.

## **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота). При длительном приеме или приеме в высоких дозах возможно развитие минералокортикоидных эффектов: задержка натрия и воды, развитие отеков, потеря калия, повышение артериального давления, гипокалиемия.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

## **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, гипокалиемия, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, аритмии, артериальная гипертензия и гипертоническая болезнь, заболевания печени и/или почек, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период лактации.

## **Передозировка**

Известно о случаях передозировки при длительном применении (более 4-6 недель) и/или потреблении большого количества солодки, которые проявлялись такими симптомами, как задержка воды, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

*Лечение:* Снижение дозы или временное прекращение приема лекарственного средства. При необходимости проводят симптоматическую терапию.

В случае появления симптомов передозировки необходимо обратиться к врачу.

## **Меры предосторожности**

Поскольку лекарственное средство обладает слабительным эффектом, с осторожностью следует применять при наличии диареи. Не принимать одновременно со стимулирующими слабительными или другими лекарственными средствами, которые могут увеличить электролитный дисбаланс.

При длительном применении больших доз лекарственного средства в течение длительного периода может увеличиваться накопление воды, вызывая отеки рук и ног. Экскреция натрия уменьшается и калия увеличивается. Артериальное давление может повыситься.

Корень *Glycyrrhizae* не следует принимать одновременно с кортикостероидами.

Пациентам, принимающим препараты солодки, не следует употреблять другие продукты, содержащие солодку, из-за риска серьезных нежелательных явлений, которые могут произойти, таких как гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма.

Препараты солодки не следует применять у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, заболеваниями почек, печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями, при гипокалиемии, поскольку они более чувствительны к неблагоприятным последствиям приема солодки.

В связи с увеличением потери калия, корень солодки не следует назначать для длительного использования с тиазидными и петлевыми диуретиками или сердечными гликозидами.

Из-за уменьшения выделения натрия и воды, эффективность препаратов, используемых в лечении артериальной гипертензии, при совместном применении с экстрактом солодки может быть снижена.

Совместное использование с антиаритмическими препаратами (прокаинамид, хинидин) повышает риск развития гипокалиемии и тяжелой желудочковой тахикардии типа *torsades de pointes*.

## **Применение у детей**

Применение у детей до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.


## **Беременность и период лактации**

Безопасность препаратов из корня солодки во время беременности и в период кормления грудью не была установлена. В качестве меры предосторожности лекарственное средство не следует применять во время беременности и в период кормления грудью.

Исследования на животных установили наличие репродуктивной токсичности.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развивается нарушение дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо обратиться к врачу.

Данный препарат содержит не менее 14% об. этанола, то есть 69 – 104 мг на разовую дозу (20-30 капель), что равно 1,8 – 2,6 мл пива, 0,7 – 1,1 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом.



*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению движением транспортных средств*  
Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения следует отказаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, которая требует повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Одновременное применение Эликсира грудного с тиазидными и петлевыми диуретиками повышает риск развития гипокалиемии. Гипокалиемия, обусловленная длительным применением лекарственного средства, может потенцировать токсическое действие сердечных гликозидов.

При одновременном приеме лекарственного средства с глюкокортикостероидами возможно увеличение периода полувыведения кортизола.

Не рекомендуется одновременное применение Эликсира грудного с лекарственными средствами, снижающими образование мокроты, а также противокашлевыми лекарственными средствами центрального и периферического действия, т.к. подавляя кашлевой рефлекс, они замедляют освобождение дыхательных путей от секрета, ухудшают аэродинамику респираторного тракта и процессы оксигенации легких.

Необходимо избегать одновременного приема других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем:

дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин;

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Условия хранения и срок годности**

В защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Без рецепта.

### **Упаковка**

30 мл во флаконах из темного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми вместе с листком-вкладышем в упаковке № 1.

50 мл во флаконах из темного стекла, укупоренных пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми вместе с листком-вкладышем в упаковке № 1.

### **Информация о производителе**

СОАО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 52А,

тел./факс: + 375 17 394-92-18

e-mail: office@ferane.by