

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

Чага (черный березовый гриб)
порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах № 20 в пачке
Inonotus obliquus (Fungus betulinus)

Общая характеристика:

кусочки гриба различной формы, от черного, темно- или красновато-коричневого до желтоватого цвета, проходящие сквозь сито (2000). Ткань гриба плотная, твердая. Запах отсутствует.

Чага (черный березовый гриб) содержит пигменты, образующие хромогенный полифенолкарбонный комплекс, агарициновую кислоту, смолы, марганец и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Порошок крупный.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые при желудочно-кишечных заболеваниях и нарушениях метаболизма.

Фармакологические свойства. Биологически активные вещества, входящие в состав чаги, обладают противовоспалительным действием, оказывают влияние на метаболические процессы.

Показания к применению. В качестве симптоматического средства при дискинезиях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии; в комплексной терапии астенических состояний.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 1 фильтр-пакет помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают 1 стаканом кипяченой теплой воды (40°C–50°C). Настаивают 48 часов в темном прохладном месте (8°C–15°C) при редком перемешивании (3–4 раза). Водное извлечение употребляют по 1 стакану за 30 мин. до еды 3 раза в день.

Лечение препаратами чаги проводят курсами по 3–5 месяцев с короткими перерывами между ними 7–10 дней.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. При длительном приеме препаратов чаги возможны повышенная возбудимость, вегетативная лабильность, диспепсические явления.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Гиперчувствительность. Беременность, периода лактации, детский возраст до 18 лет.

Передозировка. При длительном приеме препаратов чаги у некоторых пациентов наблюдается повышенная возбудимость вегетативной нервной системы. Эти явления постепенно исчезают при уменьшении дозы или отмене препарата.

При появлении симптомов передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Во время приема препаратов чаги пациенту рекомендуется молочно-растительная диета, ограничивается прием жиров и мяса, исключаются консервы, копчености, острые приправы, не употреблять алкогольные напитки и не курить.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение во время беременности и кормления грудью. Применение во время беременности и кормления грудью противопоказано.

Применение у детей. Применение у детей до 18 лет противопоказано.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.


Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не рекомендуется назначать препараты чаги во время лечения пенициллинами и внутривенном введении декстрозы.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги, света и недоступном для детей месте при температуре 15°C-25°C. Приготовленное водное извлечение при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности: 2 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.



Упаковка. По 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке картонной. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест»

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел.8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by