

 <p>МЕД-ИНТЕРПЛАСТ</p>	<p align="center">НЕЙРОМЕД ФОРТЕ, КАПСУЛЫ В КОНТУРНОЙ ЯЧЕЙКОВОЙ УПАКОВКЕ</p>	<p align="center">ЛП-№014292-РГ-ВУ УТВЕРЖДЕНО МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 03.04.2026 № 382 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003</p>
<p>Общий технический документ Модуль 1</p>	<p align="center">МОДУЛЬ 1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p>	

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДАЛЕЕ - ОХЛП), ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ (ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ) (ДАЛЕЕ - ИМП), МАРКИРОВКА:

1.3.1. ПРОЕКТЫ ИМП СОСТАВЛЕННЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДАЕМЫМИ КОМИССИЕЙ.

Листок-вкладыш – информация для пациента

Нейромед форте, 200 мг + 100 мг + 0,2 мг, капсулы

Действующие вещества: пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) + тиамин гидрохлорид (витамин В1) + цианокобаламин (витамин В12)

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Нейромед форте и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Нейромед форте.
3. Прием препарата Нейромед форте.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Нейромед форте.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Нейромед форте и для чего его применяют

Препарат Нейромед форте представляет собой лекарственный препарат, который содержит комбинацию витаминов группы В – тиамин (В1), пиридоксин (В6) и цианокобаламин (В12). Они являются необходимыми питательными веществами, которые не могут быть синтезированы самим организмом.

Прием терапевтических доз витаминов В1, В6 и В12 обеспечивает необходимую потребность в витаминах при недостаточном их поступлении с пищей.

Показания к применению

Препарат Нейромед форте показан к приему у взрослых при неврологических расстройствах различного происхождения, вызванных недостаточностью витаминов В1, В6 и В12, которые не могут быть устранены путем коррекции питания.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, через 30 дней необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Нейромед форте

Противопоказания

Не принимайте препарат Нейромед форте:

- если у Вас аллергия на тиамин (витамин В1) и (или) пиридоксин (витамин В6), цианокобаламин (витамин В12) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- препарат нельзя принимать детям и подросткам младше 18 лет в связи с высоким содержанием активных компонентов.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Нейромед форте проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите врачу:

- если Вы длительно (более 6-12 месяцев) принимаете витамин В6 в суточной дозе 50 мг и у Вас стали возникать: покалывание, онемение, нарушение чувствительности той или иной зоны, уменьшение подвижности в конечности (например, слабость при сжатии кулака);
- если у Вас диагностирован фуникулярный миелоз или пернициозная анемия;
- если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров. Препарат Нейромед форте содержит в качестве вспомогательного вещества 143,8 мг лактозы моногидрат в одной капсуле.

Лекарства, содержащие витамин В12, могут искажать результаты лабораторных исследований.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Нейромед форте

Сообщите своему лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или намерены принимать какие-либо другие лекарства.

Витамин В1 теряет свой эффект при одновременном применении с цитостатиком 5-фторурацилом (средством, используемым для лечения опухолевых заболеваний).

Ингибиторы желудочной секреции (антациды) снижают усвоение витамина В1.

При длительном лечении некоторыми мочегонными средствами (диуретиками), например фуросемидом, может возникнуть дефицит витамина В1, который возникает из-за того, что с мочой выводится больше витамина В1.

Одновременное введение антагонистов пиридоксина (например, изониазида, гидралазина, Д-пеницилламина) может увеличивать потребность в витамине В6. Циклосерин может увеличить потребность в витамине В6.

Во время приема Нейромед форте не принимайте поливитаминные комплексы, включающие в составе витамины группы В.

Препарат Нейромед форте с пищей и алкоголем

Препарат рекомендуется принимать во время или после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.

Не рекомендуется запивать чаем, так как резко снижается всасывание тиамина.

Алкоголь и черный чай снижают усвоение витамина В1.

Витамин В1 может разрушаться при одновременном употреблении напитков, содержащих сульфиты (например, вина), и, следовательно, становится неэффективным. Во время приема Нейромед форте не рекомендуется одновременно употреблять алкогольные напитки.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

При беременности и в период кормления грудью применение препарата Нейромед форте не рекомендовано в связи с высоким содержанием витаминов.

Витамины В1, В6 и В12 проникают через плацентарный барьер и экскретируются в грудное молоко, однако, риск возникновения передозировки у новорожденного не установлен. Следует принимать во внимание, что большие концентрации витамина В6 (пиридоксина) могут угнетать лактацию. При необходимости приема препарата в период лактации, грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не влияет.

Препарат Нейромед форте содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Нейромед форте содержит краситель понсо 4R (E 124)

Препарат Нейромед форте содержит в составе вспомогательных компонентов краситель понсо 4R (E 124), который может вызывать аллергические реакции.

3. Прием препарата Нейромед форте

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослым: по 1 капсуле 1 раз в день. В отдельных случаях доза может быть увеличена: по 1 капсуле 3 раза в день.

Продолжительность применения определяется врачом.

Продолжительность лечения

Продолжительность применения определяется врачом.

При лечении более 4-х недель следует принять решение о возможности снижения дозы.

Применение у детей

Данные о эффективности и безопасности применения препарата у детей в возрасте от 0 до 18 лет отсутствуют.

Путь и (или) способ введения

Препарат принимают внутрь во время или после еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Не следует запивать чаем.

Если Вы приняли препарата Нейромед форте больше, чем следовало

Не принимайте препарат в большей дозе, чем рекомендуется.

Если Вы приняли большее количество препарата, чем следовало, обратитесь к врачу. По возможности возьмите с собой упаковку с данным лекарственным препаратом и/или данный листок-вкладыш.

Не было зарегистрировано симптомов передозировки витамина В1 после перорального применения.

Длительный прием (более 6-12 месяцев) доз витамина В6 более 50 мг в день и кратковременный прием (более 2 месяцев) доз более 1 г в день может оказывать нервно-повреждающее (нейротоксическое) действие. При приеме более 2 г в день, описаны повреждения нервов с двигательными и сенсорными расстройствами, судороги и в отдельных случаях изменения показателей крови и воспалительные кожные реакции.

В редких случаях после приема внутрь высоких доз витамина В12 возможны аллергические реакции, экзема кожи и мягкая форма акне.

Лечение должно быть поддерживающим и симптоматическим.

Если Вы забыли принять препарат Нейромед форте

Если Вы забыли принять дозу препарата, продолжайте принимать препарат в следующий раз, как описано в инструкции по дозированию выше. Не удваивайте дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием дозы.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Нейромед форте может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При возникновении аллергической реакции прекратите прием препарата и обратитесь к врачу. В случае серьезной аллергической реакции необходимо срочно обратиться к врачу.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в животе, головная боль, головокружение;

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- аллергические реакции, проявляющиеся потливостью, тахикардией, кожными реакциями, зудом кожных покровов и сыпью;

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- длительное применение препарата (в течение 6-12 месяцев) может вызвать развитие таких симптомов, как расстройства равновесия и координации движений, болевой синдром в ступнях и кистях, мышечная слабость, чувство онемения конечностей.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, необходимо прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Нейромед форте

Срок годности 2 года.

Хранить в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка) для защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Вы не должны использовать настоящий лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке или на контурной ячейковой упаковке после фразы «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Нейромед форте содержит

Действующими веществами, которые содержатся в одной капсуле являются: пиридоксина гидрохлорид – 200,0 мг, тиамин мононитрат – 100,0 мг, цианокобаламин (в виде витамина В12 1% SD) – 0,2 мг.

Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, магния стеарат, тальк, повидон К30, лактоза моногидрат.

состав желатиновой капсулы № 0: желатин, вода очищенная, титана диоксид (Е 171), понсо 4R (Е 124).

Внешний вид препарата Нейромед форте и содержимое упаковки

Нейромед форте – твердые желатиновые капсулы цилиндрической формы с полусферическими концами с корпусом белого цвета и крышечкой темно-красного цвета.

Первичная упаковка

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке (блистере) из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

Вторичная упаковка

По три или шесть контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Иностранное производственное унитарное предприятие «Мед-интерпласт»,

222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, ком. 204.

Тел/факс: +375 (1770) 2-30-72; тел: +375 (1770) 6-19-39.

Адрес электронной почты: info@med-interplast.com

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

Иностранное производственное унитарное предприятие «Мед-интерпласт»,

223060, Минская область, Минский район, район дер. Большое Стиклево, Новодворский с/с, 40/2-61, почтовый ящик №43

e-mail: fnadzor@med-interplast.com

тел. +375 17 227-10-00 или +375 44 536 91 37

www.med-interplast.com

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен на русском языке в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза, сайт уполномоченного органа <https://www.rceth.by>