

Листок-вкладыш: информация для потребителя
Сенадексин ФТ, 70 мг, таблетки
Действующее вещество: сеннозиды А и В

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда принимайте лекарственный препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Сенадексин ФТ, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Сенадексин ФТ.
3. Прием препарата Сенадексин ФТ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Сенадексин ФТ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Сенадексин ФТ, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Сенадексин ФТ являются сеннозиды, которые действуют как стимулирующее слабительное средство.

Препарат Сенадексин ФТ является растительным препаратом для кратковременного применения при запоре у взрослых и детей старше 12 лет.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Сенадексин ФТ

Противопоказания

Не принимайте препарат Сенадексин ФТ:

- если у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас кишечная непроходимость, сужение или паралич кишечника;
- если у Вас хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит);
- если у Вас боли в животе неизвестной причины;
- если у Вас тяжелое обезвоживание (нарушение водного и электролитного баланса);
- если у Вас заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые могут привести к хирургическому вмешательству (аппендицит, дивертикулит, перитонит);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- в детском возрасте до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Сенадексин ФТ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у Вас заболевания печени или почек;
- если у Вас хронические воспалительные заболевания кишечника.

Препарат рекомендуется применять только в том случае, если нормализации опорожнения кишечника не удастся достичь изменением диеты; нужно принимать минимальную эффективную дозу, необходимую для восстановления нормальной функции кишечника.

Если причина запора неизвестна или есть жалобы со стороны пищеварительного тракта (боль в животе, тошнота и рвота), то перед началом приема слабительных средств необходимо, чтобы врач установил причину запора, поскольку эти симптомы могут быть признаками непроходимости кишечника, начинающейся или уже имеющейся.

Препарат предназначен для эпизодического применения, поэтому принимать препарат более 1 недели следует с осторожностью и после предварительной консультации с врачом, поскольку длительное применение слабительных средств, стимулирующих деятельность кишечника, может привести к усилению атонии кишечника.

Препарат не следует применять в течение 2 часов после применения других лекарственных препаратов или в дозах, превышающих рекомендуемые.

Взрослым, страдающим от недержания кала (инконтиненции), при приеме препарата следует избегать длительного контакта кожи с калом путем смены прокладок (салфеток).

Дети

Препарат не следует применять у детей в возрасте до 12 лет.

Другие препараты и препарат Сенадексин ФТ

Сообщите Вашему лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат снижает эффективность препаратов, которые медленно всасываются в пищеварительном тракте. При одновременном применении с хинидина сульфатом (антиаритмический препарат) возможно снижение уровня действующих веществ в крови из-за конкурирующих свойств с антрахиноновыми слабительными средствами. Одновременное применение с сердечными гликозидами вследствие гипокалиемии может вызвать сердечную аритмию.

При одновременном применении с антиаритмическими средствами, диуретиками (мочегонные препараты) и кортикостероидами развивается мышечная слабость.

При длительном применении и/или применении в высоких дозах препарат нарушает абсорбцию тетрациклинов.

Одновременное применение с лекарственными препаратами, вызывающими гипокалиемию (в том числе с диуретиками, кортикостероидами и корнем солодки), может привести к нарушению баланса электролитов.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Безопасность применения препарата Сенадексин ФТ во время беременности не установлена. Применение препарата во время беременности и грудного вскармливания противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились.

3. Прием препарата Сенадексин ФТ

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые и дети старше 12 лет: по 1-2 таблетки перед сном.

Максимальная суточная доза – 2 таблетки.

Особые группы пациентов

Дети

Применение препарата у детей в возрасте до 12 лет противопоказано.

Пациенты пожилого возраста

Пациентам пожилого возраста рекомендуется начинать лечение с 1 таблетки 1 раз в сутки.

Способ применения

Препарат следует принимать внутрь, запивая небольшим количеством жидкости. Следует принимать минимальную эффективную дозу, необходимую для восстановления нормальной функции кишечника.

Не рекомендуется принимать препарат более 1 недели без консультации врача.

Если Вы приняли препарата Сенадексин ФТ больше, чем следует

Если Вы приняли большее количество препарата, чем следовало, обратитесь к врачу или в ближайшее отделение скорой помощи/больницы. По возможности возьмите с собой упаковку с данным лекарственным препаратом и/или данный листок-вкладыш. При передозировке возможно появление сильных схваткообразных болей в животе, развитие сильной диареи с последующим нарушением водно-электролитного баланса.

Если Вы забыли принять препарат Сенадексин ФТ

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Примите рекомендованную Вам следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно другим лекарственным препаратам Сенадексин ФТ может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

Нарушения со стороны иммунной системы

Аллергические реакции (кожные высыпания, зуд, крапивница, локальная или генерализованная экзантема).

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Боль и спазмы в животе, жидкий стул. При длительном применении/злоупотреблении возможно развитие пигментации слизистой оболочки кишечника (псевдомеланоз кишечника), которая обычно проходит, когда пациент прекращает прием препарата.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей

Изменение окраски мочи (красная или коричневая в зависимости от показателя рН, что не имеет клинического значения). При длительном применении/злоупотреблении – протеинурия (белок в моче), гематурия (кровь в моче).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в

том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях лекарственного препарата напрямую (см. реквизиты ниже).

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29; факс +375 (17) 242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

<http://rceth.by>

5. Хранение препарата Сенадексин ФТ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке картонной) для защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Сенадексин ФТ содержит

Действующим веществом являются сеннозиды А и В.

Каждая таблетка содержит 70,0 мг сенны листьев экстракта сухого (*Sennae folii extractum siccum*) (17-26):1, что соответствует содержанию суммы гидроксипропиранильных гликозидов в пересчете на сеннозид В 14,0 мг.

Экстрагент: метанол-вода (90:10, об/об).

Прочими вспомогательными веществами являются: натрия крахмалгликолят (тип А), кукурузный крахмал, гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная, кальция карбонат, повидон (К30), магния стеарат, натрия лаурилсульфат, целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ 102).

Внешний вид препарата Сенадексин ФТ и содержимое упаковки

Таблетки. Круглые двояковыпуклые таблетки с риской на одной стороне от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с вкраплениями.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой. Каждые 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещены в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

ООО «Фармтехнология»

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22

Телефон/факс: (017) 309 44 88

E-mail: ft@ft.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа Евразийского экономического союза www.rceth.by