

## Листок-вкладыш – информация для потребителя

### ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус, 25 мг/г, аэрозоль для местного применения

Действующее вещество: биклотимол

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 5 дней, Вам следует обратиться к врачу.

#### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус.
3. Применение препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### **1. Что из себя представляет препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус, и для чего его применяют**

Препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус содержит действующее вещество биклотимол, которое относится к фармакотерапевтической группе: препараты для лечения заболеваний горла, антисептики.

Биклотимол относится к классу бифенолов. Активность биклотимола направлена в основном на грамположительные микроорганизмы: в исследованиях *in vitro* максимальный эффект проявлялся уже через 15 минут воздействия на бактериальную взвесь раствором биклотимола с максимальной концентрацией (90%).

#### **Показания к применению**

Препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус применяется у взрослых и детей в возрасте от 6 до 18 лет для местного лечения острых инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и глотки.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 5 дней, необходимо обратиться к врачу.

#### **2. О чем следует знать перед применением препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус**

##### **Противопоказания**

Не применяйте препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус:

- если у Вас аллергия на биклотимол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).
- детский возраст до 6 лет.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не оставляйте этот лекарственный препарат в доступном для детей месте.

Во время использования флакон держать вертикально. Перед применением флакон взболтать.

Длительное использование (более 5 дней) нежелательно, так как оно может изменить естественный баланс микробов в горле, что повышает риск распространения бактериальной или грибковой инфекции.

В случае сохранения симптомов более 5 дней и/или появления сопутствующей лихорадки проконсультируйтесь с лечащим врачом.

#### **Дети и подростки**

Препарат не предназначен для применения у детей младше 6 лет.

#### **Другие препараты и препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Этот лекарственный препарат содержит биклотимол. Не принимайте препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус вместе с другими препаратами, содержащими биклотимол, поскольку это может привести к превышению максимальной рекомендуемой дозы.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В качестве меры предосторожности лучше не применять биклотимол во время беременности и при грудном вскармливании.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

#### **Препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус содержит соевый лецитин**

Препарат содержит соевый лецитин. Если у Вас аллергия на арахис или сою, не применяйте этот препарат.

#### **Препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус содержит бензиловый спирт**

Препарат содержит 35 мг бензилового спирта на дозу (2 распыления). Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и легкое местное раздражение.

#### **Препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус содержит натрий**

Этот лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на распыление, то есть он по сути не содержит натрия.

### **3. Применение препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### Рекомендуемая доза

Взрослым и детям старше 6 лет: по 2 распыления 3 раза в день.

### Применение у детей и подростков

Препарат противопоказан детям до 6 лет.

### Способ применения

Местно в ротоглотке.



ПОВЕРНУТЬ



НАЖАТЬ



ДА



НЕТ

**ВСТРЯХИВАТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ**

Для распыления достаточно повернуть стержень наконечника по оси на четверть оборота.

**ДЕРЖАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО ВО ВРЕМЯ РАСПЫЛЕНИЯ.**

### Продолжительность лечения

Курс лечения не более 5 дней.

**Если Вы применили препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус больше, чем следовало**

Применяйте препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату.

Данные о случаях передозировки отсутствуют.

При наличии вопросов по применению препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Прекратите применение препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:**

*Очень редко:* отек Квинке, отек губ, эритема, кожная сыпь, крапивница.

### *Другие возможные нежелательные реакции*

*Частота неизвестна:* повышенная чувствительность к биклотимолу или другим компонентам препарата, таким как соевый лецитин.

### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а

Телефон/факс: 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.rceth.by](http://www.rceth.by)

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефоны: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

Электронная почта: info@ampra.am

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://pharm.am/>

## **5. Хранение препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус**

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке и на флаконе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Срок годности 3 года.

Не подвергайте воздействию высоких температур.

Не выбрасывайте препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки как следует утилизировать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Препарат ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус содержит**

Действующим веществом является биклотимол.

1 г препарата содержит биклотимол – 25 мг

Прочими вспомогательными веществами являются бензиловый спирт, динатрия эдетат, ароматизатор «тропические фрукты» (ароматизирующие вещества, натуральные ароматизирующие вещества, пропиленгликоль (E1520)), аммония глицирризинат, натрия сахаринат, целлюлоза диспергируемая, лецитин соевый, глицерол, этанол 96%, вода.

**Внешний вид препарата ГЕКСАСПРЕЙ® тропический вкус и содержимое упаковки**

Аэрозоль для местного применения представляет собой однородную суспензию белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом тропических фруктов.

По 30 г в стеклянном флаконе, покрытом снаружи пластиком (ПВХ), закрытом пластиковой крышкой с распылительным клапаном, с листком-вкладышем в картонной пачке.

**Категория отпуска лекарственного препарата**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Франция

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Адрес: Иммебль «ля Вильсон», 70 авеню дю Женераль де Голль, 92800 Пюто

Телефон: 00 33 1 45 19 10 00

Факс: 00 33 1 47 31 46 08

Адрес электронной почты: LBR-PV-Infomed@recordati.com

**Производитель**

Франция

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Адрес: Парк Мекатроник, 03410 Сен-Виктор

**За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:**


Республика Беларусь

Представительство ООО «Fic Medical»

Адрес: 220036, г. Минск, пр-т Дзержинского, д.3 «Б», оф. 80

Тел/факс +375 (17) 378 07 71

Электронная почта: [pv@recordati.by](mailto:pv@recordati.by)



Республика Армения

Представительство «ФИК Медикаль» ООО в Армении

Адрес: 0010, Ереван, Армения, ул. В. Саргсяна 26, 8 сектор, комната 11

Телефон: +374 (10) 56-77-55

Электронная почта: [info.armenia@recordati.com](mailto:info.armenia@recordati.com), [CIS@recordati.com](mailto:CIS@recordati.com)

**Листок-вкладыш пересмотрен 02.2026**

### **Прочие источники информации**

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа Евразийского экономического союза <http://eec.eaeunion.org>.