ЛП-№014841-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 06.05.2026 № 530
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012

Листок-вкладыш - информация для пациента
Лордес, 2,5 мг/5 мл, сироп
Действующее вещество: дезлоратадин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Лордес и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Лордес.
3. Прием препарата Лордес.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Лордес.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Лордес и для чего его принимают

Препарат Лордес содержит действующее вещество дезлоратадин. Относится к группе антигистаминных средств.
Дезлоратадин облегчает течение аллергических реакций, снижая зуд и уменьшая отек.
Препарат практически не вызывает сонливости. Действие препарата начинается в течение 30 минут после приема и продолжается в течение 24 часов.
Показания к применению
Препарат Лордес применяется у взрослых и детей с 6 месяцев и старше при:
− аллергическом рините (для устранения или облегчения чихания, заложенности носа, выделения слизи из носа, зуда в носу, зуда неба, зуда и покраснения глаз, слезотечения);
− крапивнице (для уменьшения или устранения кожного зуда, сыпи).
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Лордес

Противопоказания
Не принимайте препарат Лордес:
- если у Вас аллергия на дезлоратадин, лоратадин, а также на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.
Особые указания и меры предосторожности
Перед приемом препарата Лордес проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

ЛП-№014841-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 06.05.2026 № 530
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012

До начала приема препарата Лордес обязательно сообщите врачу:
- если у Вас (или у ребенка, которому Вы собираетесь дать препарат) есть заболевание почек с нарушением их функции;
- если у Вас (или у ребенка, которому Вы собираетесь дать препарат) когда-либо были судорожные припадки. Если судорожный припадок произойдет в период применения препарата Лордес, его прием необходимо прекратить и обратиться к врачу.

Дети

Препарат Лордес не предназначен для применения у детей в возрасте младше 6 месяцев.

Другие препараты и препарат Лордес

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Лордес с пищей, напитками и алкоголем

Препарат Лордес можно принимать независимо от приема пищи.

Соблюдайте осторожность при приеме препарата Лордес с алкоголем, так как при совместном приеме дезлоратадина с алкоголем, отмечались случаи непереносимости алкоголя и алкогольного опьянения.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Вам не рекомендуется принимать Лордес, если Вы беременны или кормите грудью ребенка.

Данные о влиянии на мужскую/женскую фертильность отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

По имеющимся данным, применение данного лекарственного препарата в рекомендуемой дозе не будет оказывать влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Хотя у большинства пациентов не отмечается сонливость, рекомендуетя воздерживаться от деятельности, требующей умственного напряжения, такой как управление транспортными средствами или работа с механизмами, пока не будет определена Ваша собственная реакция на данный препарат.

Препарат Лордес содержит пропиленгликоль, натрий, сахар, натрия бензоат и сорбитол

Лордес содержит 500 мг пропиленгликоля в 5 мл сиропа.

Если Вашему ребенку меньше 5 лет, прежде чем дать ему данный лекарственный препарат, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, особенно если ребенок получает другие лекарственные препараты, содержащие пропиленгликоль или алкоголь.

Данный лекарственный препарат содержит 30,21 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) (1,31 ммоль) на 5 мл и 60,42 мг натрия (2,62 ммоль) на 10 мл, что эквивалентно 1,5% и 3% соответственно от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

Лордес содержит сахар (2 г на 5 мл сиропа). Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу. Длительный прием лекарственного препарата (две недели и более) может вызывать повреждения зубов.

Лордес содержит 1 мг натрия бензоата на 1 мл сиропа. Натрия бензоат может усиливать желтуху (пожелтение кожи и глаз) у новорожденных (в возрасте до 4 недель).

ЛП-№014841-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 06.05.2026 № 530
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012

Лордес содержит 1 г сорбитола на 5 мл сиропа. Сорбитол является источником фруктозы. Если лечащий врач сообщил, что у Вас (или Вашего ребенка) непереносимость некоторых сахаров или у Вас диагностирована наследственная непереносимость фруктозы (ННФ) — редкое генетическое нарушение, при котором человек не может усваивать фруктозу, прежде чем Вы (или Ваш ребенок) начнете применять или получать данный лекарственный препарат, посоветуйтесь с лечащим врачом.

3. Прием препарата Лордес

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые и подростки старше 12 лет:
10,0 мл сиропа (5,0 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки.

Применение у детей

Дети от 6 месяцев до 11 лет:
- в возрасте от 6 до 11 месяцев: по 2,0 мл сиропа (1 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки;
- в возрасте от 1 до 5 лет: по 2,5 мл сиропа (1,25 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки;
- в возрасте от 6 до 11 лет: по 5,0 мл сиропа (2,5 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки.

Путь и (или) способ введения

Проглотите сироп, а затем выпейте немного воды. Лордес можно принимать независимо от приема пищи.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения определит Ваш лечащий врач, она будет зависеть от тяжести и типа заболевания.

Если Ваш аллергический ринит носит прерывистый характер (наличие симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в год), Ваш врач порекомендует Вам схему лечения, которая будет зависеть от оценки истории Вашего заболевания.

Если Ваш аллергический ринит является стойким (присутствие симптомов в течение 4 дней или более в неделю и более 4 недель в год), Ваш врач может порекомендовать Вам более длительное лечение. При стойком аллергическом рините Лордес следует принимать в течение всего периода контакта с аллергеном.

При крапивнице следует принимать препарат до исчезновения симптомов, индивидуальная продолжительность терапии определяется врачом.

Особые группы пациентов

Дети

Лордес применяют с 6 месяцев.

У детей до 2 лет диагноз аллергического ринита довольно сложно отличить от других форм ринита. Форму ринита и необходимость приема данного препарата определит лечащий врач Вашего ребенка на основании осмотра и, при необходимости, лабораторных анализов.

Пациенты пожилого возраста

Следует соблюдать осторожность при выборе дозы из-за более высокой вероятности нарушения функции печени, почек или сердца у пожилых людей, а также, необходимо учитывать наличие сопутствующих заболеваний или прием других препаратов.

Пациенты с нарушением функции печени

Данные по применению Лордеса у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют.

ЛП-№014841-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 06.05.2026 № 530
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012

Пациенты с нарушением функции почек
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью Лордес следует принимать с осторожностью.
Если Вы приняли препарата Лордес больше, чем следовало
Принимайте препарат Лордес так, как Вам предписано. При случайном приеме внутрь большого количества препарата необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Если есть возможность, возьмите с собой упаковку препарата, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.
Если Вы забыли принять препарат Лордес
Если Вы забыли принять препарат вовремя, примите его как можно скорее, а затем вернитесь к обычному графику приема. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Лордес может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Прекратите прием препарата Лордес и немедленно обратитель к врачу, если у Вас возникнут какие-либо из перечисленных ниже серьезных нежелательных реакций – Вам может потребоваться неотложная медицинская помощь:
Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):
• кожные покровы становятся холодными, влажными и синюшными, снижается артериальное давление, потеря сознания, одышка (анафилаксия);
• выраженные отёки на губах, веках, щеках, слизистой оболочке рта, могут распространяться на слизистую оболочку гортани, что может вызывать затруднение дыхания, отмечается охриплость голоса, лающий кашель (ангионевротический отек);
• галлюцинации
• судороги
• тупые боли в правом подреберье, увеличение размеров печени (гепатит)
Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):
• неадекватное поведение;
• агрессия;
• нарушение электрической активности сердца, которое может повлиять на сердечный ритм (удлинение интервала QT на электрокардиограмме);
• желтоватый оттенок кожи, белков глаз (желтуха).
Другие нежелательные реакции:
Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
• головная боль
• сухость во рту
• повышенная утомляемость
Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):
• головокружение
• сонливость
• бессонница
• чрезмерная двигательная активность и повышенная возбудимость (психомоторная гиперактивность)
• ощущение сердцебиения
• увеличение частоты сердцечных сокращений (тахикардия)

ЛП-№014841-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 06.05.2026 № 530
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012

• боль в животе
• тошнота
• рвота
• дискомфорт и боли в животе (диспепсия)
• диарея
• повышение активности ферментов печени (в биохимическом анализе крови)
• повышение концентрации билирубина в крови (в биохимическом анализе крови)
• боль в мышцах (миалгия)
• одышка
• кожный зуд
• сыпь, в том числе крапивница

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):
• повышение аппетита
• повышенная чувствительность кожи и слизистых к солнечному свету (фотосенсибилизация)
• общая слабость (астения)
• увеличение массы тела

Дети и подростки

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10)
• повышенная утомляемость
• сухость во рту
• головная боль
• бессонница
• диарея
• высокая температура

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):
• уменьшение частоты сердечных сокращений
• нарушение ритма сердца
• атипичное поведение
• агрессия

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь
Адрес: 220037 г. Минск, пер. Товарищеский, 2а
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Телефон: +375(17) 242 00 29
Факс: +375(17) 242 00 29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: http://www.rceth.by/

Российская Федерация
Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Телефон: +7 (499) 578-06-70; +7 (499) 578-02-20
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

ЛП-№014841-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 06.05.2026 № 530
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012

Сайт: https://roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Лордес

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.
Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на флаконе и картонной пачке после «Годен до:».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните при температуре не выше 25˚С.
Срок годности после вскрытия флакона: 6 месяцев, но не более срока годности, указанного на упаковке.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Лордес содержит
Действующим веществом является дезлоратадин.
Каждый 1 мл сиропа содержит 0,5 мг действующего вещества. 5 мл сиропа содержат 2,5 мг действующего вещества.
Прочими вспомогательными веществами являются: пропиленгликоль, лимонная кислота безводная, натрия цитрат (Е331), натрия бензоат (Е211), динатрий эдетат, сахар, сорбитол 70%, каротин, красный очаровательный (Е129), ароматизатор тутти-фрутти, вода очищенная.
Препарат Лордес содержит пропиленгликоль, натрий, сахар и сорбитол (см. раздел 2).
Внешний вид препарата Лордес и содержимое упаковки
Вязкая жидкость оранжевого цвета с характерным запахом, прозрачная.
150 мл во флаконе из оранжевого стекла, укупоренном пластиковой крышкой, вместе с ложкой мерной пластиковой объемом 5 мл и инструкцией по применению (листком-вкладышем) в коробку картонную.
Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Турция
Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.
г. Стамбул, квартал Инкылап, ул. Доктора Аднана Бююкдениза, 14, р-н Умрание
Номер телефона: +90(216) 633 60 00
Номер факса: +90(216) 633 60 01
Адрес электронной почты: bizeulasin@nobel.com.tr

Производитель
Турция
Нобел Илач Санайи Ве Тиждарет А.Ш.
Адрес: г. Дюздже, д. Санджаклар, ул. Эски Акчакоджа № 299

Различные торговые наименования
Лорказид® (Российская Федерация)

ЛП-№014841-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 06.05.2026 № 530
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь
Представительство АО «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Немига, дом 5, этаж 4, помещение 71
Телефон: +375 (17) 388-03-84
Адрес электронной почты: nobel@nobel.by

Российская Федерация
Представительство АО «Нобел Илач Санайи Ве Тиджарет А.Ш.»
119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2, Бизнес-центр «Навигатор»
Телефон/факс: +7(495) 982-36-84/85
Адрес электронной почты: adversereaction@drugsafety.ru

Прочие источники информации
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза http://eec.eaeunion.org/.