

Листок-вкладыш – информация для потребителя

Пантесепт, 100 мг+16 мг, суппозитории вагинальные

Действующие вещества: декспантенол+хлоргексидин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Пантесепт и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Пантесепт.
3. Применение препарата Пантесепт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Пантесепт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Пантесепт и для чего его применяют

Препарат Пантесепт содержит декспантенол и хлоргексидин.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии (исключая комбинации с кортикостероидами). Прочие противомикробные и антисептические средства.

Декспантенол – витамин группы В (производное пантотеновой кислоты), стимулирует восстановление (регенерацию) тканей и уменьшает выраженность воспаления.

Хлоргексидин – противомикробное средство (антисептик). Благодаря сочетанию этих компонентов препарат Пантесепт защищает поверхность слизистых оболочек влагалища от инфекций, подавляет течение инфекционного процесса и ускоряет заживление.

Показания к применению

Препарат Пантесепт применяется у взрослых в возрасте от 18 лет по следующим показаниям:

- Острые и хронические вагиниты.
- Бактериальный вагиноз.
- Неспецифические эндо/экзоцервициты (в том числе в сочетании с истинной эрозией шейки матки).
- Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии: перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, родоразрешением, медицинским прерыванием беременности, внутриматочными обследованиями (в том числе гистероскопии, гистеросальпингографии), перед установкой внутриматочного контрацептива.

– Для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Пантесепт

Противопоказания

Не применяйте препарат Пантесепт если у Вас аллергия на декспантенол и/или хлоргексидин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Пантесепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов.

До и после применения препарата следует вымыть руки.

Дети

Препарат Пантесепт противопоказан детям в возрасте от 0 до 18 лет.

Другие препараты и препарат Пантесепт

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Не следует применять одновременно с другими антисептиками, вводимыми интравагинально.

Препарат Пантесепт не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально.

Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Пантесепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Пантесепт не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Пантесепт

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат Пантесепт вводят по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.

Применение у детей и подростков

Данные о применении у детей и подростков в возрасте до 18 лет отсутствуют.

Путь и (или) способ введения

Для интравагинального применения.

Перед применением препарата рекомендуется провести гигиенические процедуры и тщательно вымыть руки. Суппозиторий следует извлечь из контурной упаковки и ввести глубоко во влагалище.

Продолжительность терапии

Курс лечения 7 – 10 дней.

При необходимости курс лечения можно продлить до 20 дней.

Если Вы применили препарата Пантесепт больше, чем следовало

Применяйте препарат Пантесепт в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату.

Не превышайте рекомендованные дозы. Продолжительность терапии определяется лечащим врачом.

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Если Вы забыли применить препарат Пантесепт

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Пантесепт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- Раздражение слизистой оболочки влагалища (жжение, зуд),
- Сукровичные выделения из влагалища.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- Аллергические реакции: сыпь, зуд, крапивница.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- Тяжелые аллергические реакции и анафилаксия.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Тел.: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

Кыргызская Республика

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Тел.: + 996 (312) 21-92-78

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт: <https://dlsmi.kg/>

Республика Армения

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5


ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Тел.: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16 82

Горячая линия: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am, info@ampra.am

Сайт: <http://pharm.am>



5. Хранение препарата Пантесепт

Храните лекарственный препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 15 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Пантесепт содержит

Действующими веществами являются декспантенол и хлоргексидин.

Один суппозиторий содержит 100 мг декспантенола и 16 мг хлоргексидина биглюконата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются макрогол 1500, макрогол 400.

Внешний вид препарата Пантесепт и содержимое упаковки

Препарат Пантесепт представляет собой суппозитории белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается неоднородность окраски в виде мраморности и наличие воронкообразного углубления.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из полимерных материалов (ПВХ/ПЭ).

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

ООО «Рубикон», 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,

e-mail: secretar@rubikon.by

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа Евразийского экономического союза <http://eec.eaeunion.org>.