

Листок-вкладыш – информация для потребителя
Назорин® с эвкалиптом, 1 мг/мл, спрей назальный
Действующее вещество: нафазолин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 3 дня, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Назорин® с эвкалиптом, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Назорин® с эвкалиптом.
3. Применение препарата Назорин® с эвкалиптом.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Назорин® с эвкалиптом.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Назорин® с эвкалиптом, и для чего его применяют
Препарат Назорин® с эвкалиптом содержит в качестве действующего вещества нафазолин и обладает сосудосуживающим и противоотечным действием. Препарат вызывает сужение расширенных вследствие воспаления сосудов слизистой оболочки носа, что приводит к уменьшению отека слизистой оболочки и выделения слизи из носа, околоносовых пазух и евстахиевой трубы, которая соединяет среднее ухо и глотку. Это обеспечивает свободное носовое дыхание. Терапевтический эффект обычно начинается через 5 минут и продолжается около 4-6 часов.

Показания к применению

Препарат Назорин® с эвкалиптом применяют для облегчения симптомов острого ринита, синусита, воспаления евстахиевой трубы и среднего отита. Назорин® с эвкалиптом при отите можно применять только после консультации с врачом.

Препарат можно применять подросткам старше 15 лет и взрослым.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Назорин® с эвкалиптом

Противопоказания

Не применяйте препарат Назорин® с эвкалиптом:

- если у Вас аллергия на нафазолина нитрат или любые другие компоненты препарата, (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас высокое артериальное давление или имеются заболевания сердца;

- если у Вас гипертиреоз (избыточная функция щитовидной железы);
- если Вы страдаете сухим воспалением слизистой оболочки носа (проявляющимся ощущением сухости в носу и образованием корочек в носовых ходах);
- если у Вас тяжелые заболевания глаз, закрытоугольная глаукома;
- если Вы принимаете антидепрессанты;
- в детском возрасте до 15 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Назорин® с эвкалиптом проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если Вы страдаете серьезными заболеваниями сердца и сосудов (сердечная недостаточность, высокое артериальное давление);
- если Вы страдаете нарушением обмена веществ (сахарный диабет, повышенная активность щитовидной железы);
- если у Вас опухоль надпочечников (феохромоцитома);
- если Вы страдаете бронхиальной астмой;
- если Вы получаете терапию препаратами, используемыми для лечения депрессии или болезни Паркинсона (ингибиторы моноаминоксидазы), или другими препаратами, которые могут повысить артериальное давление.

В качестве лечения первой линии рекомендуется промывать нос физиологическим раствором. Данный препарат можно использовать в качестве лечения второй линии не более 5 дней подряд.

Не превышайте рекомендуемые дозы (см. раздел 3). Длительное применение лекарственного препарата может вызывать головные боли, бессонницу, сердцебиение, тошноту. Может развиваться сухость и раздражение слизистой оболочки носа.

Дети и подростки

Препарат нельзя применять детям и подросткам младше 15 лет.

Другие препараты и препарат Назорин® с эвкалиптом

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

При одновременном применении препарата Назорин® с эвкалиптом с некоторыми препаратами, применяемыми для лечения депрессии или болезни Паркинсона (ингибиторами моноаминоксидазы, трициклическими антидепрессантами), может наблюдаться повышение артериального давления.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не применяйте препарат Назорин® с эвкалиптом во время беременности и кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат не оказывает влияния или незначительно влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с движущимися механизмами.

Препарат Назорин® с эвкалиптом содержит бензалкония хлорид, бор и натрий

Лекарственный препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение и/или отек слизистой оболочки носа, особенно при длительном применении.

Спрей назальный содержит в одной дозе (0,1 мл) около 1,23 мг борной кислоты (что эквивалентно 0,22 мг бора) и около 3,3 мкг тетрабората натрия, (что эквивалентно 0,73 мкг бора). Такое количество бора не оказывает отрицательного влияния на фертильность, на эмбрион и плод.

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, то есть по сути «не содержит натрия».

3. Применение препарата Назорин® с эвкалиптом

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые и дети с 15 лет: применять по 1-3 впрыскивания в каждый носовой ход 3 раза в сутки (с интервалом не менее 4 часов).

Не превышайте указанные дозы. Длительное применение лекарственного препарата может вызывать головные боли, бессонницу, учащенное сердцебиение, тошноту. Может развиваться сухость и раздражение слизистой оболочки носа.

Путь и (или) способ введения

Лекарственный препарат доставляется в носовые ходы путем впрыскивания с помощью назальной распыляющей насадки.

С насадки на флаконе снимите защитный колпачок. Держите флакон с лекарственным препаратом вертикально, введите насадку в ноздрю, нажмите на клапан и одновременно сделайте вдох носом.

Перед использованием лекарственного препарата рекомендуется очистить носовые ходы.

Наконечник распыляющей насадки после использования лекарственного препарата необходимо протереть.

Не рекомендуется пользоваться одним и тем же флаконом нескольким лицам во избежание распространения инфекции.

Продолжительность терапии

Длительность применения – не более 5 дней. Если носовое дыхание становится свободным, применение препарата можно прекратить раньше. Повторное применение возможно только через несколько дней после его отмены.

Если Вы применили препарата Назорин® с эвкалиптом больше, чем следовало

В случае если Вы применили большее количество препарата Назорин® с эвкалиптом, чем следовало, или случайно проглотили раствор, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу или в ближайшее отделение скорой помощи/больницы. По возможности возьмите с собой упаковку с данным лекарственным препаратом и/или данный листок-вкладыш.

Дети

Существует несколько описанных случаев отравления у детей в результате случайного приема или применения слишком высоких доз. Первыми симптомами являются нарушение сердечного ритма и нерегулярный пульс. Реже возникают учащение частоты сердечных сокращений и повышение артериального давления. Если передозировка тяжелая, могут возникнуть гипотермия, потоотделение, потеря сознания, кома или угнетение дыхания.

Взрослые

Передозировки у взрослых не наблюдалось.

Лечение

При передозировке прекратите применение лекарственного препарата и немедленно обратитесь к врачу. При необходимости неотложная терапия проводится в специализированном отделении стационара с обеспечением поддержания адекватной дыхательной функции. При случайном проглатывании внутрь в значительных количествах в качестве неотложной доврачебной помощи можно применять активированный уголь.

Если Вы забыли применить препарат Назорин® с эвкалиптом

Если вы забыли применить очередную дозу препарата, сделайте это, как только вспомните. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

У особо чувствительных пациентов иногда могут возникать нежелательные реакции, такие как жжение и сухость слизистой оболочки носа. В редких случаях после прекращения действия препарата может возникнуть сильная заложенность носа.

Очень редко (и при передозировке) из-за возбуждения симпатической нервной системы могут возникать следующие нежелательные реакции: нервозность, головные боли, тремор, увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия), ощущение сердцебиения, повышение артериального давления, повышенное потоотделение и тошнота.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29; факс: +375 (17) 242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

<https://www.rceth.by/>

5. Хранение препарата Назорин® с эвкалиптом

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Назорин® с эвкалиптом содержит

Действующим веществом является нафазолин.

1 мл раствора содержит 1,0 мг нафазолина нитрата.

Прочими вспомогательными веществами являются: борная кислота, натрия хлорид, макроголглицерина гидроксистеарат, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, эвкалиптовое масло, натрия тетраборат, вода очищенная.

Внешний вид препарата Назорин® с эвкалиптом и содержимое упаковки

Спрей назальный.

Прозрачный или слегка опалесцирующий, бесцветный или желтоватый раствор с запахом эвкалипта.

По 10 мл или 20 мл во флаконе полиэтиленовом, укупоренном насадкой распыляющей полипропиленовой назальной.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещен в пачку из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

ООО «Фармтехнология»

220024 г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон/факс: (017) 309 44 88.

E-mail: ft@ft.by.

За любой информацией о препарате, а также о случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза www.rceth.by