ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

Листок-вкладыш – информация для пациента

Тикагрелор-НАН, 60 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тикагрелор-НАН, 90 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: тикагрелор

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Тикагрелор-НАН, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Тикагрелор-НАН.
3. Прием препарата Тикагрелор-НАН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Тикагрелор-НАН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Тикагрелор-НАН, и для чего его применяют

Препарат Тикагрелор-НАН содержит действующее вещество тикагрелор. Он относится к группе лекарственных препаратов, называемых антитромботическими препаратами.

Показания к применению
Препарат Тикагрелор-НАН в сочетании с ацетилсалициловой кислотой (АСК) (другим антитромботическим препаратом) применяется только у взрослых. Вам назначили этот препарат, если у Вас был:
- сердечный приступ или
- нестабильная стенокардия (боль в груди, которую нельзя контролировать).

Препарат снижает вероятность повторного сердечного приступа, инсульта или смерти от сердечно-сосудистого заболевания.

Способ действия препарата Тикагрелор-НАН
Препарат Тикагрелор-НАН воздействует на клетки, называемые тромбоцитами. Эти маленькие клетки крови помогают останавливать кровотечения, слипаясь вместе, чтобы закрыть крошечные отверстия в порезанных или поврежденных кровеносных сосудах.
Однако тромбоциты могут образовывать тромбы - сгустки внутри пораженных кровеносных сосудов сердца и головного мозга. Это может быть очень опасно, потому что:
- сгусток крови может полностью перекрыть кровоснабжение, что может привести к сердечному приступу (инфаркту миокарда) или инсульту, или
- сгусток может частично блокировать кровеносные сосуды, ведущие к сердцу; это уменьшает приток крови к сердцу и является причиной боли в груди, которая то возникает, то пропадает (так называемая «нестабильная стенокардия»).

ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793

Препарат Тикагрелор-НАН препятствует слипанию тромбоцитов. Это снижает вероятность образования тромба, который может снизить кровоток.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Тикагрелор-НАН

Противопоказания
Не принимайте препарат Тикагрелор-НАН:
- если у Вас аллергия на тикагрелор или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).
- если у Вас кровотечение в активной фазе.
- если у Вас был инсульт, вызванный кровоизлиянием в головной мозг.
- если у Вас тяжелое заболевание печени.
- если Вы принимаете какой-либо из следующих препаратов:
  - кетоконазол (используется для лечения грибковых инфекций)
  - кларитромицин (используется для лечения бактериальных инфекций)
  - нефазодон (антидепрессант)
  - ритонавир и атазанавир (применяются для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД).

Не принимайте Тикагрелор-НАН, если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки перед приемом препарата.

Особые указания и меры предосторожности
Перед приемом препарата Тикагрелор-НАН проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если:
- у Вас повышенный риск развития кровотечения вследствие:
  - недавней серьезной травмы;
  - недавнего хирургического вмешательства (включая стоматологические вмешательства, проконсультируйтесь с Вашим стоматологом);
  - заболевания, которое влияет на свертываемость крови;
  - недавнего желудочного или кишечного кровотечения (например, из язвы желудка или «полипов» толстой кишки);
- Вам предстоит операция (включая стоматологическое лечение) в любое время, пока Вы принимаете препарат Тикагрелор-НАН. Это связано с повышенным риском развития кровотечения. Лечащий врач может попросить Вас прекратить прием этого препарата за 5 дней до операции;
- у Вас аномально низкая частота пульса (обычно ниже 60 ударов в минуту), и у Вас не установлено устройство, регулирующее ритм сердца (кардиостимулятор);
- у Вас астма или другие проблемы с легкими или затрудненное дыхание;
- у Вас нерегулярные паттерны дыхания, такие как ускорение, замедление или короткие паузы во время дыхания. Ваш врач решит, нужна ли Вам дальнейшая оценка;
- у Вас были проблемы с печенью или ранее было какое-либо заболевание, которое могло повлиять на Вашу печень;
- анализ Вашей крови, показал большее, чем обычно содержание мочевой кислоты.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам (или Вы не уверены), перед приемом препарата Тикагрелор-НАН проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если Вы совместно принимаете препарат Тикагрелор-НАН и гепарин:
- Ваш врач может назначить Вам анализ крови для проведения диагностических тестов, если он подозревает редкое нарушение функции тромбоцитов, вызванное гепарином. Важно сообщить лечащему врачу, что Вы одновременно принимаете препарат

ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793

Тикагрелор-НАН и гепарин, поскольку препарат Тикагрелор-НАН может повлиять на результат диагностического теста.

Дети и подростки
Препарат Тикагрелор-НАН не рекомендован к применению у детей и подростков младше 18 лет.

Другие препараты и препарат Тикагрелор-НАН
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Тикагрелор-НАН может оказывать влияние на действие некоторых лекарственных препаратов, а некоторые препараты могут оказывать влияние на эффект препарата Тикагрелор-НАН.
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:
- розувастатин (препарат для лечения высокого уровня холестерина);
- более 40 мг симвастатина или ловастатина в день (препараты, применяемые для лечения высокого уровня холестерина);
- рифампицин (антибиотик);
- фенитоин, карбамазепин и фенобарбитал (используются для контроля судорожных припадков);
- дигоксин (используется для лечения сердечной недостаточности);
- циклоспорин (используется для снижения защитных сил организма);
- хинидин и дилтиазем (используется для лечения нарушений сердечного ритма);
- бета-блокаторы и верапамил (используется для лечения высокого кровяного давления);
- морфин и другие опиоиды (применяют для лечения сильной боли).

Обязательно сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов, которые увеличивают риск развития кровотечения:
- «пероральные антикоагулянты», часто называемые «разжижителями крови», которые содержат варфарин;
- нестероидные противовоспалительные препараты (сокращенно НПВП), часто принимаемые в качестве обезболивающих, например, ибупрофен и напроксен;
- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (сокращенно СИОЗС), принимаемые в качестве антидепрессантов, например, пароксетин, сертралин и циталопрам;
- другие препараты, такие как кетоконазол (используется для лечения грибковых инфекций), кларитромицин (используется для лечения бактериальных инфекций), нефазодон (антидепрессант), ритонавир и атазанавир (используются для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД), цизаприд (используется для лечения изжоги), алкалоиды спорыньи (используется для лечения мигрени и головных болей).

Если лечащий врач назначил Вам фибринолитики, часто называемые «растворителями тромбов», например, стрептокиназу или альтеплазу, сообщите врачу, что, поскольку Вы принимаете препарат Тикагрелор-НАН, у Вас может быть повышен риск развития кровотечений.

Беременность и грудное вскармливание
Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
<u>Беременность</u>

ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793

Не рекомендуется принимать препарат Тикагрелор-НАН во время беременности или если Вы планируете беременность. Женщинам следует применять соответствующие методы контрацепции, чтобы избежать беременности при приеме этого препарата.

Кормление грудью

Если Вы кормите грудью, проконсультируйтесь с лечащим врачом прежде, чем принимать этот препарат. Лечащий врач обсудит с Вами все преимущества и риски приема препарата Тикагрелор-НАН во время кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Маловероятно, что препарат Тикагрелор-НАН оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Если Вы чувствуете головокружение или спутанность сознания во время приема препарата, будьте осторожны при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.

3. Прием препарата Тикагрелор-НАН

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Сердечный приступ или нестабильная стенокардия

- Начальная доза - две таблетки по 90 мг одновременно (нагрузочная доза 180 мг). Эту дозу обычно дают в больнице.
- После этой начальной дозы обычная доза составляет одну таблетку 90 мг два раза в день продолжительностью до 12 месяцев, если Ваш врач не назначит иначе.
- Принимайте препарат ежедневно примерно в одно и то же время (например, по одной таблетке утром и вечером).

Сердечный приступ более года назад

- Обычная доза - одна таблетка 60 мг два раза в день. Продолжайте принимать лекарственный препарат до тех пор, пока его прием не отменит Ваш лечащий врач.
- Принимайте препарат ежедневно примерно в одно и то же время (например, по одной таблетке утром и вечером).

Путь и (или) способ введения

Препарат Тикагрелор-НАН предназначен для приема внутрь. Препарат можно принимать вне зависимости от приема пищи.

Если Вы испытываете затруднения при проглатывании таблеток

Если у Вас возникли затруднения с проглатыванием таблетки, то её можно измельчить и смешать с водой следующим образом:

- Измельчите таблетку в мелкий порошок.
- Засыпьте порошок в половину стакана воды.
- Перемешайте и немедленно выпейте.
- Чтобы убедиться, что в стакане не осталось препарата, промойте пустой стакан еще половиной стакана воды и выпейте.

Если Вы находитесь в больнице, Вам могут ввести эту таблетку, смешанную с небольшим количеством воды, с помощью зонда, введенного через нос (назогастральный зонд).

Если Вы приняли препарата Тикагрелор-НАН больше, чем следовало

Если Вы приняли большую дозу препарата Тикагрелор-НАН, чем Вам необходимо, свяжитесь с Вашим врачом или обратитесь в лечебное учреждение незамедлительно.

ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793

Возьмите упаковку с препаратом с собой. У Вас возможен повышенный риск развития кровотечения.

Если Вы забыли принять препарат Тикагрелор-НАН
- Если Вы забыли принять дозу препарата, примите следующую дозу в обычное время.
- Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Тикагрелор-НАН
Перед тем, как прекратить прием препарата Тикагрелор-НАН, Вам следует проконсультироваться с Вашим лечащим врачом. Принимайте этот препарат регулярно и в течение периода времени, назначенного лечащим врачом. Если Вы прекратите принимать препарат Тикагрелор-НАН, то это может увеличить риск возникновения повторного сердечного приступа или инсульта, или смерти от сердечно-сосудистого заболевания.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Тикагрелор-НАН может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При приеме данного препарата могут возникнуть указанные ниже нежелательные реакции.
Препарат Тикагрелор-НАН влияет на свертываемость крови, поэтому большинство нежелательных реакций связано с развитием кровотечения. Кровотечение может возникнуть в любой части тела. Некоторые виды кровотечений являются обычным явлением (например, синяки и носовые кровотечения). Сильное кровотечение случается редко, но может быть опасным для жизни.

Немедленно обратитесь к врачу, если Вы заметили у себя какую-либо из указанных ниже нежелательных реакций – Вам может потребоваться срочная медицинская помощь:
- **Кровоизлияние в мозг или внутричерепное кровоизлияние - это нечастая нежелательная реакция. Она может вызывать симптомы инсульта, такие как:**
  - внезапное онемение или слабость рук, ног или лица, особенно с одной стороны тела;
  - внезапная спутанность сознания, затруднения с речью или пониманием других;
  - внезапное затруднение при ходьбе, потеря равновесия или координации;
  - внезапное головокружение или внезапная сильная головная боль без известной причины.
- **Признаки кровотечения, такие как:**
  - сильное кровотечение или кровотечение, которое невозможно контролировать;
  - неожиданное кровотечение или кровотечение, которое продолжается длительное время;
  - розовый, красный или коричневый цвет мочи;
  - рвота красной кровью или рвота, которая выглядит как кофейная гуща;
  - стул красного или черного цвета (похож на деготь);
  - кашель или рвота сгустками крови.
- **Обморок (потеря сознания)**
  - временная потеря сознания из-за внезапного уменьшения притока крови к мозгу (часто).
- **Признаки нарушения свертываемости крови, называемого тромботической тромбоцитопенической пурпурой (ТТП), такие как:**

ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793

- лихорадка и пурпурные пятна (пурпура) на коже или во рту, с пожелтением кожи или глаз (желтуха) или без пожелтения, необъяснимая сильная усталость или спутанность сознания.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы заметили какую-либо из указанных ниже нежелательных реакций:

- Ощущение одышки является очень частой нежелательной реакцией. Это может быть связано с имеющимся у Вас заболеванием сердца или другой причиной, или это может быть нежелательной реакцией после приема препарата Тикагрелор-НАН. Одышка, вызванная приемом препарата Тикагрелор-НАН, обычно легкая и проявляется в виде внезапного, неожиданного ощущения нехватки воздуха, возникающего обычно в состоянии покоя, и может появиться в первые недели терапии и у многих может исчезнуть со временем. Если ощущение нехватки воздуха усиливается или длится долгое время, сообщите об этом врачу. Ваш врач решит, необходимо ли проводить лечение этого состояния или проводить какие- либо дополнительные исследования.

Другие возможные нежелательные реакции

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- высокий уровень мочевой кислоты в крови (по результатам анализов);
- кровотечение, вызванное заболеваниями крови.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- синяки;
- головная боль;
- головокружение или ощущение, что все кружится вокруг;
- диарея или расстройство пищеварения;
- тошнота;
- запор;
- сыпь;
- зуд;
- сильная боль и припухлость в суставах – это признаки подагры;
- головокружение, чувство дурноты или помутнение зрения - признаки низкого артериального давления;
- носовое кровотечение;
- кровотечение после операции или из порезов (например, во время бритья) и ран обильнее, чем обычно;
- кровотечение из слизистой оболочки желудка (язва);
- кровоточивость десен.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- аллергическая реакция - сыпь, зуд или отёк лица, или отёк губ/языка могут быть признаками аллергической реакции;
- спутанность сознания;
- нарушение зрения, вызванное кровоизлиянием в глаз;
- вагинальное кровотечение, более сильное или происходящее в другое время по сравнению с обычным (менструальным) кровотечением;
- кровоизлияние в суставы или мышцы, вызывающие болезненный отек;
- кровоизлияние в ухо;
- внутреннее кровотечение, которое может вызвать головокружение или плохое самочувствие.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- необычно низкая частота сердечного ритма (обычно ниже 60 ударов в минуту).

ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.
Республика Беларусь
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а
Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29; факс: +375 (17) 242 00 29.
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: https://www.rceth.by

5. Хранение препарата Тикагрелор-НАН

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните при температуре ниже 25 ºС.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Тикагрелор-НАН содержит
Действующим веществом является тикагрелор.
Тикагрелор-НАН, 60 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Каждая таблетка содержит 60 мг.
Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются кальция гидрофосфат дигидрат, натрия крахмалгликолят тип А, гидроксипропилметилцеллюлоза, магния стеарат, маннитол (Е421); *состав оболочки таблетки:* гидроксипропилметилцеллюлоза, макрогол/полиэтиленгликоль, кремния диоксид (Е551), железа оксид красный (Е172).

Тикагрелор-НАН, 90 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Каждая таблетка содержит 90 мг тикагрелора.
Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются кальция гидрофосфат дигидрат, натрия крахмалгликолят тип А, гидроксипропилметилцеллюлоза, магния стеарат, маннитол (Е421); *состав оболочки таблетки:* гидроксипропилметилцеллюлоза, макрогол/полиэтиленгликоль, калия алюминия силикат (Е555), железа оксид красный (Е172).

Внешний вид препарата Тикагрелор-НАН и содержимое упаковки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Тикагрелор-НАН, 60 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой красного цвета с перламутровым блеском.

Тикагрелор-НАН, 90 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки, покрытые оболочкой коричневого цвета с перламутровым блеском.

По 14 или 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки (ПВХ/ПВДХ) и гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги. 4 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

ЛП-№015798-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 09.07.2026 № 793
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Республика Беларусь
Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»
Адрес: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 5, корп. 3.
тел./факс +375-17-268-63-64

Производитель
Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»
Адрес места производства: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 5, корп. 3, пом. 1-9, 11-13, 16, 17, корп. 4.
тел./факс +375-17-268-63-64

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь
Республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ»
Адрес: 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 5, корп. 3, Республика Беларусь.
тел./факс +375-17-268-63-64

Прочие источники информации
Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.