ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Листок-вкладыш - информация для пациента

Римо, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: ривароксабан

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Римо и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Римо.
3. Прием препарата Римо.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Римо.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Римо и для чего его принимают

Препарат Римо содержит действующее вещество ривароксабан, относящееся к группе лекарственных препаратов, называемых «антитромботическими».
Принцип действия препарата заключается в ингибировании фактора свертываемости крови (фактор Ха) и последующем снижении склонности к образованию тромбов.
Показания к применению
Препарат Римо был назначен вам для:
- предотвращения образования тромбов в венах после операции по замене тазобедренного или коленного суставов. Если лечащий врач назначил вам прием данного препарата в постоперационный период, это означает, что у вас повышен риск образования тромбов.
- лечения тромбов в венах ног (тромбоз глубоких вен) и кровеносных сосудах легких (тромбоэмболия легочной артерии), а также предотвращение повторного образования тромбов в кровеносных сосудах ног и/или легких.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Римо

Противопоказания
Не принимайте препарат Римо:

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

- если у Вас аллергия на ривароксабан, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас сильное кровотечение;
- если у Вас заболевание или состояние, которое увеличивает риск возникновения сильного кровотечения (например, язва желудка, травма или кровоизлияние в мозг, недавно перенесенная операция на головном мозге или глазах);
- если Вы принимаете лекарственные препараты для предотвращения свертываемости крови (например, варфарин, дабигатран, апиксабан или гепарин), за исключением случаев смены терапии антикоагулянтами или при введении гепарина через венозный или внутриартериальный катетер путем прокола артерии;
- если у Вас заболевание печени, которое приводит к повышенному риску кровотечения;
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если Вам нет 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Римо проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Соблюдайте особую осторожность при приеме препарата Римо

- в случае повышенного риска кровотечения, что может иметь место при:

• тяжелом заболевании почек, так как функция почек может повлиять на количество лекарственного препарата, воздействующего на организм;

• приеме других лекарственных препаратов для предотвращения свертывания крови (например, варфарин, дабигатран, апиксабан или гепарин), при смене терапии антикоагулянтами или при введении гепарина через венозный или внутриартериальный катетер (см. раздел «Другие препараты и препарат Римо»)

• нарушениях свертываемости крови;

• очень высоком артериальном давлении, которое не поддается терапевтическому контролю;

• заболеваниях желудка или кишечника, которые могут привести к кровотечению, например, воспаление кишечника или желудка или воспаление пищевода, например, из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (заболевание, при котором желудочный сок попадает в пищевод) или опухолях, расположенных в желудке или кишечнике, половых или мочевыводящих путях;

• наличии проблем с кровеносными сосудами в задней части глаз (ретинопатия);

• заболевании легких, при котором бронхи расширены и заполнены гноем (бронхоэктаз),

или наличии в анамнезе легочного кровотечения;

- наличии искусственного сердечного клапана;
- при наличии заболевания, называемого антифосфолипидным синдромом (нарушение со стороны иммунной системы, вызывающее повышенный риск образования тромбов) необходимо сообщить об этом лечащему врачу, который примет решение об изменении

схемы лечения;

- если врач определит, что артериальное давление нестабильно, либо планируется проведение другого лечения или хирургической процедуры по удалению тромба из легких.

Если что-либо из вышесказанного имеет к Вам отношение, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо. Лечащий врач решит, следует ли Вам принимать этот лекарственный препарат, а также оценит необходимость в более пристальном наблюдении.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0016

Если Вам предстоит операция, то очень важно принимать препарат Римо до и после операции точно в то время, которое Вам указал врач.
Если во время операции Вам установят катетер или сделают инъекцию в позвоночник (например, для эпидуральной или спинальной анестезии или уменьшения боли):
• очень важно принимать препарат Римо до и после инъекции или удаления катетера точно в то время, которое Вам указал врач;
• немедленно сообщите лечащему врачу если после окончания действия анестезии Вы почувствуете онемение или слабость в ногах, проблемы с кишечником или мочевым пузырем. Возможно, Вам понадобится срочная медицинская помощь.

Дети

Препарат Римо не предназначен для применения у детей в возрасте младше 18 лет. Информация о применении препарата детьми и подростками является недостаточной.

Другие препараты и препарат Римо

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Если Вы принимаете:
• некоторые препараты для лечения грибковых инфекций (,например, флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол), и они не наносятся на кожу;
• кетоконазол в форме таблеток (применяется для лечения синдрома Кушинга, когда организм вырабатывает избыточное количество кортизола);
• некоторые антибактериальные препараты (например, кларитромицин, эритромицин);
• некоторые противовирусные препараты для лечения ВИЧ/СПИД (например, ритонавир);
• другие препараты для снижения свертываемости крови (например, эноксапарин, клопидогрел, прасугрел, тикагрелор или антагонисты витамина К, такие как варфарин и аценокумарол (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);
• противовоспалительные и обезболивающие препараты (например, напроксен или ацетилсалициловая кислота);
• дронедарон, препарат для лечения нарушения ритма сердца;
• некоторые препараты для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (ИОЗСН)).
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо, так как действие препарата может быть усилено. Лечащий врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Римо, а также оценит необходимость в более тщательном наблюдении.
Если лечащий врач считает, что у Вас повышенный риск развития язв желудка или кишечника, он может назначить профилактическое лечение язвы.
Если Вы принимаете:
• некоторые препараты для лечения эпилепсии (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал);
• зверобой (Hypericum perforatum), растительный лекарственный препарат, используемый при депрессии;
• рифампицин, антибактериальный лекарственный препарат.
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо, потому что эффект препарата может быть уменьшен. Лечащий врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Римо, а также оценит необходимость в более тщательном наблюдении за состоянием здоровья.

Препарат Римо с пищей и напитками

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Препарат Римо можно принимать независимо от приема пищи.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не принимайте препарат Римо при беременности или кормлении грудью. Если существует вероятность наступления беременности, то используйте надежные средства контрацепции во время приема препарата Римо. Если Вы забеременели во время приема данного препарата, немедленно прекратите принимать препарат и сообщите об этом лечащему врачу, который примет решение о выборе схемы лечения. Не принимайте препарат Римо, если Вы кормите грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Римо может снизить Ваше внимание. Могут возникнуть некоторые нежелательные реакции со стороны нервной системы, в том числе головокружение или обморочное состояние. Поэтому убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

Препарат Римо содержит кроскармеллозу натрия и натрия лаурилсульфат

Этот лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Римо

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Для предотвращения образования тромбов в венах после операции по замене тазобедренного или коленного суставов рекомендуемая доза составляет одну таблетку препарата Римо 10 мг 1 раз в день.

Для лечения тромбов в венах ног и тромбов в кровеносных сосудах легких, а также для предотвращения повторного образования тромбов.

После не менее 6 месяцев лечения состояния, при котором образуются тромбы, рекомендуемая доза составляет одну таблетку 10 мг один раз в день, либо одну таблетку 20 мг один раз в день.

Лечащий врач примет решение о продолжении лечения, при котором следует принимать одну таблетку препарата Римо 10 мг один раз в день.

Путь и (или) способ введения

Прием данного лекарственного препарата не зависит от приема пищи.

В случае затруднений при проглатывании таблетки целиком обсудите с лечащим врачом

другие способы приема препарата Римо. Таблетку можно растолочь и смешать с водой или яблочным пюре непосредственно перед приемом.

При необходимости лечащий врач может также ввести измельченную таблетку препарата Римо через желудочный зонд после подтверждения правильного положения желудочного зонда в желудке. Измельченную таблетку следует вводить вместе с небольшим количеством воды через желудочный зонд, после чего его необходимо промыть водой.

Продолжительность терапии

Следует принимать препарат регулярно до его отмены лечащим врачом.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

Для облегчения запоминания времени приема лекарственного препарата, старайтесь принимать препарат каждый день в одно и то же время.
Примите первую таблетку через 6-10 часов после операции.
После обширной операции на тазобедренном суставе обычно следует принимать препарат в течение 5 недель.
После обширной операции на коленном суставе обычно следует принимать препарат в течение 2 недель.
Лечащий врач примет решение о продолжительности лечения.
Различным пациентам может быть необходима различная продолжительность лечения, поэтому Вам следует соблюдать рекомендации лечащего врача.
Если Вы приняли препарата Римо больше, чем следовало
Принимайте Римо только так, как Вам предписано. Если Вы приняли больше препарата, чем Вам было рекомендовано, немедленно обратитесь к врачу. Прием препарата Римо в слишком высокой дозе увеличивает риск развития кровотечения.
Если Вы забыли принять Римо
В случае пропуска приема таблетки 10 мг, следует принять препарат, как только вы вспомните о необходимости приема. Примите следующую таблетку на следующий день, а затем продолжайте принимать препарат один раз в день как обычно.
Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенной дозы.
Если Вы прекратили прием препарата Римо
Не прекращайте прием препарата Римо, не посоветовавшись предварительно с лечащим
врачом, потому что препарат Римо предотвращает развитие тяжелого состояния.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Римо может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Как и другие аналогичные лекарственные препараты для уменьшения образования тромбов, препарат Римо может вызвать потенциально опасное для жизни кровотечение. Чрезмерное кровотечение может привести к резкому снижению артериального давления (шоку).
В некоторых случаях кровотечение может быть не очевидным.
Прекратите прием препарата Римо и немедленно обратитесь к врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:
- признаки кровотечения;
- кровоизлияние в мозг или внутричерепное кровоизлияние (симптомы могут включать головную боль, одностороннюю слабость, рвоту, судороги, снижение уровня сознания и скованность шеи);
Необходима серьезная неотложная медицинская помощь. Немедленно обратитесь за медицинской помощью!
- длительное или обильное кровотечение;
- необычная слабость, усталость, бледность, головокружение, головная боль, отечность неизвестной этиологии, одышка, боль в груди или стенокардия.
Лечащий врач может принять решение о более тщательном наблюдении или об изменении способа лечения.
Признаки тяжелых кожных реакций:
- интенсивная кожная сыпь, волдыри или поражение слизистых оболочек, например рта

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 0006

или глаз (синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз);
- реакция на лекарственный препарат, которая вызывает сыпь, лихорадку, воспаление внутренних органов, нарушения со стороны крови и системные заболевания (синдром DRESS). Эти нежелательные реакции возникают очень редко (у 1 из 10000 человек).

Признаки тяжелых аллергических реакций:
- отечность лица, губ, рта, языка или горла; затрудненное глотание; крапивница и затрудненное дыхание; резкое снижение артериального давления. Тяжелые аллергические реакции возникают очень редко (анафилактические реакции, включая анафилактический шок; возникают у 1 человека из 10000) и нечасто (отек Квинке и аллергический отек; возникают у 1 человека из 100).

Общий список возможных нежелательных реакций

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
- уменьшение количества эритроцитов (анемия), может наблюдаться бледность кожных покровов, слабость или одышка;
- кровотечение в желудке или кишечнике, урогенитальное кровотечение (включая наличие крови в моче и обильные менструальные кровотечения), носовое кровотечение, кровоточивость десен;
- кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в конъюнктиву);
- кровотечение в ткани или полости тела (гематома, кровоподтек);
- кашель с кровью;
- кровотечение из кожных покровов или под ними;
- кровотечение после операции, выделение крови или жидкости из послеоперационной раны;
- боль в конечностях, отек конечностей;
- нарушение функции почек (может быть замечено после проведения соответствующих анализов);
- лихорадка;
- боль в животе, боли, связанные с желудком и кишечником, диспепсия, тошнота, запор,
диарея, рвота;
- низкое артериальное давление (признаками данного состояния может являться головокружение или обморок при вставании);
- снижение общей работоспособности (слабость, утомляемость), головная боль, головокружение;
- сыпь, кожный зуд;
- анализы крови могут показать увеличение некоторых печеночных ферментов.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
- кровоизлияние в мозг или внутричерепное кровоизлияние (см. выше, признаки кровотечения);
- кровоизлияние в сустав, вызывающее боль и отек;
- тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, которые помогают крови свертываться);
- аллергические реакции, в том числе кожные аллергические реакции;
- нарушение функции печени (может быть замечено после проведения соответствующих
анализов);
- анализы крови могут показать повышение билирубина, некоторых ферментов поджелудочной железы или печени или количества тромбоцитов;
- головокружение;
- ухудшение общего самочувствия;

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

- учащенное сердцебиение;
- сухость во рту;
- аллергическая сыпь.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):
- кровоизлияния в мышцы;
- холестаз (снижение оттока желчи), гепатит, в т. ч. гепатоцеллюлярное повреждение (воспаление печени, включая повреждение печени);
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
- локализованный (местный) отек;
- скопление крови (гематома) в паху как осложнение сердечной процедуры, когда катетер вводится в артерию ноги (псевдоаневризма).

Очень редко (могут возникнуть у 1 человека из 10000):
- анафилактические реакции включая анафилактический шок;
- синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз, DRESS синдром;
- накопление эозинофилов, тип белых гранулоцитарных клеток крови, которые вызывают воспаление в легких (эозинофильная пневмония).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):
- почечная недостаточность после сильного кровотечения;
- повышенное давление в тканях мышц ног или рук после кровотечения, которое приводит к боли, отеку, изменению чувствительности, онемению или параличу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь
Адрес: 220037 г. Минск, пер. Товарищеский, 2а
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Телефон: +375(17) 242 00 29
Факс: +375(17) 242 00 29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: http://www.rceth.by/

5. Хранение препарата Римо

Храните препарат в недоступном для детей месте.
Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и картонной пачке после «Годен до:».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните при температуре ниже 30°С в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Препарат Римо содержит
Действующим веществом является ривароксабан.
Каждая таблетка содержит 10 мг действующего вещества.
Прочими вспомогательными веществами являются: маннитол, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилметилцелюллоза, натрия лаурилсульфат, микрокристаллическая целюллоза, магния стеарат, материал пленочной оболочки №102 (Опадрай 04F240006 розовый порошок): гипромеллоза, полиэтиленгликоль, титана диоксид, железа оксид красный (Е172).
Препарат Римо содержит кроскармеллозу натрия и натрия лаурилсульфат (см. раздел 2).
Внешний вид препарата Римо и содержимое упаковки
Светло-красные круглые выпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
По 5 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистер из ПВХ-ПЭ-ПВДХ/алюминия, по 1 блистеру с инструкцией по применению в картонную пачку. По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистер из ПВХ-ПЭ-ПВДХ/алюминия, по 1, 3 или 10 блистеров с инструкцией по применению в картонной пачке.
Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Турция
Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.
г. Стамбул, квартал Инкылап, ул. Доктора Аднана Бююкдениза, 14, р-н Умрание
Номер телефона: +90(216) 633 60 00
Номер факса: +90(216) 633 60 01
Адрес электронной почты: bizeulasin@nobel.com.tr

Производитель
Турция
Нобел Илач Санайи Ве Тиждарет А.Ш.
Адрес: г. Дюздже, д. Санджаклар, ул. Эски Акчакоджа № 299

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь
Представительство АО «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Заслонова, 10
Адрес электронной почты: nobel@nobel.by

Прочие источники информации
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза http://eec.eaeunion.org/.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Листок-вкладыш - информация для пациента

Римо, 2,5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: ривароксабан

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Римо и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Римо.
3. Прием препарата Римо.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Римо.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Римо и для чего его принимают

Препарат Римо содержит действующее вещество ривароксабан, относящееся к группе лекарственных препаратов, называемых «антитромботическими».
Принцип действия препарата заключается в ингибировании фактора свертываемости крови (фактор Ха) и последующем снижении склонности к образованию тромбов.
Показания к применению
Препарат Римо был назначен вам, потому что
- у Вас был диагностирован острый коронарный синдром (группа заболеваний, включающая в себя сердечный приступ и нестабильную стенокардию, сильную боль в груди), и в анализе крови было выявлено увеличение некоторых показателей, связанных с сердечной деятельностью.
Препарат Римо снижает риск развития повторного сердечного приступа у взрослых или снижает риск смерти от болезней, связанных с сердцем или кровеносными сосудами.
Лечащий врач не ограничится назначением приема только препарата Римо.
Он также назначит Вам прием:
• ацетилсалициловой кислоты или
• ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела или тиклопидина.
или
- у Вас был диагностирован высокий риск образования тромбов вследствие ишемической болезни сердца или заболевание периферических артерий, которое вызывает появление симптомов. Препарат Римо снижает риск образования тромбов у

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

взрослых (атеротромботические события). Лечащий врач не ограничится назначением приема только препарата Римо. Он также назначит Вам прием ацетилсалициловой кислоты.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Римо

Противопоказания
Не принимайте препарат Римо:
- если у Вас аллергия на ривароксабан, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас сильное кровотечение;
- если у Вас заболевание или состояние, которое увеличивает риск возникновения сильного кровотечения (например, язва желудка, травма или кровоизлияние в мозг, недавно перенесенная операция на головном мозге или глазах);
- если Вы принимаете лекарственные препараты для предотвращения свертываемости крови (например, варфарин, дабигатран, апиксабан или гепарин), за исключением случаев смены терапии антикоагулянтами или при введении гепарина через венозный или внутриартериальный катетер путем прокола артерии;
- если у Вас острый коронарный синдром и ранее Вы перенесли кровоизлияние в мозг или тромбоз сосуда в головном мозге (инсульт);
- если у Вас ишемическая болезнь сердца или заболевание периферических артерий и ранее Вы перенесли кровоизлияние в мозг (инсульт) или кровоизлияние в ту область, где имела место закупорка мелких артерий, обеспечивающих кровью глубокие ткани мозга (лакунарный инсульт), или если в течение месяца Вы перенесли тромбоз сосуда в головном мозге (ишемический, не лакунарный инсульт);
- если у Вас заболевание печени, которое приводит к повышенному риску кровотечения;
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если Вам нет 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности
Перед приемом препарата Римо проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Препарат Римо не следует использовать в сочетании с некоторыми другими лекарственными препаратами, снижающими свертываемость крови, такими как прасугрел или тикагрелор, кроме ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела/тиклопидина.
Соблюдайте особую осторожность при приеме препарата Римо
- в случае повышенного риска кровотечения, что может иметь место при:
• тяжелом заболевании почек, так как функция почек может повлиять на количество лекарственного препарата, воздействующего на организм;
• приеме других лекарственных препаратов для предотвращения свертывания крови (например, варфарин, дабигатран, апиксабан или гепарин), при смене терапии антикоагулянтами или при введении гепарина через венозный или внутриартериальный катетер (см. раздел «Другие препараты и препарат Римо»)
• нарушениях свертываемости крови;
• очень высоком артериальном давлении, которое не поддается терапевтическому контролю;
• заболеваниях желудка или кишечника, которые могут привести к кровотечению, например, воспаление кишечника или желудка или воспаление пищевода, например,

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (заболевание, при котором желудочный сок попадает в пищевод) или опухолях, расположенных в желудке или кишечнике, половых или мочевыводящих путях;
• наличии проблем с кровеносными сосудами в задней части глаз (ретинопатия);
• заболевании легких, при котором бронхи расширены и заполнены гноем (бронхоэктаз),
или наличии в анамнезе легочного кровотечения;
• возрасте более 75 лет;
• массе тела меньше 60 кг;
- наличии искусственного сердечного клапана;
- при наличии заболевания, называемого антифосфолипидным синдромом (нарушение со стороны иммунной системы, вызывающее повышенный риск образования тромбов) необходимо сообщить об этом лечащему врачу, который примет решение об изменении
схемы лечения.
Если что-либо из вышесказанного имеет к Вам отношение, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо. Лечащий врач решит, следует ли Вам принимать этот лекарственный препарат, а также оценит необходимость в более пристальном наблюдении.
Если Вам предстоит операция, то очень важно принимать препарат Римо до и после операции точно в то время, которое Вам указал врач.
Если во время операции Вам установят катетер или сделают инъекцию в позвоночник (например, для эпидуральной или спинальной анестезии или уменьшения боли):
• очень важно принимать препарат Римо до и после инъекции или удаления катетера точно в то время, которое Вам указал врач;
• немедленно сообщите лечащему врачу если после окончания действия анестезии Вы почувствуете онемение или слабость в ногах, проблемы с кишечником или мочевым пузырем. Возможно, Вам понадобится срочная медицинская помощь.

Дети

Препарат Римо не предназначен для применения у детей в возрасте младше 18 лет. Информация о применении препарата детьми и подростками является недостаточной.

Другие препараты и препарат Римо

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Если Вы принимаете:
• некоторые препараты для лечения грибковых инфекций (например, флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол), и они не наносятся на кожу;
• кетоконазол в форме таблеток (применяется для лечения синдрома Кушинга, когда организм вырабатывает избыточное количество кортизола);
• некоторые антибактериальные препараты (например, кларитромицин, эритромицин);
• некоторые противовирусные препараты для лечения ВИЧ/СПИД (например, ритонавир);
• другие препараты для снижения свертываемости крови (например, эноксапарин, клопидогрел, прасугрел, тикагрелор или антагонисты витамина К, такие как варфарин и аценокумарол (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);
• противовоспалительные и обезболивающие препараты (например, напроксен или ацетилсалициловая кислота);
• дронедарон, препарат для лечения нарушения ритма сердца;

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

• некоторые препараты для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (ИОЗСН)).
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо, так как действие препарата может быть усилено. Лечащий врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Римо, а также оценит необходимость в более тщательном наблюдении.
Если лечащий врач считает, что у Вас повышенный риск развития язв желудка или кишечника, он может назначить профилактическое лечение язвы.
Если Вы принимаете:
• некоторые препараты для лечения эпилепсии (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал);
• зверобой (Hypericum perforatum), растительный лекарственный препарат, используемый при депрессии;
• рифампицин, антибактериальный лекарственный препарат.
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо, потому что эффект препарата может быть уменьшен. Лечащий врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Римо, а также оценит необходимость в более тщательном наблюдении за состоянием здоровья.

Препарат Римо с пищей и напитками

Препарат Римо можно принимать независимо от приема пищи.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Не принимайте препарат Римо при беременности или кормлении грудью. Если существует вероятность наступления беременности, то используйте надежные средства контрацепции во время приема препарата Римо. Если Вы забеременели во время приема данного препарата, немедленно прекратите принимать препарат и сообщите об этом лечащему врачу, который примет решение о выборе схемы лечения. Не принимайте препарат Римо, если Вы кормите грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Римо может снизить Ваше внимание. Могут возникнуть некоторые нежелательные реакции со стороны нервной системы, в том числе головокружение или обморочное состояние. Поэтому убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

Препарат Римо содержит кроскармеллозу натрия и натрия лаурилсульфат

Этот лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Римо

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза приема препарата Римо составляет одну таблетку 2,5 мг два раза в день. Препарат Римо следует принимать каждый день примерно в одно и то же время (например, одну таблетку утром и одну вечером).

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Лечащий врач не ограничится назначением приема только препарата Римо. Он также назначит прием ацетилсалициловой кислоты. При назначении препарата Римо после острого коронарного синдрома лечащий врач также может назначить клопидогрел или тиклопидин.
Если Вы принимаете Римо после процедуры расширения суженной или заблокированной артерии ноги для восстановления кровотока, ваш врач может также назначить Вам на короткое время клопидогрел в дополнение к ацетилсалициловой кислоте.
Лечащий врач укажет необходимую дозу данных лекарственных препаратов (обычно 75-100 мг ацетилсалициловой кислоты в день или суточная доза от 75 до 100 мг ацетилсалициловой кислоты плюс суточная доза клопидогрела, равная 75 мг, или стандартная суточная доза тиклопидина).

Путь и (или) способ введения

Прием данного лекарственного препарата не зависит от приема пищи.
В случае затруднений при проглатывании таблетки целиком обсудите с лечащим врачом
другие способы приема препарата Римо. Таблетку можно растолочь и смешать с водой или яблочным пюре непосредственно перед приемом.
При необходимости лечащий врач может также ввести измельченную таблетку препарата Римо через желудочный зонд после подтверждения правильного положения желудочного зонда в желудке. Измельченную таблетку следует вводить вместе с небольшим количеством воды через желудочный зонд, после чего его необходимо промыть водой.

Продолжительность терапии

Терапию препаратом Римо после острого коронарного синдрома следует начинать как можно скорее после стабилизации состояния, включая процедуры по реваскуляризации.
Начинать прием препарата Римо следует не раньше, чем через 24 часа после поступления в стационар и когда прекращается парентеральная (посредством инъекций) антикоагулянтная терапия.
Лечащий врач укажет, когда следует начинать прием препарата Римо в случае диагностирования ишемической болезни сердца или заболевания периферических артерий.
Лечащий врач примет решение о продолжительности лечения.
Различным пациентам может быть необходима различная продолжительность лечения, поэтому Вам следует соблюдать рекомендации лечащего врача.

Если Вы приняли препарата Римо больше, чем следовало

Принимайте Римо только так, как Вам предписано. Если Вы приняли больше препарата, чем Вам было рекомендовано, немедленно обратитесь к врачу. Прием препарата Римо в слишком высокой дозе увеличивает риск развития кровотечения.

Если Вы забыли принять Римо

Если Вы забыли принять дозу вовремя, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Римо

Принимайте препарат Римо регулярно до отмены препарата лечащим врачом. Не прекращайте прием препарата Римо, не посоветовавшись предварительно с лечащим врачом. Если Вы прекратите прием данного лекарственного препарата, это может увеличить риск развития повторного сердечного приступа или инсульта или смерти от болезни, связанной с работой сердца или кровеносными сосудами.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Римо может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Как и другие аналогичные лекарственные препараты для уменьшения образования тромбов, препарат Римо может вызвать потенциально опасное для жизни кровотечение. Чрезмерное кровотечение может привести к резкому снижению артериального давления (шоку).
В некоторых случаях кровотечение может быть не очевидным.
Прекратите прием препарата Римо и немедленно обратитесь к врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:
- признаки кровотечения;
- кровоизлияние в мозг или внутричерепное кровоизлияние (симптомы могут включать головную боль, одностороннюю слабость, рвоту, судороги, снижение уровня сознания и скованность шеи);
Необходима серьезная неотложная медицинская помощь. Немедленно обратитесь за медицинской помощью!
- длительное или обильное кровотечение;
- необычная слабость, усталость, бледность, головокружение, головная боль, отечность неизвестной этиологии, одышка, боль в груди или стенокардия.
Лечащий врач может принять решение о более тщательном наблюдении или об изменении способа лечения.
Признаки тяжелых кожных реакций:
- интенсивная кожная сыпь, волдыри или поражение слизистых оболочек, например рта
или глаз (синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз);
- реакция на лекарственный препарат, которая вызывает сыпь, лихорадку, воспаление внутренних органов, нарушения со стороны крови и системные заболевания (синдром DRESS). Эти нежелательные реакции возникают очень редко (у 1 из 10000 человек).
Признаки тяжелых аллергических реакций:
- отечность лица, губ, рта, языка или горла; затрудненное глотание; крапивница и затрудненное дыхание; резкое снижение артериального давления. Тяжелые аллергические реакции возникают очень редко (анафилактические реакции, включая анафилактический шок; возникают у 1 человека из 10000) и нечасто (отек Квинке и аллергический отек; возникают у 1 человека из 100).
Общий список возможных нежелательных реакций
Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
- уменьшение количества эритроцитов (анемия), может наблюдаться бледность кожных покровов, слабость или одышка;
- кровотечение в желудке или кишечнике, урогенитальное кровотечение (включая наличие крови в моче и обильные менструальные кровотечения), носовое кровотечение, кровоточивость десен;
- кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в конъюнктиву);
- кровотечение в ткани или полости тела (гематома, кровоподтек);
- кашель с кровью;
- кровотечение из кожных покровов или под ними;
- кровотечение после операции, выделение крови или жидкости из послеоперационной раны;
- боль в конечностях, отек конечностей;

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

- нарушение функции почек (может быть замечено после проведения соответствующих анализов);
- лихорадка;
- боль в животе, боли, связанные с желудком и кишечником, диспепсия, тошнота, запор,
диарея, рвота;
- низкое артериальное давление (признаками данного состояния может являться головокружение или обморок при вставании);
- снижение общей работоспособности (слабость, утомляемость), головная боль, головокружение;
- сыпь, кожный зуд;
- анализы крови могут показать увеличение некоторых печеночных ферментов.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
- кровоизлияние в мозг или внутричерепное кровоизлияние (см. выше, признаки кровотечения);
- кровоизлияние в сустав, вызывающее боль и отек;
- тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, которые помогают крови свертываться);
- аллергические реакции, в том числе кожные аллергические реакции;
- нарушение функции печени (может быть замечено после проведения соответствующих
анализов);
- анализы крови могут показать повышение билирубина, некоторых ферментов поджелудочной железы или печени или количества тромбоцитов;
- головокружение;
- ухудшение общего самочувствия;
- учащенное сердцебиение;
- сухость во рту;
- аллергическая сыпь.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):
- кровоизлияния в мышцы;
- холестаз (снижение оттока желчи), гепатит, в т. ч. гепатоцеллюлярное повреждение (воспаление печени, включая повреждение печени);
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
- локализованный (местный) отек;
- скопление крови (гематома) в паху как осложнение сердечной процедуры, когда катетер вводится в артерию ноги (псевдоаневризма).

Очень редко (могут возникнуть у 1 человека из 10000):
- анафилактические реакции включая анафилактический шок;
- синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз, DRESS синдром;
- накопление эозинофилов, тип белых гранулоцитарных клеток крови, которые вызывают воспаление в легких (эозинофильная пневмония).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):
- почечная недостаточность после сильного кровотечения;
- повышенное давление в тканях мышц ног или рук после кровотечения, которое приводит к боли, отеку, изменению чувствительности, онемению или параличу.

Сообщение о нежелательных реакциях

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
Государственная регистрация

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь
Адрес: 220037 г. Минск, пер. Товарищеский, 2а
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Телефон: +375(17) 242 00 29
Факс: +375(17) 242 00 29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: http://www.rceth.by/

5. Хранение препарата Римо

Храните препарат в недоступном для детей месте.
Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и картонной пачке после «Годен до:».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните при температуре ниже 30°С в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Римо содержит
Действующим веществом является ривароксабан.
Каждая таблетка содержит 2,5 мг действующего вещества.
Прочими вспомогательными веществами являются: маннитол, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилметилцелюллоза, натрия лаурилсульфат, микрокристаллическая целюллоза, магния стеарат, материал пленочной оболочки №109 (Опадрай 03F220114 желтый порошок): гипромеллоза, полиэтиленгликоль, титана диоксид, железа оксид желтый (Е172).
Препарат Римо содержит кроскармеллозу натрия и натрия лаурилсульфат (см. раздел 2).
Внешний вид препарата Римо и содержимое упаковки
Светло-желтые круглые выпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
По 14 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистер из ПВХ-ПЭ-ПВДХ/алюминия.
По 4 или 12 блистеров с инструкцией по применению в картонной пачке.
Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Турция
Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.
г. Стамбул, квартал Инкылап, ул. Доктора Аднана Бююкдениза, 14, р-н Умрание
Номер телефона: +90(216) 633 60 00
Номер факса: +90(216) 633 60 01

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Адрес электронной почты: bizeulasin@nobel.com.tr

Производитель
Турция
Нобел Илач Санайи Ве Тиждарет А.Ш.
Адрес: г. Дюздже, д. Санджаклар, ул. Эски Акчакоджа № 299

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь
Представительство АО «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Заслонова, 10
Адрес электронной почты: nobel@nobel.by

Прочие источники информации
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза http://eec.eaeunion.org/.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Листок-вкладыш - информация для пациента

Римо, 15 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Римо, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: ривароксабан

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Римо и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Римо.
3. Прием препарата Римо.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Римо.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Римо и для чего его принимают

Препарат Римо содержит действующее вещество ривароксабан, относящееся к группе лекарственных препаратов, называемых «антитромботическими».
Принцип действия препарата заключается в ингибировании фактора свертываемости крови (фактор Ха) и последующем снижении склонности к образованию тромбов.
Показания к применению
Препарат Римо был назначен вам для:
- предотвращения образования тромбов в головном мозге (инсульт) и других кровеносных сосудах при наличии нерегулярного сердечного ритма, называемого неклапанной фибрилляцией предсердий.
- лечения тромбов в венах ног (тромбоз глубоких вен) и кровеносных сосудах легких (тромбоэмболия легочной артерии), а также предотвращение повторного образования тромбов в кровеносных сосудах ног и/или легких.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Римо

Противопоказания
Не принимайте препарат Римо:

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

- если у Вас аллергия на ривароксабан, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас сильное кровотечение;
- если у Вас заболевание или состояние, которое увеличивает риск возникновения сильного кровотечения (например, язва желудка, травма или кровоизлияние в мозг, недавно перенесенная операция на головном мозге или глазах);
- если Вы принимаете лекарственные препараты для предотвращения свертываемости крови (например, варфарин, дабигатран, апиксабан или гепарин), за исключением случаев смены терапии антикоагулянтами или при введении гепарина через венозный или внутриартериальный катетер путем прокола артерии;
- если у Вас заболевание печени, которое приводит к повышенному риску кровотечения;
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если Вам нет 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Римо проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Соблюдайте особую осторожность при приеме препарата Римо

- в случае повышенного риска кровотечения, что может иметь место при:

• тяжелом заболевании почек, так как функция почек может повлиять на количество лекарственного препарата, воздействующего на организм;

• приеме других лекарственных препаратов для предотвращения свертывания крови (например, варфарин, дабигатран, апиксабан или гепарин), при смене терапии антикоагулянтами или при введении гепарина через венозный или внутриартериальный катетер (см. раздел «Другие препараты и препарат Римо»)

• нарушениях свертываемости крови;

• очень высоком артериальном давлении, которое не поддается терапевтическому контролю;

• заболеваниях желудка или кишечника, которые могут привести к кровотечению, например, воспаление кишечника или желудка или воспаление пищевода, например, из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (заболевание, при котором желудочный сок попадает в пищевод) или опухолях, расположенных в желудке или кишечнике, половых или мочевыводящих путях;

• наличии проблем с кровеносными сосудами в задней части глаз (ретинопатия);

• заболевании легких, при котором бронхи расширены и заполнены гноем (бронхоэктаз),

или наличии в анамнезе легочного кровотечения;

- наличии искусственного сердечного клапана;
- при наличии заболевания, называемого антифосфолипидным синдромом (нарушение со стороны иммунной системы, вызывающее повышенный риск образования тромбов) необходимо сообщить об этом лечащему врачу, который примет решение об изменении

схемы лечения;

- если врач определит, что артериальное давление нестабильно, либо планируется проведение другого лечения или хирургической процедуры по удалению тромба из легких.

Если что-либо из вышесказанного имеет к Вам отношение, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо. Лечащий врач решит, следует ли Вам принимать этот лекарственный препарат, а также оценит необходимость в более пристальном наблюдении.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0016

Если Вам предстоит операция, то очень важно принимать препарат Римо до и после операции точно в то время, которое Вам указал врач.
Если во время операции Вам установят катетер или сделают инъекцию в позвоночник (например, для эпидуральной или спинальной анестезии или уменьшения боли):
• очень важно принимать препарат Римо до и после инъекции или удаления катетера точно в то время, которое Вам указал врач;
• немедленно сообщите лечащему врачу если после окончания действия анестезии Вы почувствуете онемение или слабость в ногах, проблемы с кишечником или мочевым пузырем. Возможно, Вам понадобится срочная медицинская помощь.

Дети

Препарат Римо не предназначен для применения у детей в возрасте младше 18 лет. Информация о применении препарата детьми и подростками является недостаточной.

Другие препараты и препарат Римо

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Если Вы принимаете:
• некоторые препараты для лечения грибковых инфекций (,например, флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол), и они не наносятся на кожу;
• кетоконазол в форме таблеток (применяется для лечения синдрома Кушинга, когда организм вырабатывает избыточное количество кортизола);
• некоторые антибактериальные препараты (например, кларитромицин, эритромицин);
• некоторые противовирусные препараты для лечения ВИЧ/СПИД (например, ритонавир);
• другие препараты для снижения свертываемости крови (например, эноксапарин, клопидогрел, прасугрел, тикагрелор или антагонисты витамина К, такие как варфарин и аценокумарол (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»);
• противовоспалительные и обезболивающие препараты (например, напроксен или ацетилсалициловая кислота);
• дронедарон, препарат для лечения нарушения ритма сердца;
• некоторые препараты для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (ИОЗСН)).
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо, так как действие препарата может быть усилено. Лечащий врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Римо, а также оценит необходимость в более тщательном наблюдении.
Если лечащий врач считает, что у Вас повышенный риск развития язв желудка или кишечника, он может назначить профилактическое лечение язвы.
Если Вы принимаете:
• некоторые препараты для лечения эпилепсии (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал);
• зверобой (Hypericum perforatum), растительный лекарственный препарат, используемый при депрессии;
• рифампицин, антибактериальный лекарственный препарат.
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом препарата Римо, потому что эффект препарата может быть уменьшен. Лечащий врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Римо, а также оценит необходимость в более тщательном наблюдении за состоянием здоровья.

Препарат Римо с пищей и напитками

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Препарат Римо можно принимать независимо от приема пищи.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не принимайте препарат Римо при беременности или кормлении грудью. Если существует вероятность наступления беременности, то используйте надежные средства контрацепции во время приема препарата Римо. Если Вы забеременели во время приема данного препарата, немедленно прекратите принимать препарат и сообщите об этом лечащему врачу, который примет решение о выборе схемы лечения. Не принимайте препарат Римо, если Вы кормите грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Римо может снизить Ваше внимание. Могут возникнуть некоторые нежелательные реакции со стороны нервной системы, в том числе головокружение или обморочное состояние. Поэтому убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

Препарат Римо содержит кроскармеллозу натрия и натрия лаурилсульфат

Этот лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Римо

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Для предотвращения образования тромбов в головном мозге (инсульт) и других кровеносных сосудах рекомендуемая доза составляет одну таблетку препарата Римо 20 мг 1 раз в день.

При проблемах с почками доза может быть уменьшена до одной таблетки Римо 15 мг 1 раз в день.

При необходимости проведения процедуры для лечения закупорки кровеносных сосудов сердца (чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) с введением стента), существуют ограниченные данные о снижении дозы до одной таблетки препарата Римо 15 мг один раз в день (или до одной таблетки препарата Римо 10 мг один раз в день в случае сниженной работы почек) в дополнение к антиагрегантной терапии, например препаратом клопидогрел.

Для лечения тромбов в венах ног и тромбов в кровеносных сосудах легких, а также для предотвращения повторного образования тромбов рекомендуемая доза составляет одну таблетку препарата Римо 15 мг два раза в день в течение первых 3 недель. Через 3 недели рекомендуемая доза составляет одну таблетку препарата Римо 20 мг 1 раз в день.

После, как минимум 6 месяцев лечения состояния, при котором образуются тромбы, лечащий врач может принять решение о продолжении лечения, при котором следует принимать одну таблетку 10 мг один раз в день или одну таблетку 20 мг один раз в день.

В случае проблем с почками и приема одной таблетки препарата Римо 20 мг один раз в день, лечащий врач может принять решение об уменьшении дозы до одной таблетки препарата Римо 15 мг один раз в день через 3 недели при условии, что риск кровотечения превышает риск образования еще одного тромба.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Путь и (или) способ введения

Прием данного лекарственного препарата не зависит от приема пищи.

В случае затруднений при проглатывании таблетки целиком обсудите с лечащим врачом

другие способы приема препарата Римо. Таблетку можно растолочь и смешать с водой или яблочным пюре непосредственно перед приемом.

При необходимости лечащий врач может также ввести измельченную таблетку препарата Римо через желудочный зонд после подтверждения правильного положения желудочного зонда в желудке. Измельченную таблетку следует вводить вместе с небольшим количеством воды через желудочный зонд, после чего его необходимо промыть водой.

Продолжительность терапии

Следует принимать препарат регулярно до его отмены лечащим врачом.

Для облегчения запоминания времени приема лекарственного препарата старайтесь принимать препарат каждый день в одно и то же время.

Для предотвращения образования тромбов в головном мозге (инсульт) и других кровеносных сосудах:

Если необходимо восстановить нормальное сердцебиение с помощью кардиоверсии, то препарат Римо следует принимать в то время, которое укажет врач.

Лечащий врач примет решение о продолжительности лечения.

Различным пациентам может быть необходима различная продолжительность лечения, поэтому Вам следует соблюдать рекомендации лечащего врача.

Если Вы приняли препарата Римо больше, чем следовало

Принимайте Римо только так, как Вам предписано. Если Вы приняли больше препарата, чем Вам было рекомендовано, немедленно обратитесь к врачу. Прием препарата Римо в слишком высокой дозе увеличивает риск развития кровотечения.

Если Вы забыли принять Римо

Если вы принимаете одну таблетку 20 мг или одну таблетку 15 мг один раз в день и пропустили прием дозы, ее следует принять сразу, как только вы вспомните о ее приеме. Не принимайте более одной таблетки в день для восполнения пропущенной дозы. Примите следующую таблетку на следующий день, а затем продолжайте принимать по одной таблетке один раз в день.

Если вы принимаете одну таблетку 15 мг два раза в день и пропустили прием дозы, ее следует принять сразу, как только вы вспомните о ее приеме. Не принимайте более двух таблеток по 15 мг в день. В случае пропуска приема дозы вы можете принять две таблетки по 15 мг одновременно, чтобы получить в общей сложности 30 мг в один день. На следующий день следует продолжить прием по одной таблетке 15 мг два раза в день.

Если Вы прекратили прием препарата Римо

Не прекращайте прием препарата Римо, не посоветовавшись предварительно с лечащим

врачом, потому что препарат Римо предотвращает развитие тяжелого состояния.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Римо может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Как и другие аналогичные лекарственные препараты для уменьшения образования тромбов, препарат Римо может вызвать потенциально опасное для жизни

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

кровотечение. Чрезмерное кровотечение может привести к резкому снижению артериального давления (шоку).
В некоторых случаях кровотечение может быть не очевидным.
Прекратите прием препарата Римо и немедленно обратитесь к врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:
- признаки кровотечения;
- кровоизлияние в мозг или внутричерепное кровоизлияние (симптомы могут включать головную боль, одностороннюю слабость, рвоту, судороги, снижение уровня сознания и скованность шеи);
Необходима серьезная неотложная медицинская помощь. Немедленно обратитесь за медицинской помощью!
- длительное или обильное кровотечение;
- необычная слабость, усталость, бледность, головокружение, головная боль, отечность неизвестной этиологии, одышка, боль в груди или стенокардия.
Лечащий врач может принять решение о более тщательном наблюдении или об изменении способа лечения.
Признаки тяжелых кожных реакций:
- интенсивная кожная сыпь, волдыри или поражение слизистых оболочек, например рта
или глаз (синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз);
- реакция на лекарственный препарат, которая вызывает сыпь, лихорадку, воспаление внутренних органов, нарушения со стороны крови и системные заболевания (синдром DRESS). Эти нежелательные реакции возникают очень редко (у 1 из 10000 человек).
Признаки тяжелых аллергических реакций:
- отечность лица, губ, рта, языка или горла; затрудненное глотание; крапивница и затрудненное дыхание; резкое снижение артериального давления. Тяжелые аллергические реакции возникают очень редко (анафилактические реакции, включая анафилактический шок; возникают у 1 человека из 10000) и нечасто (отек Квинке и аллергический отек; возникают у 1 человека из 100).
Общий список возможных нежелательных реакций
Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
- уменьшение количества эритроцитов (анемия), может наблюдаться бледность кожных покровов, слабость или одышка;
- кровотечение в желудке или кишечнике, урогенитальное кровотечение (включая наличие крови в моче и обильные менструальные кровотечения), носовое кровотечение, кровоточивость десен;
- кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в конъюнктиву);
- кровотечение в ткани или полости тела (гематома, кровоподтек);
- кашель с кровью;
- кровотечение из кожных покровов или под ними;
- кровотечение после операции, выделение крови или жидкости из послеоперационной раны;
- боль в конечностях, отек конечностей;
- нарушение функции почек (может быть замечено после проведения соответствующих анализов);
- лихорадка;
- боль в животе, боли, связанные с желудком и кишечником, диспепсия, тошнота, запор,
диарея, рвота;

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841

- низкое артериальное давление (признаками данного состояния может являться головокружение или обморок при вставании);
- снижение общей работоспособности (слабость, утомляемость), головная боль, головокружение;
- сыпь, кожный зуд;
- анализы крови могут показать увеличение некоторых печеночных ферментов.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
- кровоизлияние в мозг или внутричерепное кровоизлияние (см. выше, признаки кровотечения);
- кровоизлияние в сустав, вызывающее боль и отек;
- тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, которые помогают крови свертываться);
- аллергические реакции, в том числе кожные аллергические реакции;
- нарушение функции печени (может быть замечено после проведения соответствующих
анализов);
- анализы крови могут показать повышение билирубина, некоторых ферментов поджелудочной железы или печени или количества тромбоцитов;
- головокружение;
- ухудшение общего самочувствия;
- учащенное сердцебиение;
- сухость во рту;
- аллергическая сыпь.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):
- кровоизлияния в мышцы;
- холестаз (снижение оттока желчи), гепатит, в т. ч. гепатоцеллюлярное повреждение (воспаление печени, включая повреждение печени);
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
- локализованный (местный) отек;
- скопление крови (гематома) в паху как осложнение сердечной процедуры, когда катетер вводится в артерию ноги (псевдоаневризма).

Очень редко (могут возникнуть у 1 человека из 10000):
- анафилактические реакции включая анафилактический шок;
- синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз, DRESS синдром;
- накопление эозинофилов, тип белых гранулоцитарных клеток крови, которые вызывают воспаление в легких (эозинофильная пневмония).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):
- почечная недостаточность после сильного кровотечения;
- повышенное давление в тканях мышц ног или рук после кровотечения, которое приводит к боли, отеку, изменению чувствительности, онемению или параличу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Адрес: 220037 г. Минск, пер. Товарищеский, 2а
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Телефон: +375(17) 242 00 29
Факс: +375(17) 242 00 29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: http://www.rceth.by/

5. Хранение препарата Римо

Храните препарат в недоступном для детей месте.
Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и картонной пачке после «Годен до:».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Храните при температуре ниже 30°С в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Римо содержит
Действующим веществом является ривароксабан.
Римо, 15 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Каждая таблетка содержит 15 мг действующего вещества.
Прочими вспомогательными веществами являются: маннитол, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилметилцелюллоза, натрия лаурилсульфат, микрокристаллическая целюллоза, магния стеарат, материал пленочной оболочки №110 (Опадрай 04F250003 красный порошок): гипромеллоза, полиэтиленгликоль, титана диоксид, железа оксид красный (Е172).
Препарат Римо содержит кроскармеллозу натрия и натрия лаурилсульфат (см. раздел 2).
Римо, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Каждая таблетка содержит 20 мг действующего вещества.
Прочими вспомогательными веществами являются: маннитол, кроскармеллоза натрия, гидроксипропилметилцелюллоза, натрия лаурилсульфат, микрокристаллическая целюллоза, магния стеарат, материал пленочной оболочки №101 (Опадрай 04F250010 красный порошок): гипромеллоза, полиэтиленгликоль, титана диоксид, железа оксид красный (Е172).
Препарат Римо содержит кроскармеллозу натрия и натрия лаурилсульфат (см. раздел 2).
Внешний вид препарата Римо и содержимое упаковки
Римо, 15 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Красные круглые выпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
По 14 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистер из ПВХ-ПЭ-ПВДХ/алюминия.
По 2 или 3 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.
Римо, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Красно-коричневые круглые выпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
По 14 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистер из ПВХ-ПЭ-ПВДХ/алюминия. По 2 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

ЛП-№016007-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 23.07.2026 № 841
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
Турция
Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.
г. Стамбул, квартал Инкылап, ул. Доктора Аднана Бююкдениза, 14, р-н Умрание
Номер телефона: +90(216) 633 60 00
Номер факса: +90(216) 633 60 01
Адрес электронной почты: bizeulasin@nobel.com.tr

Производитель
Турция
Нобел Илач Санайи Ве Тиждарет А.Ш.
Адрес: г. Дюздже, д. Санджаклар, ул. Эски Акчакоджа № 299

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь
Представительство АО «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Заслонова, 10
Адрес электронной почты: nobel@nobel.by

Прочие источники информации
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза http://eec.eaeunion.org/.