

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ – ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Мирасол-Рн, 0,1 мг/мл, раствор для местного применения

Действующее вещество: мирамистин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Мирасол-Рн и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Мирасол-Рн.
3. Применение препарата Мирасол-Рн.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мирасол-Рн.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Мирасол-Рн и для чего его применяют

Лекарственный препарат Мирасол-Рн содержит действующее вещество мирамистин.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептики и дезинфицирующие средства. Четвертичные аммониевые соединения.

Мирасол-Рн — антисептическое средство, оказывает противовирусное, противогрибковое и бактерицидное действие.

Показания к применению

Препарат Мирасол-Рн применяют у взрослых и детей старше 3 лет:

- в хирургии, травматологии: для профилактики нагноений и лечения гнойных ран; для лечения гнойно-воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата;
- в ожоговой медицине: для лечения поверхностных и глубоких ожогов II и IIIa степени; для подготовки ожоговых ран к операции по восстановлению кожного покрова (дерматопластике);
- в урологии: при остром и хроническом воспалении уретры, уретропростатитов специфической (хламидиоз, трихомониаз, гонорея) и неспецифической природы;
- в акушерстве, гинекологии: для профилактики и лечения нагноений послеродовых травм, ран промежности и влагалища, послеродовых инфекций, воспалительных заболеваний;
- в стоматологии: при воспалении полости рта (стоматите), десен (гингивите) и околозубных тканей (периодонтите), для гигиенической обработки съемных зубных протезов;

- в дерматологии: для лечения грибковых заболеваний кожи и слизистых, крупных складок;
- в венерологии: для индивидуальной профилактики заболеваний, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес, генитальный кандидоз и др);
- при заболеваниях ЛОР-органов - наружном воспалении уха (отите) и барабанной перепонки (тимпаните), воспалении слизистой оболочки гайморовой пазухи (гайморите), воспалении миндалин (тонзиллите) и горла (фарингите).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Мирасол-Рн

Противопоказания

Не применяйте препарат Мирасол-Рн:

- если у Вас аллергия на мирамистин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- детям в возрасте до 3 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Мирасол-Рн проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Во время применения препарата Мирасол-Рн следует избегать его попадания в глаза.

Использование одного флакона препарата с насадкой-распылителем более чем одним человеком может привести к распространению инфекции.

Дети

Опыт клинического применения у детей ограничен. Перед применением у детей проконсультируйтесь с врачом для оценки соотношения ожидаемой пользы и возможного риска применения препарата Мирасол-Рн.

Другие препараты и препарат Мирасол-Рн

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При одновременном применении с антибиотиками отмечено усиление их противобактериальных и противогрибковых свойств.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Решение о применении препарата Мирасол-Рн во время беременности и грудного вскармливания принимается врачом. Возможно применение препарата, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Мирасол-Рн не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Мирасол-Рн

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Хирургия, травматология, ожоговая медицина: с профилактической и лечебной целью препарат применяют путем орошения поверхности ран, активного дренирования (удаления жидкости) и использования марлевых тампонов, смоченных препаратом. Лечебная процедура повторяется 2-3 раза в сутки в течение 3-5 дней.

Урология: в комплексном лечении уретритов и уретропростатитов проводят впрыскивание в уретру 2-3 мл препарата 1-2 раза в день, курс - 10 дней.

Акушерство, гинекология: лечение воспалительных заболеваний проводится курсом в течение 2-х недель путем внутривлагалищного введения тампонов с препаратом на 2-3 часа, а также методом лекарственного электрофореза.

С целью профилактики послеродовой инфекции препарат Мирасол-Рн применяется в виде влагалищных орошений до родов (5-7 дней), после каждого влагалищного исследования и в послеродовом периоде в виде обильно смоченного тампона с экспозицией 2 ч в течение 5 дней.

При родоразрешении женщин путем кесарева сечения непосредственно перед операцией обрабатывают влагалище, во время операции - полость матки и разрез на ней, а в послеоперационном периоде вводят тампоны, смоченные препаратом, во влагалище с экспозицией 2 ч в течение 7 дней.

Стоматология: при стоматитах, гингивитах, пародонтитах рекомендуется полоскание ротовой полости 10-15 мл препарата 3-4 раза в сутки.

Дерматология: при грибковых поражениях кожи и слизистых, крупных складок, кожи стоп стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными препаратом, протирают пораженный участок кожи. Применяется 3 раза в день на пораженных участках кожи.

Венерология: Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, лекарственный препарат эффективен, если применяется не позднее 2 ч после полового акта. Содержимое флакона через носик насадки ввести в мочеиспускательный канал мужчинам (2-3 мл), женщинам в мочеиспускательный канал (1-2 мл) и во влагалище (5-10 мл) и задержать на 2-3 минуты. Обработать кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов. После процедуры рекомендуется не мочиться в течение 2-х часов.

При заболеваниях ЛОР-органов:

При гнойных гайморитах - во время пункции верхнечелюстная пазуха промывается достаточным количеством препарата.

При воспалительных заболеваниях горла и миндалин - проводят полоскание горла и/или орошение с помощью насадки-распылителя, 3-4-х кратным нажатием 3-4 раза в сутки. Количество препарата на одно полоскание 10-15 мл.

При воспалительных заболеваниях уха и барабанной перепонки - турунды (валики), смоченные раствором, вводить в наружный слуховой проход на 2-3 часа в течение 6-8 дней.

Применение у детей

Оториноларингология

Для лечения острого фарингита или обострения хронического тонзиллита — орошение глотки с применением насадки-распылителя:

- дети 3-6 лет: однократное нажатие 3-4 раза в сутки;
- дети 7-14 лет: двукратное нажатие 3-4 раза в сутки;
- дети от 14 лет: трех- или четырехкратное нажатие 3-4- раз в сутки.

Во избежание проглатывания раствора, затекания его в носовые ходы и попадания в дыхательные пути перед полосканием горла необходимо убедиться, что ребенок понимает и владеет техникой полоскания горла. У детей младшего возраста во время полоскания горла требуется контроль со стороны взрослых.

Стоматология, хирургия, травматология, комбустиология, дерматология

Режим дозирования у детей старше 3 лет не отличается от режима дозирования у взрослых.

Акушерство, гинекология, урология

Способ применения, продолжительность лечения и кратность введения определяет лечащий врач.

Путь и способ введения

Для местного применения.

Препарат применяется в виде орошений, полосканий, аппликаций.

Указания по использованию упаковки флакон полиэтиленовый 30 мл, укупоренный насадкой-распылителем с защитным колпачком

Перед применением препарата следует снять защитный колпачок.

Перед первым использованием нового флакона или после длительного перерыва следует несколько раз нажать на дозатор до появления равномерного распыления (распылять лекарственный препарат в воздух).

При орошении горла флакон держите вертикально.

После применения лекарственного препарата закройте флакон защитным колпачком.

Если Вы применили препарата Мирасол-Рн больше, чем следовало

Случаи передозировки неизвестны. Тем не менее, при случайном проглатывании необходимо провести промывание желудка. При необходимости проводят симптоматическую терапию.

Если Вы забыли применить препарат Мирасол-Рн

Препарат следует применить при первой возможности, однако предварительно убедитесь, что Вы не превышаете частоту применения, согласно назначению и режиму дозирования.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Мирасол-Рн может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Очень редко (может возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- аллергические реакции,
- ощущение жжения в месте применения (проходит самостоятельно через 15-20 сек и не требует отмены препарата).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Тел.: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Мирасол-Рн

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

После вскрытия флакона препарат хранить не более 6 месяцев.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Мирасол-Рн содержит

Действующим веществом препарата является мирамистин.

1 мл раствора содержит 0,1 мг мирамистина.

Вспомогательное вещество: вода очищенная.

Внешний вид препарата Мирасол-Рн и содержимое упаковки

Мирасол-Рн представляет собой прозрачный бесцветный раствор, пенящийся при встряхивании.

По 100 мл или 200 мл во флаконе полимерном со вставкой во флакон и крышкой для флакона, или по 30 мл во флаконе полиэтиленовом, укупоренном насадкой-распылителем с защитным колпачком с листком-вкладышем в пачке картонной.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь,

ООО «Рубикон»,

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел.: +375 (212) 36-47-77,

факс: +375 (212) 36-37-06,

е-mail: secretar@rubikon.by

За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

ООО «Рубикон», 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел.: +375 (212) 36-47-77

факс: +375 (212) 36-37-06,

е-mail: secretar@rubikon.by

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа Евразийского экономического союза <http://eec.eaeunion.org>.