

Листок-вкладыш - информация для потребителя

ПАПАВЕРИН, 20 мг, суппозитории ректальные

Действующее вещество: папаверина гидрохлорид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Папаверин и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Папаверин
3. Применение препарата Папаверин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Папаверин
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Папаверин и для чего его применяют

Папаверин суппозитории содержит действующее вещество папаверина гидрохлорид, который относится к группе спазмолитиков.

Показания к применению

Препарат применяется у взрослых от 18 лет для лечения боли, вызванной спазмов гладкой мускулатуры при заболеваниях органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная колика).

Способ действия препарата Папаверин

Папаверин является спазмолитическим средством. Он снижает тонус, уменьшает сократительную деятельность гладких мышц и в связи с этим оказывает сосудорасширяющее и спазмолитическое действие.

В больших дозах снижает возбудимость сердечной мышцы и замедляет внутрисердечную проводимость. Действие папаверина на центральную нервную систему выражено слабо, но в больших дозах он оказывает седативный эффект.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Папаверин

Противопоказания

Не применяйте препарат Папаверин:

- если у Вас аллергия на папаверина гидрохлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас воспалительные заболевания прямой кишки;
- при коматозном состоянии;
- в случае угнетения дыхания;
- если у Вас сухой или приступообразный кашель, одышка, приступы удушья, свистящие хрипы (бронхообструктивный синдром);
- если у Вас диагностировали нарушение АВ проводимости сердца, атриовентрикулярная блокада;
- если у Вас глаукома;
- если у Вас имеется тяжелая форма печеночной недостаточности;
- если Вы пожилого возраста (из-за риска гипертермии - повышение температуры тела);
- у детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

С осторожностью и в малых дозах следует применять препарат ослабленным пациентам, а также пациентам с черепно-мозговой травмой, нарушениями функции печени и почек, гипотиреозом (снижение функции щитовидной железы), гиперплазией предстательной железы (увеличение размеров предстательной железы), больным с наджелудочковой тахикардией (внезапно возникающее учащенное сердцебиение) и находящимися в шоковом состоянии.

В период лечения препаратом следует исключить употребление алкоголя.

Эффективность препарата снижается при табакокурении.

Дети и подростки

Препарат противопоказан к применению у детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет.

Другие препараты и препарат Папаверин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Важно сообщить лечащему врачу, если Вы принимаете:

- β-адренергические препараты (метопролол, бисопролол, алпренолол) - препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- антигипертензивные препараты, которые применяются для лечения артериальной гипертонии;
- трициклические антидепрессанты (амитриптилин, кломипрамин, дибензепин, доксепин), новокаиномид (прокаиномид), резерпин, хинидин - возможно усиление гипотензивного эффекта;
- допегит (гипотензивный препарат);
- леводopa (препарат для лечения болезни Паркинсона);
- дифенгидрамин (димедрол), метамизол (анальгин) и диклофенак, которые усиливают спазмолитический эффект папаверина;
- сердечные гликозиды, такие как дигоксин;
- фурадонин (противомикробный препарат).

Эффекты папаверина потенцируются наркотическими, обезболивающими, седативными и транквилизирующими веществами.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Безопасность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не установлена.

Применение препарата при беременности возможно только по назначению врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания рекомендуется приостановить кормление грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При применении в терапевтических дозах препарат не оказывает влияния на способность к управлению автомобилем или другими потенциально опасными механизмами. Однако, в случае возникновения нежелательных реакций, таких как головная боль, головокружение, сонливость, гипотония, следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с опасными механизмами.

3. Применение препарата Папаверин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Рекомендуется по 1-2 суппозитория 2-3 раза в день после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы.

Путь и (или) способ введения

Ректально. Освободив суппозиторий от контурной упаковки, введите его в задний проход.

Инструкция по ректальному введению суппозитория

При применении ректальных суппозиториях нередко возникает спазм в животе и позыв к дефекации, поэтому перед процедурой опорожните кишечник естественным путем или очищайте при помощи клизмы. Тщательно вымойте руки с мылом. Заранее приготовьте влажные салфетки или носовой платок, смоченный в воде.

Лягте на бок, прижав колени к животу. Для проведения процедуры эта поза наиболее удобна, так как позволяет свести к минимуму неприятные ощущения.

Извлеките суппозиторий из упаковки. Суппозиторий берут большим и средним пальцами правой руки в середине самой широкой части, указательный палец упирается в тупой конец суппозитория. Суппозиторий направляют свободным концом к заднему проходу и проталкивают указательным пальцем в анальный канал до полного погружения на глубину 2-3 см. Проводите процедуру осторожно, не оказывая лишнего давления. Несмотря на то, что суппозиторий имеет обтекаемую форму, при неосторожном использовании можно травмировать слизистую оболочку.

Не вставайте с постели около 20 минут.

Протрите руки заранее приготовленной влажной салфеткой или носовым платком.

Если в течение 10 минут после введения суппозитория произошел позыв к дефекации, опорожните кишечник и введите новый суппозиторий. Если между введением суппозитория и дефекацией прошло больше 10 минут, дополнительная доза препарата не требуется.

Продолжительность терапии

Продолжительность применения и дозирование зависит от степени тяжести и течения заболевания и определяется лечащим врачом индивидуально.

Если Вы применили препарата Папаверин больше, чем следовало

Если Вы случайно применили более высокие дозы, чем Вам назначено, обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить препарат Папаверин

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Папаверин

Не прекращайте лечение. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, прежде чем прервать лечение.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Папаверин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- аллергические реакции (отек губ, лица, языка или горла, крапивница, сыпь и зуд кожи);
- резкое снижение артериального давления (коллапс);
- фибрилляция желудочков.

Другие возможные нежелательные реакции:

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- эозинофилия (увеличение эозинофилов в крови);
- сонливость, слабость, головная боль, головокружение, приостановка дыхания (апноэ);
- блокада, аритмия, желудочковая экстрасистолия, тахикардия, асистолия, трепетание желудочков;
- артериальная гипотензия;
- нарушение зрения (диплопия);
- тошнота, диарея, запор, полное отсутствие аппетита (анорексия), сухость во рту;
- гиперемия кожи, крапивница, зуд, высыпания на коже, реакции в месте введения, повышенная потливость;
- повышенная активность печеночных трансаминаз.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а
Телефон: +(375 17) 242-00-29
Факс: +(375 17) 242-00-29
Эл. почта: rcpl@rceth.by
Сайт: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Папаверин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Хранить в оригинальной контурной ячейковой упаковке для защиты от света и влаги, при температуре от 15 °С до 25 °С.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до.». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию/водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Папаверин содержит

- Действующим веществом является папаверина гидрохлорид. Каждый суппозиторий содержит 20 мг папаверина гидрохлорид.
- Прочим ингредиентом является: твердый жир (Суппоцир АМ).

Внешний вид препарата Папаверин и содержимое упаковки

Суппозитории ректальные.

Суппозитории цилиндрической формы, белого или белого с желтоватым оттенком цвета. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня, и воронкообразного углубления.

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «ФАРМАПРИМ»

Адрес: ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень

Республика Молдова, MD-4829

Телефон: (+373 22) 28-18-45

Тел./факс: (+373 22) 28-18-46

Эл. почта: safety@farmaprim.md

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

Адрес: г. Минск, ул. Мележа, дом 5, корпус 2, офис 1105

Телефон: + 375 173 85 26 09; тел. моб: + 375 296641080

Эл. почта: safety@farmaprim.md

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза: <https://www.rceth.by>