

Листок-вкладыш – информация для пациента
НОЗАКАР® , 50 мкг/доза, спрей назальный дозированный
Действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат НОЗАКАР®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата НОЗАКАР®.
3. Применение препарата НОЗАКАР®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата НОЗАКАР®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат НОЗАКАР®, и для чего его применяют

Препарат НОЗАКАР® содержит действующее вещество оксиметазолина гидрохлорид и относится к препаратам, снимающим отек слизистой носа и восстанавливающим свободное носовое дыхание (деконгестанты).

Показания к применению

Препарат НОЗАКАР® применяется у взрослых и детей старше 6 лет:

- при затруднении носового дыхания при остром рините, аллергическом или вазомоторном рините;
- для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух носа, а также евстахиите и среднем отите;
- для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

Препарат НОЗАКАР® обладает сосудосуживающим действием, снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание через нос. Также НОЗАКАР® способствует открытию и расширению придаточных пазух носа и евстахиевой трубы. Это улучшает аэрацию придаточных пазух носа и полости внутреннего уха, что предотвращает развитие бактериальных осложнений, таких как гайморит, синусит и отит.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 7 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата НОЗАКАР®

Противопоказания

Не применяйте препарат НОЗАКАР®:

- если у Вас аллергия на оксиметазолин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас атрофический ринит;
- если у Вас закрытоугольная глаукома;
- если Вы перенесли транссфеноидальную гипотизэктомию или другую хирургическую процедуру, которая могла привести к повреждению твердой мозговой оболочки;
- если Вашему ребенку меньше 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата НОЗАКАР® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не допускайте попадания лекарственного препарата в глаза.

Посоветуйтесь с лечащим врачом, если у Вас:

- тяжелая форма сердечно-сосудистого заболевания (стенокардия, тахикардия, выраженный атеросклероз) или артериальная гипертензия;
- тиреотоксикоз;
- феохромоцитома;
- повышенное внутриглазное давление;
- сахарный диабет;
- порфирия;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Не применяйте препарат в дозах, превышающих рекомендуемые, и на протяжении периода времени более 5–7 дней без консультации врача.

Длительное применение и передозировка лекарственного препарата могут привести к ослаблению его эффекта. Злоупотребление этим лекарственным препаратом может вызвать обратный эффект в виде отека слизистой и заложенности носа либо атрофию слизистой оболочки.

Дети и подростки

Не используйте препарат у детей младше 6 лет.

Другие препараты и препарат НОЗАКАР®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Посоветуйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете:

- ингибиторы МАО: не следует использовать НОЗАКАР® на протяжении 14 дней после прекращения приема ингибиторов МАО;
- трициклические антидепрессанты: при совместном применении существует риск повышения артериального давления;

– сосудосуживающие средства: при совместном применении существует риск развития нежелательных реакций.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность препарата при беременности и в период кормления грудью не установлена, поэтому, если Вы беременны или кормите грудью, препарат можно применять только по рекомендации врача.

Нет особых рекомендаций по применению препарата при планировании беременности.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При применении в рекомендуемых дозах НОЗАКАР® не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

При длительном применении препарата в дозировках, превышающих рекомендуемые, существует возможность негативного влияния на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. В этих случаях способность управлять транспортным средством может ухудшаться.

Препарат НОЗАКАР® содержит бензалкония хлорид и фенилртути ацетат

Препарат НОЗАКАР® содержит фенилртути ацетат, который может вызывать раздражение в носу или на коже.

Препарат НОЗАКАР® содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение или отек в носу, особенно при длительном применении. Данный лекарственный препарат содержит 10 мкг бензалкония хлорида в каждой дозе, что эквивалентно 0,1 мг/мл.

3. Применение препарата НОЗАКАР®

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослым и детям старше 6 лет назначается по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки.

Путь и способ введения

Применяется местно, интраназально (в полость носа).

Перед применением препарата и через 5 минут после его применения очистите носовые ходы. Перед первым применением следует несколько раз нажать на манжетку распылительной насадки до появления струи с «облачком тумана». Флакон готов к использованию.

Во время использования держите флакон вертикально, при впрыскивании не следует запрокидывать голову вверх.

Выполнение процедуры

Для того, чтобы сделать впрыскивание, снимите с наконечника флакона защитный колпачок, один раз резко нажмите на манжетку распылительной насадки и произведите впрыскивание спрея поочередно в каждый носовой ход. Не распылять спрей горизонтально или вниз. После применения очистите салфеткой кончик распылительной насадки, закройте ее защитным колпачком.

Флакон должен использоваться только одним лицом из-за риска передачи инфекции.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения 5–7 суток.

Применение у детей и подростков

У детей 6–12 лет препарат должен применяться под наблюдением взрослых. Не используйте препарат НОЗАКАР® у детей младше 6 лет.

Если Вы применили препарата НОЗАКАР® больше, чем следовало

Эффективность оксиметазолина может уменьшаться при его длительном применении или применении в высоких дозах. Если Вы применяете НОЗАКАР® более часто или более длительно, чем это указано лечащим врачом или в данном листке-вкладыше, Вам следует немедленно прекратить лечение.

Передозировка может возникнуть как в результате применения препарата через нос, так и при случайном приеме внутрь. Передозировка может проявляться в виде сужения зрачков, тошноты, рвоты, посинения кожи, повышения температуры, учащенного сердцебиения, нарушения сердечного ритма (аритмии), коллапса, угнетения сердечной деятельности, повышения артериального давления, отека легких, дыхательных расстройств. Также могут наблюдаться психические расстройства и угнетение функций центральной нервной системы, сопровождающиеся сонливостью, понижением температуры тела, замедлением частоты сердечных сокращений, снижением артериального давления, остановкой дыхания и возможным развитием комы.

Если у Вас возникла передозировка, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При передозировке, связанной с приемом лекарственного препарата внутрь, проводят промывание желудка, принимают активированный уголь.

Если Вы забыли применить препарат НОЗАКАР®

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам НОЗАКАР® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Самыми серьезными нежелательными реакциями являются реакции гиперчувствительности в виде затруднения дыхания, отека на губах, веках, щеках, сыпи; неврологические реакции в виде судорог; остановка дыхания (апноэ) у новорожденных и младенцев.

Если у Вас появились указанные симптомы, немедленно прекратите применение препарата и сразу обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Частыми (могут возникать не более чем у 1 человека из 10) нежелательными реакциями являются ощущение жжения, сухость слизистой носа, чихание.

Нечастыми (могут возникать не более чем у 1 человека из 100) нежелательными реакциями являются усиление отека слизистой носа после окончания действия, носовые кровотечения.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000) могут возникнуть тахикардия, ускоренное сердцебиение, повышение артериального давления, тошнота.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000) возникают беспокойство, бессонница, усталость, головные боли, аритмия.

С неизвестной частотой (на основании имеющихся данных оценить невозможно) возникает

контактный дерматит.

Продолжительное применение и передозировка могут привести к быстрому снижению терапевтического эффекта.

Если Вы отмечаете любой из указанных симптомов, прекратите применение препарата и обратитесь к лечащему врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

ГУ «Госфармнадзор»

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32-2

Телефоны: +375 (17) 271-41-76, +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 271-25-75

Электронная почта: pharm@gospharmnadzor.by

<https://gospharmnadzor.by>

Республика Армения

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: +374 (60) 83-00-73

Горячая линия: +374 (10) 20-05-05; +374 (96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

www.pharm.am

5. Хранение препарата НОЗАКАР®

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат НОЗАКАР® содержит

Действующим веществом является оксиметазолина гидрохлорид.

1 мл раствора содержит 0,5 мг оксиметазолина гидрохлорида. Каждая доза спрея содержит 50 мкг оксиметазолина гидрохлорида.

Вспомогательными веществами являются: вода очищенная, сорбитол 70%, натрия хлорид,

глицин, бензалкония хлорид, фенилртути ацетат.

Внешний вид препарата НОЗАКАР® и содержимое упаковки

Прозрачный, бесцветный раствор без запаха объемом 15 мл в белом полиэтиленовом флаконе, снабженном помповым дозирующим устройством с колпачком. По 1 флакону в одной картонной пачке вместе с листком-вкладышем.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Государство Палестина

Фармакар Интернешнл Компани (Фармакар Инт. Ко.)

State of Palestine, Kalandia, Ramallaha-Elmasion, Emil Habibi Str. 19

Производитель

Государство Палестина

Фармакар ЛТД

Betunia Industrial Zone, Ramallah, Palestine, P.O. Box 677

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь и Республика Армения

Представительство частной акционерной компании

«Pharmasare LTD» (Государство Палестина) в Республике Беларусь

г. Минск, пер. Марусинский 2-ой, д.6, каб.1-4, 220080, Республика Беларусь,

pharmasare@pharmasare.by, тел.: +375 (17) 319-05-60

Листок-вкладыш пересмотрен

Июнь 2026

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.