

Листок-вкладыш – информация для пациента

Ангисептин, 0,2 мг + 2 мг + 50 мг, таблетки для рассасывания

Действующие вещества: тетракаина гидрохлорид, хлоргексидина дигидрохлорид, аскорбиновая кислота

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается после 3 дней лечения или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Ангисептин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Ангисептин.
3. Применение препарата Ангисептин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ангисептин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Ангисептин, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Ангисептин содержит тетракаина гидрохлорид, хлоргексидина дигидрохлорид и аскорбиновую кислоту. Относится к группе «Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства».

Показания к применению

Ангисептин применяется у взрослых и детей старше 12 лет для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки:

- воспаление слизистой оболочки рта (стоматит),
- воспалительный процесс в тканях десны (гингивит),
- воспалительный процесс в небных миндалинах (тонзиллит),
- воспаление слизистой оболочки глотки (фарингит),
- воспаление тканей, окружающих зуб (пародонтит).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Ангисептин

Противопоказания

Не применяйте препарат Ангисептин, если у Вас:

- аллергия на хлоргексидин, тетракаин, аскорбиновую кислоту или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- беременность (I триместр);
- детский возраст до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Ангисептин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат применяют не более 5 дней. При отсутствии заметных признаков улучшения состояния после 3-х дней лечения, а также при ухудшении самочувствия и появлении лихорадки, следует обратиться к врачу.

Не применяйте одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод).

Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов. Препарат может повлиять на результаты антидопингового контроля.

Применение препарата может временно незначительно изменять вкусовые ощущения, но в течение 4 часов после применения препарата восприятие вкуса полностью восстанавливается. Применять препарат рекомендуется после еды.

Длительное применение препарата может вызвать незначительное временное окрашивание зубов и языка, но эти явления проходят после отмены препарата. В ряде случаев для их устранения может потребоваться консультация врача.

Если у Вас заболевания пищеварительного тракта и/или печени, при применении препарата возможно появление тошноты, рвоты и отрыжки. При появлении этих симптомов прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

С осторожностью применяйте препарат, если у вас есть предрасположенность к выделению с мочой солей щавелевой кислоты (оксалатурия), образованию камней в почках.

С осторожностью применяйте при:

- сахарном диабете,
- дефиците фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,
- заболеваниях, характеризующихся избыточным отложением железа в тканях (гемохроматоз, сидеробластная анемия),
- врожденном заболевании крови, которое характеризуется дефектом синтеза гемоглобина (талассемия).

Дети и подростки

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Другие препараты и препарат Ангисептин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Хлоргексидин не совместим с детергентами, которые обычно присутствуют в зубных пастах. Поэтому между использованием зубной пасты и лекарственного препарата должно пройти не менее 30 минут.

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Ангисептин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Препарат противопоказан в I триместре беременности. Женщинам во II и III триместре беременности следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Кормление грудью

Женщинам во время кормления грудью следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по оценке влияния применения лекарственного препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Препарат Ангисептин содержит вспомогательное вещество сорбитол. Сорбитол является источником фруктозы. Если у Вас или Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. В связи с содержанием сорбитола лекарственный препарат может оказывать легкое слабительное действие. В состав препарата входит краситель тартразин, который может вызывать аллергические реакции.

3. Применение препарата Ангисептин

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки (каждые 6 часов).

Применение у детей и подростков

Не применять в возрасте до 12 лет.

Путь и способ введения

Для местного применения. Таблетку следует медленно рассасывать. Препарат применять после еды и после чистки зубов. Рекомендуется не полоскать рот и не пить много жидкости в течение 2 часов после рассасывания таблеток.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса терапии не более 5 дней.

Если Вы применили препарата Ангисептин больше, чем следовало

Применяйте Ангисептин в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату.

Возможные симптомы передозировки

Головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение, беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.

Неотложные мероприятия

Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу!

Если вы забыли применить препарат Ангисептин

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Ангисептин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- аллергические реакции: заложенность носа, кожная сыпь; шелушение, раздражение или воспаление слизистой оболочки рта; отек слюнных желез;
- изменение вкуса;
- раздражение слизистой оболочки желудка; тошнота, рвота, отрыжка, диарея;
- увеличение зубного налета, изменение окраски (коричневые пятна) на зубах, пломбах и зубных протезах.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

ГУ «Госфармнадзор»

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32-2

Тел.: +375 (17) 271-41-76, +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 271-25-75

Электронная почта: pharm@gospharmnadzor.by

Сайт: <https://gospharmnadzor.by>

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Тел.: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»
Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Тел.: +7 (7172) 78-98-28, +7(7172) 235 135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт: <http://www.ndda.kz>

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Тел.: + 996 (312) 21-92-78,

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт: <https://dlsmi.kg/>

Республика Армения

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Тел.: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

Горячая линия: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am, info@ampra.am

Сайт: <http://pharm.am>

5. Хранение препарата Ангисептин

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в оригинальной упаковке (пачке картонной) для защиты от влаги и света.

Уточните у работника аптеки, как утилизировать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Ангисептин содержит

Действующими веществами препарата являются тетракаина гидрохлорид, хлоргексидина диацетат и аскорбиновая кислота.

1 таблетка для рассасывания содержит 0,2 мг тетракаина гидрохлорида, 2 мг хлоргексидина диацетата и 50 мг аскорбиновой кислоты.

Вспомогательные вещества: левоментол, сахарин натрий, тальк, кальция стеарат, ароматическая добавка «Апельсин» (мальтодекстрин, апельсиновое масло, аравийская камедь (E414), ароматическая композиция), тартразин (E 102), сорбитол.

Внешний вид препарата Ангисептин и содержимое упаковки

Таблетки для рассасывания двояковыпуклые, от бледно-желтого до желтовато-оранжевого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, с апельсиново-ментоловым ароматом.

По 6 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой. 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,
210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,
e-mail: secretar@rubikon.by

Данный листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на веб-сайте Союза:
<http://www.eurasiancommission.org>