ЛП-№016693-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.09.2026 № 1075
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018

Листок-вкладыш – информация для пациента

Ксилазол-Реб, (0,5 мг + 50 мг)/мл, спрей назальный для детей

Ксилазол-Реб, (1 мг + 50 мг)/мл, спрей назальный

Действующие вещества: ксилометазолин + [декспантенол]

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ксилазол-Реб, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Ксилазол-Реб
3. Применение препарата Ксилазол-Реб
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Ксилазол-Реб
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

1. Что из себя представляет препарат Ксилазол-Реб, и для чего его применяют

Препарат Ксилазол-Реб содержит действующие вещества: ксилометазолина гидрохлорид, декспантенол. Относится к фармакотерапевтической группе «препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; симпатомиметики, комбинации без кортикостероидов» и применяется для улучшения носового дыхания при заложенности носа.

Показания к применению

Препарат Ксилазол-Реб (0,5 мг + 50 мг)/мл, спрей назальный для детей показан к применению детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Препарат Ксилазол-Реб (1 мг + 50 мг)/мл, спрей назальный показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Препарат Ксилазол-Реб применяется:

– в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки при острых респираторных заболеваниях с симптомами ринита, остром аллергическом рините, поллинозе, евстахиите, среднем отите;

– для облегчения состояния при вазомоторном рините;

– для подготовки пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах;

– как поддерживающая терапия при заживлении слизистой оболочки, восстановления носового дыхания после хирургического вмешательства в полости носа;

ЛП-№016693-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.09.2026 № 1075
последняя редакция 2018

– для уменьшения отека слизистой оболочки носа при острых респираторных заболеваниях в сочетании с острым воспалением параназальных пазух (риносинусит).

Способ действия препарата Ксилазол-Реб

Ксилометазолин вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки полости носа, восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание.

Действие препарата обычно наступает через несколько минут после его применения и продолжается до 10 часов.

Декспантенол стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 5-7 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Ксилазол-Реб

Противопоказания

Не применяйте препарат Ксилазол-Реб, если у Вас:
- аллергия на ксилометазолина гидрохлорид, декспантенол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия);
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- заболевание кровеносных сосудов с образованием холестериновых бляшек, сужающих просвет сосудов и признаками нарушения кровообращения (выраженный атеросклероз);
- повышенное содержание гормонов щитовидной железы (гипертиреоз);
- нарушение оттока внутриглазной жидкости и повышенное внутриглазное давление (глаукома);
- состояние, характеризующееся истончением слизистой носа, расширением носовых ходов (атрофический ринит);
- воспалительные заболевания кожи или слизистой оболочки преддверия полости носа;
- сухое воспаление слизистой оболочки носа с образованием корки (сухой ринит);
- состояние после хирургического удаления гипофиза через нос (транссфеноидальной гипофизэктомии) или других хирургических процедур, обнажающих твердую мозговую оболочку;
- если Вы в данный момент принимаете препараты из группы ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) (например, моклобемид, селегилин) или принимали их в предшествующие 14 дней, трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, имипрамин), тетрациклические антидепрессанты (например, мапротилин, миртазапин);
- если Вы беременны (см. раздел 3).

Не применяйте дозировку (0,5 мг + 50 мг)/мл у детей младше 2 лет.

Не применяйте дозировку (1 мг + 50 мг)/мл у детей младше 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности
Перед применением препарата Ксилазол-Реб проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как применять препарат Ксилазол-Реб в следующих случаях:
- при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы (например, ишемической болезни сердца, стенокардии);

ЛП-№016693-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.09.2026 № 1075
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018

- у пациентов с опухолью надпочечника (феохромоцитомой);
- при нарушениях обмена веществ (например, сахарный диабет);
- при порфирии (наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ);
- при гиперплазии предстательной железы;
- повышенная чувствительность к препаратам (адреномиметикам), которая сопровождается бессонницей, головокружением, нарушением ритма сердца, тремором, повышением артериального давления (АД);
- у пациентов с синдромом удлиненного интервала QT в связи с повышенным риском развития серьезных желудочковых аритмий.

Применение при хроническом насморке должно проводиться только под контролем врача из-за риска атрофии слизистой оболочки носа.

Не применяйте препарат более 7 дней подряд. Длительное (более 7 дней) или чрезмерное применение препарата может усугубить течение заболевания и вызвать истончение (атрофию) слизистой оболочки носа.

Дети
Следует избегать длительного применения и превышения рекомендуемых доз.

Применение в более высоких дозах должно проводиться только под контролем врача.

Дозировка (0,5 мг + 50 мг)/мл противопоказана детям младше 2 лет.

Дозировка (1 мг + 50 мг)/мл противопоказана детям младше 6 лет.

Другие препараты и препарат Ксилазол-Реб
Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе полученные без рецепта.

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Особенно важно сообщить врачу о применении следующих лекарственных препаратов:
– ингибиторы МАО (препараты для лечения депрессии) – запрещено одновременное применение с ксилометазолином, а также в течение 14 дней после прекращения их приема;

– трициклические и тетрациклические антидепрессанты – возможно усиление нежелательных реакций, поэтому такое сочетание противопоказано.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность
Препарат Ксилазол-Реб не следует использовать во время беременности, так как отсутствуют достоверные данные о применении ксилометазолина гидрохлорида у беременных женщин.

Грудное вскармливание
Препарат Ксилазол-Реб не следует использовать во время кормления грудью, так как неизвестно, выделяется ли ксилометазолина гидрохлорид с грудным молоком.

Фертильность
Негативное влияние ксилометазолина гидрохлорида на фертильность неизвестно.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
В случае развития системных нежелательных реакций (головная боль, ощущение сердцебиения, повышение АД, нарушение зрения) воздержитесь от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ЛП-№016693-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.09.2026 № 1075
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018

Препарат Ксилазол-Реб содержит бензалкония хлорид
Бензалкония хлорид может вызывать раздражение или отек слизистой оболочки полости носа при длительном применении.

3. Применение препарата Ксилазол-Реб

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза
Дозировка (0,5 мг + 50 мг)/мл
Дети в возрасте от 2 до 6 лет
Одно впрыскивание спрея в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Доза препарата зависит от индивидуальной чувствительности и клинического эффекта.

Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых.

Дозировка (1 мг + 50 мг)/мл
Дети старше 6 лет
Одно впрыскивание спрея в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Доза препарата зависит от индивидуальной чувствительности и клинического эффекта.

Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых.

Взрослые
Одно впрыскивание спрея в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.
Не следует применять препарат более 3-х раз в сутки.

Продолжительность применения
Препарат не следует применять более 5-7 дней, за исключением случаев, когда врач рекомендует более длительное применение. О продолжительности применения у детей всегда следует консультироваться с врачом.

Повторное применение возможно только после перерыва в несколько дней.

Длительное применение препарата может привести к медикаментозному риниту.

Сообщите своему врачу, если у Вас сложилось впечатление, что действие препарата слишком сильное или слабое.

Способ применения
Препарат Ксилазол-Реб предназначен только для применения в нос.

При использовании препарата следует соблюдать следующий порядок действий:
1. снимите защитный колпачок с распылителя;
2. перед первым применением нового флакона, а также, если спреем не пользовались в течение длительного времени, нажмите несколько раз на распылитель до появления равномерного распыления;
3. наконечник распылителя введите в носовой ход, по возможности удерживая флакон в вертикальном положении и однократно нажмите на распылитель; во время впрыскивания легко вдохните;
4. повторите процедуру при введении спрея в другой носовой ход;
5. после каждого использования наконечник распылителя протрите бумажной салфеткой и закройте колпачком.

Флакон с лекарственным препаратом может использовать только один человек из-за риска передачи инфекции.

ЛП-№016693-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.09.2026 № 1075
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018

Если Вы применили препарата Ксилазол-Реб больше, чем следовало
При передозировке Вам может потребоваться медицинская помощь. При наличии симптомов передозировки немедленно обратитесь к врачу. При возможности возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы применили.
Симптомы
Ксилометазолин при местном применении чрезмерной дозы или при случайном приеме внутрь может вызывать выраженное головокружение, повышенное потоотделение, резкое снижение температуры тела, головную боль, замедление ритма сердца (брадикардию), повышение артериального давления, угнетение дыхания, кому и судороги. Вслед за повышением артериального давления может наблюдаться его резкое снижение.

При подозрении на передозировку, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. При необходимости врач предпримет надлежащие меры.

Лечение
Симптоматическое лечение под наблюдением врача. В случае тяжелого отравления с остановкой сердца реанимационные действия должны продолжаться не менее 1 часа.

Если Вы забыли применить препарат Ксилазол-Реб
Не применяйте двойную дозу препарата с целью компенсации пропущенной дозы.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно возникновение следующих нежелательных реакций:

Серьезные нежелательные реакции
Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу при развитии следующих нежелательных реакций.
Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):
– отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель, свистящие хрипы (ангионевротический отек);
– кожная сыпь, кожный зуд (аллергическая реакция).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Ксилазол-Реб

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
– головная боль;
– раздражение и/или сухость слизистой оболочки носа, жжение, покалывание;
– чихание;
– увеличение секреции (гиперсекреция) слизистой оболочки носоглотки;
– тошнота;
– жжение в месте применения.
Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):
– бессонница (при длительном применении в высоких дозах);
– депрессия (при длительном применении в высоких дозах);
– ощущение сердцебиения;
– повышение артериального давления (гипертензия);
– рвота.
Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

ЛП-№016693-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.09.2026 № 1075
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0018

– нарушения сердечного ритма (аритмия);
– нарушение четкости зрительного восприятия;
– увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия).

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через https://gospharmnadzor.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Ксилазол-Реб

Хранить при температуре не выше 25°С.

После вскрытия флакона используйте в течение 12 недель.

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Ксилазол-Реб содержит
Действующими веществами являются ксилометазолина гидрохлорид, декспантенол.

Ксилазол-Реб, (0,5 мг + 50 мг)/мл, спрей назальный
1 мл раствора содержит: ксилометазолина гидрохлорид – 0,5 мг, декспантенол – 50 мг.

Прочими (вспомогательными) веществами являются: динатрия фосфат додекагидрат, калия дигидрофосфат, бензалкония хлорид, вода очищенная.

Ксилазол-Реб, (1 мг + 50 мг)/мл, спрей назальный
1 мл раствора содержит: ксилометазолина гидрохлорид – 1,0 мг, декспантенол – 50 мг.

Прочими вспомогательными веществами являются: динатрия фосфат додекагидрат, калия дигидрофосфат, бензалкония хлорид, вода очищенная.

Внешний вид препарата Ксилазол-Реб и содержимое упаковки
Спрей назальный.

Прозрачный бесцветный раствор.

По 10 мл лекарственного препарата в стеклянном флаконе янтарного цвета с распылительной насадкой из полипропилена с защитным колпачком из полиэтилена.

1 флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Реб-Фарма».
223216, Республика Беларусь, Минская обл., Червенский р-н, г.п. Смиловичи,
ул. Садовая, 1, тел./факс: (+375) 17 240 26 35,
e-mail: rebpharma@rebpharma.by, http://www.rebpharma.by

За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Прочие источники информации

ЛП-№016693-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.09.2026 № 1075
2018

Листок-вкладыш доступен на русском языке в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/.