ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007

Листок-вкладыш – информация для пациента

Псоридерм, 0,5 мг/г, мазь для наружного применения

Действующее вещество: клобетазол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Псоридерм и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Псоридерм.
3. Применение препарата Псоридерм.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Псоридерм.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Псоридерм и для чего его применяют

Препарат Псоридерм содержит действующее вещество под названием клобетазол. Он относится к группе лекарственных препаратов, называемых глюкокортикостероидами. Препарат помогает уменьшить отек и раздражение кожи.

Показания к применению

Препарат Псоридерм применяется у взрослых и детей старше 1 года для уменьшения симптомов воспаления и зуда при некоторых кожных заболеваниях. К таким кожным заболеваниям относятся:

- псориаз (утолщенные участки воспаленной красной кожи, часто покрытые серебристыми чешуйками), кроме широко распространенного бляшечного псориаза;
- дерматозы, такие как атопический дерматит, часто рецидивирующая экзема и некоторые другие, трудно поддающиеся лечению;
- красный плоский лишай (кожное заболевание, вызывающее появление зудящих красно-фиолетовых бугорков с плоской вершиной на запястьях, предплечьях или нижних частях ног);
- дискоидная красная волчанка (заболевание, наиболее часто поражающее кожу лица, области ушей и волосистой части головы, сопровождающееся повышенной чувствительностью пораженной кожи к солнечным лучам и риском образования рубцов);

ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183

- другие кожные заболевания, которые не поддаются лечению более мягко действующими стероидными кремами или мазями.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 14–28 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Псоридерм

Противопоказания

Не применяйте препарат Псоридерм:

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на клобетазола пропионат и/или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- для лечения любого из следующих заболеваний кожи – это может ухудшить их течение:
  - нелеченые инфекции кожи;
  - розовые угри на носу, щеках, подбородке, лбу или на всем лице с видимыми «сосудистыми звездочками», с волдырями (папулами) или заполненными гноем прыщиками (пустулами) или без них (розацеа);
  - акне;
  - красная сыпь вокруг рта (периоральный дерматит);
  - кожный зуд без воспаления;
  - зуд в области ануса (заднего прохода) или гениталий (полового члена или влагалища);
- для лечения детей до 1 года;
- в период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Псоридерм проконсультируйтесь с лечащим врачом:

- если у Вас ранее была выявлена аллергия (повышенная чувствительность) на другой глюкокортикостероид или вспомогательные вещества, входящие в состав препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас псориаз, возможно, врач назначит Вам более частые визиты к нему;
- если Вы наносите мазь на большие участки кожи;
- если Вы наносите мазь на участок тела, покрытый герметичной повязкой, в том числе под детский подгузник. Эти повязки облегчают прохождение активного ингредиента через кожу, и Вы можете случайно превысить его количество. Если Вы наносите препарат Псоридерм под повязку, в том числе под детский подгузник, обязательно очищайте кожу перед наложением новой повязки, чтобы избежать развития инфекции;
- если Вы наносите мазь на поврежденную кожу или внутри кожных складок;
- если Вы применяете препарат для лечения воспаления вокруг хронических язв голеней, так как это может повышать риск возникновения местных аллергических реакций или инфекций;
- если Вы наносите мазь на тонкую кожу, например на кожу лица, так как препарат Псоридерм может вызвать истончение кожи. Не наносите препарат на кожу лица более 5 дней. При нанесении препарата на кожу лица не используйте повязки и не закрывайте участки, на которые была нанесена мазь;

ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183

- если Вы наносите мазь на кожу вокруг глаз или на веки, внимательно следите за тем, чтобы она не попала Вам в глаза. При случайном попадании мази в глаза промойте их большим количеством воды.

Обратитесь к врачу, если Вы отмечаете нечеткость зрения или другие нарушения зрения.

В случае развития инфекции во время использования препарата Псоридерм обратитесь к врачу.

Если Вы не уверены, относится ли вышеуказанное к Вам, перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Дети и подростки

- Не применяйте препарат Псоридерм для лечения детей до 1 года.
- Не применяйте препарат более 5 дней у детей, поскольку их кожа тоньше, чем у взрослых, в результате чего препарат Псоридерм может впитываться в большем количестве, а также может вызвать истончение кожи. Для продолжения лечения проконсультируйтесь с врачом.
- При применении препарата Псоридерм у детей не используйте повязки и не закрывайте участки кожи, на которые была нанесена мазь.

Другие препараты и препарат Псоридерм

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, особенно препараты, содержащие ритонавир (противовирусное средство, используемое для лечения ВИЧ-инфекции) и итраконазол (противогрибковое средство).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если Вы кормите ребенка грудью, не применяйте препарат Псоридерм.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние препарата Псоридерм на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не изучалось. Маловероятно, что препарат Псоридерм оказывает влияние на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

3. Применение препарата Псоридерм

Всегда применяйте препарат Псоридерм в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

- при стандартном режиме лечения наносите препарат Псоридерм тонким слоем один или два раза в день. Используйте ровно столько препарата, чтобы можно было покрыть весь пораженный участок кожи. Частоту нанесения и количество препарата можно уменьшать или прекратить применение по мере улучшения состояния кожи. Ваш врач может назначить Вам более слабый стероидный препарат;
- если Вы также используете смягчающее (увлажняющее) средство, после каждого применения необходимо оставить время для всасывания препарата Псоридерм в кожу перед нанесением смягчающего средства;
- эта мазь предназначена только для нанесения на кожу;

ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183

- микробы, вызывающие инфекции, размножаются в теплой и влажной среде, которая возникает под повязками. Если врач рекомендовал Вам закрывать обработанный участок кожи повязкой, всегда очищайте кожу перед тем, как наложить свежую повязку, чтобы предотвратить инфицирование кожи под повязкой.

Применение у детей:

- не применяйте лекарственный препарат Псоридерм у детей до 1 года;
- при применении у детей важно не превышать рекомендованную дозу;
- курс лечения у ребенка старше 1 года обычно не должен продолжаться более 5 дней, если только Ваш врач не назначил более продолжительное лечение. Возможно, в период применения этой мази Вашему врачу потребуется проводить осмотр ребенка еженедельно;
- при применении препарата у детей не используйте повязки и не закрывайте участки кожи, на которые была нанесена мазь.

Путь или способ применения

Как наносить мазь:

- вымойте руки;
- нанесите мазь тонким слоем на пораженные участки и аккуратно вотрите в кожу до полного впитывания;
- если Вам не нужно наносить мазь на руки для лечения, вымойте руки еще раз после использования мази.

Если Вы наносите препарат Псоридерм на лицо

Наносите мазь на лицо только по рекомендации врача. Период применения препарата на коже лица не должен превышать 5 дней, так как кожа на лице легко истончается. При нанесении препарата на кожу лица не используйте повязки и не закрывайте участки, на которые была нанесена мазь. **Не допускайте попадания мази в глаза**. При попадании мази в глаза промойте их большим количеством воды.

Продолжительность терапии

Не используйте мазь Псоридерм более 4 недель без консультации с врачом. Если Вы нуждаетесь в лечении в течение длительного времени, врач может решить, что Вам нужно использовать менее активные крем или мазь. Максимальная недельная доза не должна превышать 50 г мази в неделю.

Если состояние кожи ухудшается или не улучшается в течение 2–4 недель, обратитесь к врачу.

Для контроля обострений врач может посоветовать короткие курсы Псоридерма.

Резкое прекращение применения мази может вызвать возобновление симптомов. При достижении положительного результата лечения мазь следует отменять постепенно, врач может посоветовать применение увлажняющего крема в качестве поддерживающей терапии.

Если Вы применили препарата Псоридерм больше, чем следовало

Если Вы применили больше мази, чем следовало, или случайно проглотили ее, обратитесь за медицинской помощью настолько быстро, насколько можете.

Если Вы забыли применить препарат Псоридерм

Не наносите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенное применение препарата.

ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183

Если Вы забыли применить Псоридерм мазь, то нанесите ее на кожу, как только вспомните. Если близко время следующего применения, пропустите забытое применение и продолжайте использовать мазь в соответствии с рекомендациями.

Если Вы прекратили применение препарата Псоридерм

Если Вы применяете Псоридерм регулярно, обсудите с лечащим врачом возможность прекращения лечения для того, чтобы Ваше состояние не ухудшилось.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Псоридерм может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно прекратите применение препарата Псоридерм и сообщите своему врачу:

- если Вы обнаружите, что состояние Вашей кожи ухудшается, у Вас появляются сыпь или припухлости во время лечения. У Вас может быть аллергия на мазь, инфекционное заболевание или Вам нужно другое лечение;
- если у Вас имеется псориаз и появились волдыри, заполненные гноем, и покраснения. Это явление может возникать во время или после лечения и известно как пустулезный псориаз.

Другие нежелательные реакции, которые Вы можете заметить при применении препарата Псоридерм:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- ощущение жжения, болезненности и/или зуда в месте нанесения мази.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- истончение кожи, которое может вызвать образование растяжек;
- кровеносные сосуды под поверхностью кожи могут стать более заметными.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

Применение препарата Псоридерм в течение длительного периода времени или его применение под герметичной повязкой может привести к появлению следующих симптомов:

- увеличение массы тела;
- лунообразное лицо/округление лица;
- ожирение;
- истончение кожи;
- появление морщин;
- сухость кожи;
- изменения цвета кожи;
- усиление роста волос на теле;
- выпадение волос/отсутствие роста волос/волосы, имеющие поврежденный вид.

Могут возникнуть **другие очень редко встречающиеся кожные реакции**, к которым относятся:

- аллергическая реакция в месте нанесения;

ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007

- ухудшение состояния кожи;
- раздражение/болезненность в месте нанесения;
- покраснение;
- сыпь или крапивница;
- если у Вас имеется псориаз, то могут появиться волдыри, заполненные гноем. Это явление может возникать очень редко во время или после лечения и известно как пустулезный псориаз;
- кожная инфекция;
- акне.

У детей также могут возникать следующие симптомы:

- задержка увеличения массы тела;
- замедление роста.

Очень редко встречающиеся побочные эффекты, которые могут обнаруживаться в анализах крови или во время проведения врачом медицинского обследования:

- снижение концентрации гормона кортизола в крови;
- повышение уровня сахара в крови или моче;
- повышение артериального давления;
- помутнение хрусталика глаза (катаракта);
- повышение внутриглазного давления (глаукома);
- нарушения зрения, вызванные отслоением сетчатки глаза (центральная серозная хориоретинопатия);
- увеличение хрупкости костей за счет постепенной потери минералов (остеопороз); для подтверждения наличия у Вас данного состояния после медицинского обследования могут потребоваться дополнительные исследования.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

ГУ «Госфармнадзор»

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32-2

Телефоны: +375 (17) 271-41-76, +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 271-25-75

Электронная почта: pharm@gospharmnadzor.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://gospharmnadzor.by

Республика Армения

ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: +374 (60) 83-00-73;

Горячая линия +374 (10) 20-05-05; +374 (96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

http://www.pharm.am

5. Хранение препарата Псоридерм

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Псоридерм содержит

1 г мази содержит:

Действующие вещества: клобетазола пропионат 0,5 мг.

Прочими вспомогательными веществами являются: парафин жидкий, вазелин белый.

Внешний вид препарата Псоридерм и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Однородная, гомогенная мазь белого цвета без запаха.

По 25 г мази для наружного применения в тубе алюминиевой. По одной тубе вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Государство Палестина

Фармакар Интернешнл Компани (Фармакар Инт. Ко.)

State of Palestine, Kalandia, Ramallaha-Elmasion, Emil Habibi Str. 19

Производитель

Государство Палестина

Бирзейт Фармасьютикал Компани (БПК)

Industrial Zone, Ramallah, Palestine, P.O. Box 79

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь и Республика Армения

ЛП-№016837-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 12.10.2026 № 1183
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007

Представительство частной акционерной компании

«Pharmacare LTD» (Государство Палестина) в Республике Беларусь

г. Минск, пер. Марусинский 2-ой, д.6, каб.1-4, 220080, Республика Беларусь,

pharmacare@pharmacare.by, тел. +375 (17) 319-05-60

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте Евразийского экономического союза www.eaeunion.org.