ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Листок-вкладыш – информация для пациента

Дорекс, 30 мг, капсулы кишечнорастворимые
Дорекс, 60 мг, капсулы кишечнорастворимые

Действующее вещество: дулоксетин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат Дорекс, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Дорекс.
3. Применение препарата Дорекс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Дорекс.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что собой представляет препарат Дорекс, и для чего его применяют

Дорекс содержит активное вещество дулоксетин. Дорекс повышает уровень серотонина и норадреналина в нервной системе.
Фармакотерапевтическая группа: Антидепрессанты. Другие антидепрессанты.

Показания к применению
Дорекс используется у взрослых для лечения:
• депрессии
• генерализованного тревожного расстройства (хроническое чувство тревоги или нервозности)
• боли при диабетической нейропатии (часто описывается как жжение, колющие боли, покалывание, стреляющие или похожие на поражение электрическим током боли. Может быть потеря чувствительности в пораженной области или такие ощущения, как прикосновение, тепло, холод; надавливание может причинять боль)
Дорекс начинает действовать у большинства людей с депрессией или тревогой в течение двух недель после начала лечения, но может пройти 2-4 недели, прежде чем Вы почувствуете себя лучше. Сообщите врачу, если по прошествии этого времени Вы не почувствуете себя лучше. Ваш врач может продолжать Ваше лечение препаратом Дорекс, когда Вы чувствуете себя лучше, чтобы предотвратить возвращение депрессии или беспокойства.
У людей с болью при диабетической нейропатии может пройти несколько недель, прежде чем вы почувствуете себя лучше.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 2 месяца – необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Дорекс

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Противопоказания
Не принимайте препарат Дорекс, если:
- у Вас аллергия на дулоксетин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас заболевание печени;
- у Вас тяжелое заболевание почек;
- Вы принимаете или принимали в течение последних 14 дней другие препараты, известное как ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) (см. ниже «Другие препараты и препарат Дорекс»);
- Вы принимаете флувоксамин, который обычно используется для лечения депрессии, ципрофлоксацин или эноксацин, которые используются для лечения некоторых инфекций;
- Вы принимаете другие препараты, содержащие дулоксетин (см. ниже «Другие препараты и препарат Дорекс»).

Поговорите с лечащим врачом, если у Вас высокое кровяное давление или болезнь сердца. Врач скажет Вам, следует ли Вам принимать препарат Дорекс.

Особые указания и меры предосторожности
Перед применением препарата Дорекс проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Ниже приведены причины, по которым препарат Дорекс может Вам не подходить. Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом, если:
- Вы принимаете другие лекарства для лечения депрессии (см. «Другие лекарственные препараты и Дорекс»);
- Вы принимаете зверобой, лечебные травы (Hypericum *perforatum*);
- у Вас заболевание почек;
- у Вас случались судороги (припадки);
- у Вас была мания;
- Вы страдаете биполярным расстройством;
- у Вас есть заболевание глаз, например, некоторые виды глаукомы (повышенное внутриглазное давление);
- у Вас имело место нарушение свертываемости крови (склонность к образованию синяков), особенно если Вы беременны (см. «Беременность и грудное вскармливание»);
- Вы подвержены риску снижения уровня натрия в крови (например, если Вы принимаете диуретики, особенно если Вы - пожилой человек);
- Вы в настоящее время проходите лечение другим препаратом, который может вызвать повреждение печени;
- Вы принимаете другие препараты, содержащие дулоксетин (см. «Другие препараты и препарат Дорекс»).

Дорекс может вызвать ощущение беспокойства или неспособности сидеть, или стоять на месте. Вы должны сообщить лечащему врачу, если это произойдет с Вами.

Такие препараты, как Дорекс (так называемые СИОЗС/СИОЗСН), могут вызывать симптомы сексуальной дисфункции (см. раздел 4). В некоторых случаях эти симптомы не исчезали после прекращения лечения.

Мысли о суициде и ухудшение депрессии или тревожного расстройства
Если у Вас депрессия и/или тревожное расстройство, у Вас иногда могут возникать мысли о том, чтобы навредить себе или убить себя. Эти мысли могут усилиться при первом приеме антидепрессантов, поскольку этим препаратам требуется время, чтобы подействовать, обычно около двух недель, но иногда и дольше.
Вероятно, Вы будете так думать, если:
- у Вас и ранее были мысли о самоубийстве или причинении себе вреда;

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

- если Вы являетесь молодым взрослым человеком. Информация, полученная из клинических исследований, показала повышенный риск суицидального поведения у взрослых в возрасте до 25 лет с психическими расстройствами, которые лечились антидепрессантами.
При появлении мыслей о причинении себе вреда или самоубийстве в любое время обращайтесь к врачу или немедленно отправляйтесь в больницу.

Возможно, Вам будет полезно сказать родственнику или близкому другу, что у Вас депрессия или тревожное расстройство, и попросить их прочитать данный листок-вкладыш. Вы можете попросить их сообщить Вам, считают ли они, что Ваша депрессия или тревога ухудшается, или они обеспокоены изменениями в Вашем поведении.

Дети и подростки
Дорекс обычно не следует принимать детям и подросткам младше 18 лет. Кроме того, Вы должны знать, что пациенты младше 18 лет имеют повышенный риск развития нежелательных реакций, таких как попытка самоубийства, суицидальные мысли и враждебность (преимущественно агрессия, оппозиционное поведение и гнев), когда они принимают этот тип лекарств. Несмотря на это, Ваш лечащий врач может назначить Дорекс пациенту младше 18 лет, если решит, что это в интересах пациента. Если врач назначил Дорекс пациенту младше 18 лет, и Вы хотите обсудить это, вернитесь за консультацией к врачу. Вы должны сообщить лечащему врачу, если какие-либо из перечисленных выше симптомов развиваются или усиливаются, когда пациенты младше 18 лет принимают Дорекс. Кроме того, долгосрочные эффекты безопасности дулоксетина в отношении роста, созревания, когнитивного и поведенческого развития в этой возрастной группе еще не были продемонстрированы.

Другие препараты и препарат Дорекс
Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Активное вещество препарата Дорекс, дулоксетин, используется в других препаратах, используемых для лечения следующих состояний:
- болевой формы диабетической нейропатии,
- депрессия,
- беспокойство,
- недержание мочи.
Следует избегать одновременного приема более одного из этих препаратов.

Проконсультируйтесь с врачом, если Вы уже принимаете другие препараты, содержащие дулоксетин.
Ваш врач должен решить, можно ли принимать Дорекс с другими препаратами.

Не начинайте и не прекращайте прием каких-либо препаратов, в том числе приобретенных без рецепта или растительного происхождения, без предварительной консультации с врачом.

Вы также должны сообщить врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Вы не должны принимать Дорекс, если Вы принимаете или недавно принимали (в течение последних 14 дней) другой антидепрессант, называемый ингибитором моноаминоксидазы (ИМАО). ИМАО включают моклобемид (антидепрессант) и линезолид (антибиотик). Прием ИМАО вместе со многими препаратами, отпускаемыми по рецепту, включая Дорекс, может вызвать серьезные или даже опасные для жизни нежелательные реакции. Вы должны подождать не менее 14 дней после прекращения приема ИМАО, прежде чем Вы сможете принимать Дорекс. Кроме того, Вам необходимо подождать не менее 5 дней после прекращения приема препарата Дорекс, прежде чем начать принимать ИМАО.

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Препараты, вызывающие сонливость
Препараты, отпускаемые по рецепту врача, включая бензодиазепины, сильные обезболивающие, нейролептики, фенобарбитал и антигистаминные препараты.

Препараты, которые повышают уровень серотонина
Триптаны, трамадол, триптофан, СИОЗС (например, пароксетин и флуоксетин), СИОЗСН (например, венлафаксин), трициклические антидепрессанты (например, кломипрамин, амитриптилин), петидин, зверобой и ИМАО (такие как моклобемид и линезолид). Эти препараты увеличивают риск развития нежелательных реакций; если у Вас возникнут какие-либо необычные симптомы во время приема этих препаратов одновременно с препаратом Дорекс, Вам следует обратиться к врачу.

Пероральные антикоагулянты или антитромбоцитарные препараты
Лекарственные препараты, разжижающие кровь или предотвращающие свертывание крови. Эти препараты могут увеличить риск кровотечения.

Препарат Дорекс с пищей, напитками и алкоголем
Препарат Дорекс принимают независимо от приема пищи. Следует соблюдать осторожность, если Вы употребляете алкоголь во время лечения этим препаратом.

Беременность и грудное вскармливание
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность
Сообщите лечащему врачу, если Вы забеременели или пытаетесь забеременеть, если Вы принимаете препарат Дорекс. Вы должны использовать Дорекс только после обсуждения с врачом потенциальных преимуществ и любых потенциальных рисков для Вашего будущего ребенка.
- Убедитесь, что Ваш врач акушер-гинеколог знает, что Вы принимаете препарат Дорекс. При приеме во время беременности аналогичные препараты (СИОЗС) могут повышать риск серьезного состояния у младенцев, называемого стойкой легочной гипертензией новорожденных, из-за чего ребенок дышит чаще и выглядит синюшным. Эти симптомы обычно проявляются в течение первых 24 часов после рождения ребенка. Если это произойдет с Вашим ребенком, Вам следует немедленно связаться с врачом акушер-гинекологом.
- Если Вы примете препарат Дорекс ближе к концу беременности, у Вашего ребенка могут развиться некоторые симптомы при рождении. Обычно они развиваются при рождении или в течение нескольких дней после рождения ребенка. Эти симптомы могут включать в себя вялость мышц, дрожь, нервозность, неправильное питание, проблемы с дыханием и судороги. Если у Вашего ребенка появляются какие-либо из этих симптомов при рождении или Вы беспокоитесь о его здоровье, обратитесь за консультацией к врачу.
- Если Вы принимаете препарат Дорекс ближе к концу беременности, существует повышенный риск чрезмерного вагинального кровотечения вскоре после родов, особенно если у Вас в анамнезе есть нарушения свертываемости крови. Акушер-гинеколог должен знать, что Вы принимаете дулоксетин, чтобы дать Вам соответствующие рекомендации.
- Имеющиеся данные об использовании дулоксетина в течение первых трех месяцев беременности не показывают повышенного риска развития врожденных дефектов у ребенка. Если Дорекс принимается во второй половине беременности, может иметь место повышенный риск того, что ребенок родится раньше срока (6 дополнительных недоношенных детей на каждые 100 женщин, принимающих дулоксетин во второй половине беременности), в основном между 35 и 36 неделями беременности.

Грудное вскармливание

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Сообщите лечащему врачу, если Вы кормите грудью. Применение препарата Дорекс при кормлении грудью не рекомендуется. Вы должны обратиться за советом к Вашему лечащему врачу.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Препарат Дорекс может вызвать сонливость или головокружение. Не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или механизмы, пока не узнаете, как Дорекс влияет на Вас.

Препарат Дорекс содержит вспомогательные вещества
Препарат Дорекс содержит сахарозу.
Если врач сказал Вам, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем начать прием данного препарата.
Препарат Дорекс содержит понсо 4R (Е124), солнечный закат желтый (Е110)
Препарат содержит красители понсо 4R (Е124) и солнечный закат желтый (Е110), которые могут вызывать аллергические реакции. Не принимайте препарат Дорекс, если у Вас аллергия на эти вещества.

3. Применение препарата Дорекс

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза
Для лечения депрессии и боли при диабетической нейропатии
Обычная доза Дорекса составляет 60 мг один раз в сутки, но Ваш врач назначит Вам дозу, которая подходит именно Вам.

Для лечения генерализованного тревожного расстройства
Обычная начальная доза Дорекс составляет 30 мг один раз в сутки, после чего большинству пациентов назначают 60 мг один раз в сутки, но Ваш врач назначит дозу, которая подходит именно Вам. Доза может быть увеличена до 120 мг в сутки в зависимости от вашей реакции на препарат Дорекс.

Путь и (или) способ введения
Дорекс предназначен для приема внутрь.
Вы должны проглотить капсулу целиком, запивая водой.
Чтобы не забыть принять Дорекс, возможно, Вам будет проще принимать его в одно и то же время каждый день.

Продолжительность терапии
Поговорите с лечащим врачом о том, как долго Вам следует продолжать прием препарата. Не прекращайте прием Дорекса и не меняйте дозу, не посоветовавшись с врачом. Правильное лечение Вашего расстройства важно для того, чтобы Вы почувствовали себя лучше. Если Ваше заболевание не лечить, Ваше состояние может ухудшиться и лечить Ваше заболевание будет еще труднее.

Если Вы приняли препарата Дорекс больше, чем следовало
Немедленно позвоните лечащему врачу, если Вы приняли больше препарата Дорекс, чем предписано врачом. Симптомы передозировки включают сонливость, кому, серотониновый синдром (редкая реакция, которая может вызывать сонливость, неуклюжесть, беспокойство, чувство опьянения, повышение температуры тела, потливость или ригидность мышц), припадки, рвоту и учащенное сердцебиение.

Если Вы забыли принять препарат Дорекс
Если Вы пропустили дозу, примите ее сразу, как только вспомните. Однако, если пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и принимайте только разовую

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

дозу, как обычно. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Не принимайте больше суточного количества препарата Дорекс, которое было предписано Вам в течение одного дня.

Если Вы прекратили прием препарата Дорекс
НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ ПРИЕМ ПРЕПАРАТА Дорекс без консультации врача, даже если Вы чувствуете себя лучше. Если врач считает, что Вам больше не нужно принимать Дорекс, он попросит Вас уменьшить дозу как минимум в течение 2 недель, прежде чем полностью прекратить лечение.
У некоторых пациентов, которые внезапно прекращают прием препарата Дорекс, появляются такие симптомы, как: головокружение, покалывание, как иголки или электрошокер (особенно в области головы), нарушение сна (яркие сны, кошмары, неспособность заснуть), усталость, сонливость, чувство беспокойства или возбуждения, тошнота, рвота, дрожь (тремор), головная боль, мышечная боль, чувство раздражительности, диарея, чрезмерное потоотделение или головокружение. Эти симптомы обычно не являются серьезными и исчезают в течение нескольких дней, но если у Вас есть симптомы, которые вызывают у Вас беспокойство, Вам следует обратиться за советом к лечащему врачу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Дорекс может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Выраженность этих реакций бывает от слабой до умеренной степени и в основном они исчезают через несколько недель после начала приема препарата.

Нежелательные реакции, которые могут возникать при применении препарата Дорекс
Очень часто - могут возникать у более чем 1 человека из 10:
- головная боль, чувство сонливости
- тошнота, сухость во рту

Часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10:
- потеря аппетита;
- нарушение сна, чувство возбуждения, снижение полового влечения, беспокойство, трудности или неспособность испытать оргазм, необычные сновидения;
- головокружение, чувство вялости, тремор, онемение, покалывание в области кожи;
- затуманенное зрение;
- шум в ушах;
- ощущение сердцебиения;
- повышение артериального давления, приливы;
- усиление зевоты;
- запор, диарея, боль в животе, тошнота (рвота), изжога, метеоризм;
- повышенное потоотделение, сыпь на коже;
- мышечная боль, мышечный спазм;
- болезненное мочеиспускание, частое мочеиспускание;
- проблемы с эрекцией, изменение эякуляции;
- падения (в основном у пожилых людей), повышенная утомляемость;
- снижение массы тела.

Дети и подростки в возрасте до 18 лет с депрессией, получавшие этот препарат, немного похудели, когда они впервые начали принимать дулоксетин. Через 6 месяцев после начала лечения вес подростков увеличился до цифр, соответствующих весу других детей и подростков их возраста и пола.

Нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100:

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

- воспаление горла и охриплость голоса;
- суицидальные мысли, трудности с засыпанием, скрежетание или сжатие зубов, чувство дезориентации, отсутствие мотивации;
- внезапные непроизвольные подергивания мышц, ощущение беспокойства или неспособности сидеть или стоять на месте, нервозность, трудности с концентрацией внимания, изменение вкуса, трудности с контролем движений, например, отсутствие координации или непроизвольные движения мышц, синдром беспокойных ног, плохое качество сна;
- расширенные зрачки, нарушение зрения;
- ощущение головокружения (вертиго), боль в ушах;
- частое и / или нерегулярное сердцебиение;
- обморок, головокружение или обморок при вставании, холодные пальцы рук и/или ног;
- чувство сдавления в горле, кровотечение из носа;
- рвота кровью или черный дегтеобразный стул, гастроэнтерит, отрыжка, затрудненное глотание;
- воспаление печени, которое может вызвать боль в животе и пожелтение кожи или белков глаз;
- ночная потливость, крапивница, холодный пот, чувствительность к солнечному свету, повышенная склонность к образованию синяков;
- напряжение мышц, мышечные подергивания;
- затруднение или неспособность мочеиспускания, затрудненное начало мочеиспускания, потребность в мочеиспускании в течение ночи, потребность в мочеиспускании большего количества мочи, чем обычно, ослабление струи мочи;
- аномальное вагинальное кровотечение, нарушение менструации, включая тяжелые, болезненные, нерегулярные или продолжительные менструации, необычно легкие или пропущенные месячные; боль в яичках или мошонке;
- боль в груди, ощущение холода, жажда, дрожь, ощущение жара, нарушение походки;
- увеличение массы тела;
- дулоксетин может вызывать эффекты, о которых вы, возможно, не подозреваете, такие как повышение уровня ферментов печени или уровня калия, креатинфосфокиназы, сахара или холестерина в крови.

Редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 1000:
- серьезная аллергическая реакция, вызывающая затруднение дыхания или головокружение, отек языка и губ, аллергические реакции;
- снижение активности щитовидной железы, что может вызвать усталость или увеличение массы тела;
- обезвоживание, низкий уровень натрия в крови (в основном у пожилых людей; симптомы могут включать в себя головокружение, слабость, спутанность сознания, сонливость или сильную усталость, тошноту, более серьезные симптомы - обмороки, припадки или падения), синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона;
- суицидальное поведение, мания (чрезмерная активность, гонка мыслей и снижение потребности во сне), галлюцинации, агрессия и гнев;
- «серотониновый синдром» (редкая реакция, которая может вызвать ощущение большого счастья, сонливость, неуклюжесть, беспокойство, чувство опьянения, лихорадку, потливость или напряжение мышц);
- повышенное внутриглазное давление (глаукома);
- кашель, хрипы и одышка, которые могут сопровождаться высокой температурой тела;
- воспаление ротовой полости, выделение ярко-красной крови в стуле, неприятный запах изо рта, воспаление толстой кишки (что приводит к диарее);
- печеночная недостаточность, пожелтение кожи или белков глаз (желтуха);

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

- Синдром Стивенса-Джонсона (серьезное заболевание с образованием волдырей на коже, во рту, глазах и гениталиях), серьезная аллергическая реакция, вызывающая отек лица или горла (ангионевротический отек);
- сокращение челюстных мышц;
- необычный запах мочи;
- симптомы менопаузы, выделение грудного молока у мужчин или женщин;
- чрезмерное вагинальное кровотечение вскоре после родов (послеродовое кровотечение).

Очень редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000:
- воспаление кровеносных сосудов кожи (кожный васкулит).

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях лекарственного препарата напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза.
Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь
«УП Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.
Телефон: +375 (17) 242-00-29.
Факс: +375 (17) 242-00-29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: https//www.rceth.by

5. Хранение препарата Дорекс

• Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
• Храните препарат при температуре ниже +25 °С.
• Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на блистере и картонной упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
• Не принимайте препарат, если Вы заметили, что упаковка повреждена или имеет признаки вскрытия.
• Не выбрасывайте препараты в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожить) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Дорекс содержит

Действующим веществом является дулоксетин.
Каждая капсула содержит 30 мг или 60 мг дулоксетина.

Вспомогательными веществами являются:

Содержимое капсулы:
сахарные сферы (пеллеты нонпарель) №25-30,
гидроксипропилметилцеллюлоза,
тальк.

Изолирующая оболочка:
гидроксипропилметилцеллюлоза,

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

сахароза (сахар гранулированный №30-40),
тальк.

Кишечнорастворимая оболочка:
гипромеллозы ацетата сукцинат (AQOAT AS-LF),
триэтилцитрат,
тальк,
титана диоксид,
тальк очищенный.

Состав оболочки капсулы 30 мг:
желатин,
вода очищенная,
натрия лаурилсульфат,
метилпарабен,
пропилпарабен,
титана диоксид (Е171),
понсо 4R (Е124),
бриллиантовый голубой (Е133),
солнечный закат желтый (Е110).

Состав оболочки капсулы 60 мг:
желатин,
вода очищенная,
натрия лаурилсульфат,
титана диоксид (Е171),
железа оксид желтый (Е172),
железа оксид черный (Е172),
железа оксид красный (Е172).

Внешний вид препарата Дорекс и содержимое упаковки
Внешний вид
Дорекс 30 мг: Твердые желатиновые капсулы, с коричневой крышечкой и белым корпусом.
Дорекс 60 мг: Твердые желатиновые капсулы, с коричневой крышечкой и темно-желтым корпусом.

Содержимое упаковки
7 капсул в блистере ОПА-Ал-ПВХ/Ал. 4 блистера и листок-вкладыш в картонной упаковке.

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения:
«Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.», Индия.
«Sun Pharmaceutical Industries Ltd.», India.
Sun House, 201/B-l, Western Express Highway,
Goregaon (E), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India.

Производитель:
«Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.», Индия
(«Sun Pharmaceutical Industries Ltd.»), India
Village Ganguwala, Paonta Sahib -173 025,
District Sirmour, Himachal Pradesh, India.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ЛП-№016908-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 21.10.2026 № 1251
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006

Республика Беларусь
Представительство ООО «SUN Pharmaceutical Industries Ltd.»
Адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф.1118-34.
Тел.: +375 17 364-54-57.
Электронная почта: pv.eaeu@sunpharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации
Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа Евразийского экономического союза http://eec.eaeunion.org/.