ЛП-№016911-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 22.10.2026 № 1255
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

Листок-вкладыш – информация для пациента

Фурацилин, 2 мг/г, мазь для наружного применения

Действующее вещество: нитрофурал (нитрофуразон)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается через 3 дня или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фурацилин и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин.

3. Применение препарата Фурацилин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Фурацилин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Фурацилин и для чего его применяют

Данный лекарственный препарат содержит действующее вещество нитрофурал (нитрофуразон), которое относится к группе лекарственных препаратов, называемых «Антисептики и дезинфицирующие средства. Производные нитрофурана».

Показания к применению

Препарат Фурацилин показан к применению у взрослых в возрасте старше 18 лет в лечении гнойных ран, пролежней, язв, ожогов II и III степени, обморожения II-III степени, мелких повреждений кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Способ действия препарата Фурацилин

Нитрофурал, являющийся действующим веществом данного препарата, обладает антимикробным действием. Механизм действия нитрофурала заключается в изменении структуры различных молекул в клетке, что тем самым вызывает гибель бактерий.

Устойчивость к препарату у отдельных видов бактерий может быть различной в зависимости от времени и региона проживания.

Если улучшение не наступило через 3 дня или Вы чувствуете ухудшение, Вам необходимо обратиться к врачу.

ЛП-№016911-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 22.10.2026 № 1255
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин

Противопоказания

Не применяйте препарат Фурацилин, если:

– у Вас аллергия на нитрофурал, другим производным нитрофурана или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

– Вы страдаете аллергическими дерматозами;

– у Вас наблюдается кровотечение из раны.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Фурацилин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у беременных (см. раздел 2 «Беременность, грудное вскармливание и фертильность»).

Если у Вас остались вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки.

Дети и подростки

Безопасность и эффективность применения нитрофурала у детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют. Не рекомендуется применение лекарственного препарата у младенцев и детей раннего возраста.

Другие препараты и препарат Фурацилин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Лекарственный препарат может быть назначен только врачом.

Беременность

Безопасность и эффективность применения препарата в период беременности не установлены. Данные отсутствуют. Если Вы беременны, Вам не рекомендуется применять препарат Фурацилин. Посоветуйтесь с врачом перед началом применения препарата.

Грудное вскармливание

Безопасность и эффективность применения препарата в период грудного вскармливания не установлены. Данные отсутствуют. Если Вы кормите грудью, Вам не рекомендуется применять препарат Фурацилин. Посоветуйтесь с врачом перед началом применения препарата.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Фурацилин не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Фурацилин

ЛП-№016911-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗ от 22.01.2026 № 1255
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Для лечения ожогов и обморожений II-III степени, поверхностных ран кожи мазь наносят тонким слоем 1-3 раза в сутки.

Необходимо учитывать официальные национальные рекомендации по назначению и использованию антибактериальных препаратов. При появлении вопросов или сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение у детей и подростков

Детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет лекарственный препарат может быть назначен только врачом.

Путь и (или) способ введения

Препарат Фурацилин предназначен для наружного применения. Возможно применение под марлевые повязки.

Продолжительность терапии

Рекомендуемая продолжительность лечения составляет 2-3 дня.

Если состояние не улучшается через 3 дня или оно ухудшается, посоветуйтесь с Вашим врачом.

Если Вы применили препарата Фурацилин больше, чем следовало

Не было выявлено случаев передозировки препаратом Фурацилин.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Фурацилин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного или нескольких из следующих признаков аллергической реакции или дерматита в месте нанесения препарата: покраснение кожи, появление сыпи или волдырей, зуд, отек кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

ЛП-№016911-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 22.10.2026 № 1255
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: http://www.rceth.by

5. Хранение препарата Фурацилин

Храните препарат Фурацилин в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке (тубе, картонной пачке). Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 ºС.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Фурацилин содержит

Действующим веществом является: нитрофурал (нитрофуразон).

Каждый грамм мази для наружного применения содержит 2 мг нитрофурала (нитрофуразона).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: парафин мягкий белый.

Внешний вид препарата Фурацилин и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Мазь желтого цвета.

По 25 г в тубах алюминиевых с бушонами из полимерного материала.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

Электронная почта: market@borimed.com

Перечень представителей держателя регистрационного удостоверения

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс +375 (177) 73-56-12, 74-42-80

Электронная почта: market@borimed.com

ЛП-№016911-РГ-BY
УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИКАЗОМ от 22.10.2026 № 1255
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Листок-вкладыш доступен на русском языке в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте экспертной организации https://rceth.by