

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель



В.Н. Руденко

Руденко

август 2009 г

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ (информация для пациента) по медицинскому применению препарата **Борная кислота** **(Acidum boricum)**

Торговое название: Борная кислота.

Международное непатентованное название: Борная кислота, Boric acid.

Лекарственная форма: порошок 10 г.

Описание: Бесцветные, блестящие, слегка жирные на ощупь чешуйки или мелкий кристаллический порошок, без запаха. Летуч с парами воды и спирта.

Состав: кислоты борной - 10 г.

Фармакотерапевтическая группа антисептическое средство.

Код ATX: D08AD.

Показания к применению

Конъюнктивит, отит, экзема (в т.ч. мокнущая), дерматит, пиодермия, опрелость, кольпит; педикулез.

Противопоказания

Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность, острые воспалительные заболевания кожи; беременность, детский возраст (до 1 года), период лактации.

Способ применения и дозы

Наружно. При конъюнктивитах промывают конъюнктивальный мешок 2 % водным раствором.

При заболеваниях кожи обрабатывают пораженные поверхности или используют в виде примочек 3 % растворов в этаноле. При остром и хроническом отите закапывают

по 3 - 5 капли или вводят в виде турунды в наружный слуховой проход 2 - 3 раза в день в виде 0,5, 1, 2 и 3 % раствора в этаноле. При кольпитах и опрелостях смазывают пораженные участки 10 % раствором в глицероле.

Побочное действие

Тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, десквамация эпителия, головная боль, спутанность сознания, судороги, нарушение функции почек.

Особые указания

Избегать нанесения на слизистые оболочки и на обширные поверхности тела.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, нарушение функций сердечно-сосудистой системы, угнетение центрально-нервной системы, гипотермия, шок, кома, эритематозные высыпания (возможен летальный исход в течение 5 - 7 дней). Симптомы хронической интоксикации (при длительном приеме) - истощение, стоматит, экзема, местный отек тканей, нарушение менструального цикла, анемия, судороги, алопеция.

Лечение: симптоматическое. Переливание крови, гемо- и перitoneальный диализ.

При проявлении симптомов передозировки немедленно обратиться к врачу.

Форма выпуска

Порошок в пакетах по 10 г.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Адрес производителя

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь
Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27.

Тел. 8-(0177)- 73-24-25