

**Камистад[®], 20 мг/г + 185 мг/г, гель для местного применения**

Действующие вещества: Лидокаин + Ромашки аптечной цветков экстракт

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается спустя 7 дней лечения или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка:

1. Что из себя представляет препарат Камистад[®] гель, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Камистад[®] гель
3. Применение препарата Камистад[®] гель
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Камистад[®] гель
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Камистад[®] гель, и для чего его применяют
Камистад[®] гель является комбинированным препаратом для местного применения при заболеваниях полости рта. Лидокаин оказывает местноанестезирующее действие, которое способствует быстрому и продолжительному уменьшению боли при воспалении и повреждении слизистой оболочки полости рта и десен. Экстракт цветков ромашки обладает противовоспалительными, антисептическими и регенерирующими свойствами.

Применяется для кратковременной симптоматической терапии при воспалительных заболеваниях десен и слизистой оболочки полости рта легкой степени тяжести.

Если улучшение не наступило спустя 7 дней лечения или Вы чувствуете ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Камистад[®] гель**Не применяйте препарат Камистад[®] гель:**

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на лидокаин (а также другие местные анестетики амидного типа), ромашку (а также на растения семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема) или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- у детей в возрасте до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Камистад[®] гель обратитесь за консультацией к врачу или

работнику аптеки.

Избегайте попадания геля в глаза. Не наносите гель на открытые раны. После нанесения геля тщательно вымойте руки.

Препараты, содержащие лидокаин, следует с осторожностью применять у детей старше 12 лет, у пожилых и ослабленных пациентов, пациентов с заболеваниями сердца (нарушения сердечной проводимости, аритмии), заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гиповолемией, шоком, нарушением дыхательной функции, неврологическими заболеваниями (эпилепсия, миастения).

Другие препараты и препарат Камистад® гель

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы применяете или собираетесь применять любые другие лекарства.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Беременность, грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Данных о применении лекарственного средства в период беременности и лактации нет. В связи с этим применение препарата при беременности и лактации не рекомендуется.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Данные о влиянии препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами отсутствуют.

Препарат Камистад® гель содержит бензалкония хлорид

Бензалкония хлорид, входящий в состав лекарственного средства, может вызвать раздражение кожи.

3. Применение препарата Камистад® гель

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза, если врач не назначил иное:

Взрослые и дети старше 12 лет

Полоску геля длиной 0,5 см наносят на воспаленные участки 3 раза в сутки и слегка втирают.

Применение у детей до 12 лет

Вследствие отсутствия достаточных клинических исследований Камистад® противопоказан к применению у детей младше 12 лет.

Способ и продолжительность применения

Гель наносят на воспаленные участки и осторожно втирают.

Продолжительность лечения

Длительность применения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, обратитесь к врачу.



Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в листке-вкладыше.

Если Вы применили Камистад® гель больше, чем следовало

В результате избыточного проглатывания геля возможно снижение чувствительности слизистой оболочки глотки, сопровождающейся нарушением глотания.

С учетом данной лекарственной формы развитие системных токсических эффектов лидокаина в случае передозировки (нарушения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы) маловероятно.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение геля и обратиться к врачу.

Если Вы забыли применить препарат Камистад® гель

Продолжайте лечение в обычном режиме, как только вспомните. Не наносите больше геля, чем обычно.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении данного препарата возможны следующие нежелательные реакции:

Нечастые побочные эффекты (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- после нанесения геля возможно преходящее ощущение жжения.

Очень редкие побочные эффекты (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- из-за содержания лидокаина и ромашки, а также в случае гиперчувствительности к растениям семейства астровых (например, полынь), перуанскому бальзаму препарат может вызывать развитие аллергических реакций (например, контактный дерматит).

В случае развития реакций гиперчувствительности на коже или слизистых оболочках необходимо прекратить применение геля и немедленно обратиться к врачу.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Камистад® гель

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

После вскрытия тубы используйте гель в течение 12 месяцев.

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Камистад® гель

Действующими веществами являются лидокаин и ромашки аптечной цветков экстракт.

1 г геля содержит: лидокаина гидрохлорида моногидрат – 20,0 мг, ромашки аптечной цветков экстракт (1:4-5) (экстрагент – этанол 50 % (об) с триметамолом 1,37 %) – 185,0 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: бензалкония хлорид 50 % раствор, коричника цейлонского коры масло, натрия сахаринат, карбомер, триметамол, муравьиная кислота, этанол 96 %, вода очищенная.

Внешний вид препарата Камистад® гель и содержимое упаковки

Гель для местного применения.

Гель желто-коричневого цвета.

По 10 г в тубы алюминиевые с навинчивающейся крышкой из полиэтилена. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Штада Арцнаймиттель АГ, Германия

Штадаштрассе 2-18, D-61118 Бад-Фильбель, Германия

Тел.: (+49) 6101-60 30

Факс: (+49) 6101-60 32 59

Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного удостоверения:

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603105

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен