


9297 - 2019

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ
PECTOLVAN HEDERA HELIX

- Перед использованием лекарственного средства ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ вы должны проконсультироваться с врачом.
- Внимательно прочтайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать прием/использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.
- Для достижения оптимальных результатов лекарственное средство следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции (листке-вкладыше).
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило после проведенного лечения.
- Это лекарственное средство прописано только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Общая характеристика:**Международное непатентованное название:** *Hederae helicis folium*;**Описание:** твердые желатиновые капсулы № 3, корпус капсул и крышечка - темно-зеленого цвета. Содержимое капсул - порошок светло-коричневого цвета, который содержит небольшие частички от светлого до более темного цвета.**Состав лекарственного средства:****действующее вещество:** сухой экстракт листьев плюща обыкновенного;1 капсула содержит 52,5 мг плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (*Hederae helicis folium*) (DER 4-8:1, экстрагент – этанол 30 %);**вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая, мальтодекстрин, крахмал кукурузный, коповидон, магния стеарат;**состав оболочки капсулы:** желатин, диоксид титана (Е 171), оксид железа желтый (Е172), индиготин (Е 132).**Форма выпуска.**

Капсулы.

Код классификации лекарственного средства.

Отхаркивающие средства. Код ATX R05C A12

Фармакологические свойства.

Действующим веществом лекарственного средства является сухой экстракт листьев плюща. Отхаркивающее действие предположительно связано с раздражением слизистой оболочки желудка, при котором рефлекторно стимулируются секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов.

Показания к применению.

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозировка.

9297 - 2019

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза 105 мг экстракта.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства, курс лечения обычно составляет 7 дней. В случае отсутствия улучшения состояния во время приема лекарственного средства необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, зуд, покраснение кожи, крапивница, отек Квинке, анафилактические реакции, диспноэ, удушье.

Желудочно-кишечные расстройства, в том числе боль в животе, тошнота, рвота, диарея.


Частота развития указанных нежелательных реакций не установлена.

В случае появления каких-либо нежелательных реакций следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также растениям семейства аралиевых (*Araliaceae*).

Детский возраст до 12 лет.



Передозировка.

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею, возбуждение. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности.

Необходимо с осторожностью назначать лекарственное средство пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.

Суточная доза капсул Пектолван® плющ (2 капсулы) содержит 0,00675 ХЕ, что нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации не рекомендован.

Дети.

Препарат можно применять детям с 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работу с другими механизмами.

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не рекомендовано одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, такими как, кодеин или дексрометорфан.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

НД РБ

9297 - 2019

Условия хранения и срок годности.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта.

Упаковка.

По 10 капсул в блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем) в пачке.

Название и местонахождение производителя.

АО «Фармак». Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

