


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного средства «Фурацилин, раствор для наружного применения 0,02 %»

Регистрационный номер -

Название лекарственного средства. Фурацилин.

Состав лекарственного средства:

Фурацилина	- 40 мг	- 80 мг
Натрия хлорида	- 1800 мг	- 3600 мг
Воды для инъекций	до 200 мл	до 400 мл

Описание. Прозрачный раствор желтого цвета.

Лекарственная форма. Раствор для наружного применения 0,02 %.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептики и дезинфицирующие лекарственные средства. Производные фурана.

Код ATX: D08AF01.

Фармакологические свойства. Фармакодинамика. «Фурацилин, раствор для наружного применения 0,02 %» является противомикробным средством из группы производных нитрофурана. При попадании в микробную клетку нитрофураны, благодаря наличию нитрогруппы (N_2O), присоединенной к фурановому ядру, а так же ненасыщенной азотсодержащей связи ($C=N$) в боковой цепи, могут выступать как конкурентные акцепторы ионов водорода в метаболической цепи переноса электронов с flavиновых ферментов на цитохром. Они ингибируют энергообразование в клетке и тем самым подавляют рост и размножение микробов. Показано также, что нитрофураны подавляют образование лимонной кислоты из щавелеуксусной, т.е. ингибируют нормальный ход реакций в цикле Кребса.

Фармакокинетика. «Фурацилин» активен в отношении различных грамположительных и грамотрицательных бактерий (стафилококки,

стрептококки, дизентерийная палочка, кишечная палочка, сальмонелла паратифа, возбудитель газовой гангрены и др.).

Показания к применению. Раствор «Фурацилин» применяют наружно для лечения и предупреждения гнойно-воспалительных процессов. Он используется для лечения гнойных ран, пролежней, язв, ожогов II и III степени, остеомиелита, эмпиемы плевры, фурункулов наружного слухового прохода, воспаления придаточных пазух носа.

Способ применения и дозы. Перед введением врач обязан провести визуальный осмотр бутылки с лекарственным средством. Раствор должен быть прозрачным, не содержать взвешенных частиц или осадка. Лекарственное средство считается пригодным для использования при наличии этикетки, сохранении герметичности упаковки и отсутствии трещин на бутылке. Результаты визуального осмотра и данные этикетки (наименование лекарственного средства, предприятие-изготовитель, номер серии и сроки годности) регистрируются в истории болезни больного.

Водным раствором фурацилина промывают гнойные раны, пролежни и язвы, ожоги II и III степени кожи и слизистых оболочек. Лекарственное средство используют для орошения гранулирующей поверхности при подготовке к пересадкам кожи. При остеомиелите раствором промывают полости и накладывают влажную повязку. При эмпиеме плевры раствором промывают плевральную полость после отсасывания гноя с последующим введением туда 20-100 мл лекарственного средства. При анаэробной инфекции, помимо обычного хирургического вмешательства, рану обрабатывают раствором «Фурацилин».

Раствор «Фурацилин» используют при лечении фурункулов наружного слухового прохода и эпизмы околоносовых пазух. Лекарственное средство закапывают в конъюнктивальный мешок при конъюнктивитах и скрофулезных заболеваниях глаз.

Побочное действие. У некоторых пациентов при применении раствора «Фурацилин» могут развиться аллергические дерматозы. При появлении у больных подобных явлений следует сделать перерыв в лечении или отменить лекарственное средство.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к лекарственному средству (идиосинкразия). Раствор «Фурацилин» противопоказан больным с хроническими аллергическими дерматозами.

Передозировка. Не описана.

Беременность и лактация. Наружное применение раствора «Фурацилин» не противопоказано у беременных и кормящих грудью женщин.

Особенности применения. Особую осторожность требуется соблюдать при применении раствора у больных с повышенной чувствительностью к производным нитрофурана.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Использование растворов «Фурацилин» можно сочетать с применением других лекарственных средств.

Условия хранения и срок годности. «Фурацилин, раствор для наружного применения 0,02 %» хранят в защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Не замораживать.

Срок годности 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Упаковка. По 200 мл и 400 мл в бутылках стеклянных для крови, вместимостью 250 мл и 450 мл соответственно.

Условия отпуска. Без рецепта.

Производитель, страна

Произведено ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»;
пос. Альба, ул. Заводская, 1;
Несвижский район; Минская область;
Республика Беларусь, 222603;
Тел./факс +375 (1770) 62001/62073.

Контактное лицо, действующее по поручению заявителя начальник бюро стандартизации.

Адрес, телефон ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, 222603, пос. Альба, ул. Заводская, 1, Несвижский район, Минская обл., Республика Беларусь. Т/факс 62001, тел. 62073.