

9819 - 2023

Листок-вкладыш: информация для пациентов

Амоксиклав® 2х, (400 мг+57 мг)/5 мл, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.


амоксциллин/клавулановая кислота

Перед приемом препарата полностью прочитайте данный листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Данный препарат обычно назначается детям. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вашего ребенка возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Амоксиклав 2х, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Амоксиклав 2х.
3. Прием препарата Амоксиклав 2х.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Амоксиклав 2х.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.



1. Что из себя представляет препарат Амоксиклав 2х, и для чего его применяют.

Амоксиклав является антибиотиком, который уничтожает бактерии, вызывающие инфекции. Он содержит два действующих вещества: амоксициллин и клавулановую кислоту. Амоксициллин относится к группе лекарственных препаратов, которые называются «пенициллины». Амоксициллин иногда может становиться неэффективным (неактивным) вследствие того, что бактерии вырабатывают устойчивость к его действию. Второе действующее вещество препарата (клавулановая кислота) препятствует этому.

Препарат Амоксиклав 2х применяется для лечения следующих инфекций у детей:

- острый бактериальный синусит (адекватно диагностированный);
- острый средний отит;
- обострение хронического бронхита (адекватно диагностированное);
- внебольничная пневмония;
- цистит;
- пиелонефрит;
- инфекции кожи и мягких тканей, в частности воспаление подкожной клетчатки, раны от укусов животных, тяжелый абсцесс зуба с распространенной флегмоной;
- инфекции костей и суставов, в частности остеомиелит.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Амоксиклав 2х.

Вашему ребенку нельзя применять препарат Амоксиклав 2х:

- если у него аллергия на амоксициллин, клавулановую кислоту или любой вспомогательный компонент данного лекарственного препарата (перечень см. в разделе 6).

- если у вашего ребенка уже была тяжелая реакция гиперчувствительности (аллергическая реакция) на какой-либо другой антибиотик. Сюда относятся кожная сыпь или отеки лица или шеи.
- если у вашего ребенка во время приема какого-либо антибиотика уже были проблемы с печенью или желтуха (пожелтение кожи)

Не применяйте препарат Амоксиклав для вашего ребенка, если один из этих пунктов относится к нему. Если у вас есть другие вопросы, перед применением препарата Амоксиклав 2х обсудите их с врачом или работником аптеки.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Амоксиклав 2х проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, если:

- у вашего ребенка инфекционный мононуклеоз;
- ваш ребенок получает лечение в связи с проблемами с печенью или с почками;
- у вашего ребенка нерегулярное мочеиспускание и снижено выделение мочи.

Если вы не уверены, касаются ли данные сведения вашего ребенка, то перед применением препарата Амоксиклав 2х обсудите это с врачом или работником аптеки.

В определенных случаях врач может определить тип бактерии, вызывающей инфекцию у вашего ребенка. В зависимости от результатов может быть назначена другая доза препарата Амоксиклав 2х или другой лекарственный препарат.

Состояния, на которые необходимо обратить внимание

Препарат Амоксиклав 2х способен ухудшить существующие состояния или привести к серьезным нежелательным реакциям. К ним относятся аллергические реакции, судорожные приступы и воспаление толстой кишки. Во время лечения ребенка препаратом Амоксиклав вам необходимо обратить внимание на определенные симптомы для того, чтобы снизить риск возникновения нежелательных реакций. См. «Нежелательные реакции, на которые необходимо обратить внимание» в разделе 4.

Анализ крови и мочи

Если вашему ребенку делают анализы крови (напр., исследование эритроцитов или анализ печеночных показателей) или анализ мочи (на глюкозу), необходимо проинформировать врача или медицинскую сестру о том, что ваш ребенок принимает препарат Амоксиклав 2х. Это необходимо, так как препарат Амоксиклав 2х может влиять на результаты таких анализов.

Другие препараты и препарат Амоксиклав 2х

Проинформируйте своего врача или работника аптеки, если ваш ребенок принимает/использует, недавно принимал/использовал или будет принимать/использовать другие лекарственные препараты.

Прием **аллопуринола** (для лечения подагры) вместе с препаратом Амоксиклав 2х, повышает вероятность возникновения аллергической кожной реакции.


Одновременный прием **пробенецида** (для лечения подагры) может снизить выведение амоксициллина и поэтому не рекомендуется.

При приеме лекарственных препаратов для предотвращения образования сгустков крови (например, **варфарин**) вместе с препаратом Амоксиклав 2х могут потребоваться дополнительные анализы крови.

При приеме **метотрексата** (применяется для лечения рака, тяжелого псориаза или ревматических заболеваний), пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что потенциально может привести к усилению нежелательных реакций.

Препарат Амоксиклав 2х может влиять на эффективность **микофенолата мофетила** (лекарственного препарата, который предотвращает отторжение пересаженных органов).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность



Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Амоксиклав 2х может вызывать нежелательные реакции (например, аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами.

Если после приема препарата вы почувствовали ухудшение самочувствия, вам нельзя управлять транспортным средством или работать с механизмами.

Препарат Амоксиклав 2х содержит аспартам, калий, натрий, бензиловый спирт и этанол.

Препарат Амоксиклав 2х содержит 16,64 мг аспартама в 5 мл приготовленной суспензии. Аспартам является источником фенилаланина. Он может оказаться вредным для людей с фенилкетонурией, редким генетическим заболеванием, при котором фенилаланин накапливается из-за того, что организм не может удалить его должным образом.

Препарат Амоксиклав 2х содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия (5,9 мг) в 5 мл приготовленной суспензии, то есть он является практически не содержащим натрия.

Препарат Амоксиклав 2х содержит менее 1 ммоль (39 мг) калия (12 мг) в 5 мл приготовленной суспензии, то есть он является практически не содержащим калия.

Препарат Амоксиклав 2х содержит следовые количества бензинового спирта (содержится в клубничном ароматизаторе). Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции. Бензиловый спирт связан с риском серьезных нежелательных реакций, включая проблемы с дыханием (так называемый «гаспинг-синдром»), у маленьких детей. Если вы беременны, кормите грудью или страдаете заболеванием печени или почек, обратитесь за советом к врачу, так как бензиловый спирт может накапливаться в вашем организме в значительном количестве и вызывать побочные эффекты (так называемый «метаболический ацидоз»). Не применяйте препарат у маленьких детей (младше 3 лет) более недели, если это не рекомендовано вашим врачом.

Амоксиклав содержит 0,0013 мг алкоголя (этанола) в 5 мл готовой суспензии. Количество этанола в 5 мл приготовленной суспензии препарата меньше, чем в 1 мл пива или 1 мл вина. Незначительное количество алкоголя в препарате не оказывает заметного воздействия.

3. Прием препарата Амоксиклав 2х

Всегда применяйте препарат Амоксиклав 2х в точном соответствии с предписанием врача. Если у вас имеются вопросы, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

Взрослые, подростки и дети с массой тела 40 кг и более

- Данная лекарственная форма обычно не рекомендуется взрослым и детям с массой тела 40 кг и более. Обратитесь к врачу или работнику аптеки за советом по выбору более подходящей лекарственной формы и/или дозировки Амоксиклава.

Дети с массой тела менее 40 кг

Все дозы рассчитываются исходя из массы тела ребенка в килограммах.

- Врач даст вам инструкцию о том, какое количество препарата Амоксиклав 2х вы должны давать ребенку.
- Используйте дозирующий шприц, чтобы отмерить ребенку правильную дозу.
- Обычная доза: от 25 мг амоксициллина и 3,6 мг клавулановой кислоты до 45 мг амоксициллина и 6,4 мг клавулановой кислоты на килограмм массы тела в сутки, разделенные на два приема.
- Повышенная доза: до 70 мг амоксициллина и 10 мг клавулановой кислоты на килограмм массы тела в сутки, разделенные на два приема.
- В 1 мл суспензии содержится 80 мг амоксициллина и 11,4 мг клавулановой кислоты.

Пациенты с нарушениями функции почек и печени



- Если у вашего ребенка проблемы с почками, доза может быть уменьшена. Также ваш врач может выбрать другую дозу или другой лекарственный препарат.
- Если у вашего ребенка проблемы с печенью, возможно, врач будет чаще назначать анализы крови для контроля функции печени.

Инструкция по приготовлению суспензии:

После открытия навинчивающейся крышки проверьте целостность герметизирующей прокладки и ее контакт с горлышком флакона.

Встряхните флакон, чтобы разрыхлить порошок. Препарат нельзя использовать, если перед приготовлением суспензии во флаконе видны комочки порошка.

Добавьте во флакон 66 мл воды, закройте флакон, переверните его и хорошо встряхните.

Альтернативный способ: добавьте во флакон воду таким образом, чтобы ее уровень был немного ниже отметки, указанной на этикетке флакона, закройте флакон, переверните его и хорошо встряхните. Затем долейте воду до отметки на этикетке флакона, закройте флакон, переверните его и еще раз хорошо встряхните.

Приготовленная суспензия должна иметь цвет от белого до светло-желтого. Если цвет приготовленной суспензии отличается от указанного, то такую суспензию применять не следует.

Способ применения готовой суспензии

- Хорошо встряхните флакон перед каждым применением.
- Принимайте суспензию в начале приема пищи.
- Равномерно распределяйте прием доз препарата в течение дня с интервалом не менее чем 4 часа между дозами. Не применяйте 2 дозы в течение 1 часа.
- Не давайте препарат Амоксиклав 2х ребенку дольше 2 недель. Если вашему ребенку не стало лучше, снова обратитесь к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Отмеривание дозы приготовленной суспензии при помощи дозирующего шприца

- Непосредственно перед отбором суспензии хорошо встряхните флакон.
- Вдавите герметизирующий вкладыш (адаптер) дозирующего шприца в горлышко флакона. Адаптер плотно соединяет дозирующий шприц с флаконом.
- Плунжер должен быть вставлен в шприц до упора.
- Осторожно переверните флакон вместе с установленным дозирующим шприцем. Медленно оттяните плунжер шприца вниз до отметки, соответствующей назначенному количеству в миллилитрах (мл). При наличии пузырьков воздуха в набранной суспензии снова вдавите плунжер в шприц и медленно наполните.
- Поставьте флакон с установленным дозирующим шприцем обратно в вертикальное положение и вытащите из флакона шприц с адаптером.

Введение приготовленной суспензии при помощи дозирующего шприца

- Суспензию можно вводить из дозирующего шприца прямо в рот или выдавить содержимое шприца в ложку для последующего приема внутрь.
- При введении суспензии из дозирующего шприца прямо в рот ребенок должен находиться вертикально.
- После каждого применения плотно закрывайте флакон крышкой. После приема очистите дозирующий шприц, промыв его несколько раз чистой водой (последовательно набирая и выдавливая воду из шприца).

Если ваш ребенок получил большее количество препарата Амоксиклав 2х, чем следовало

Если вы дали своему ребенку слишком большую дозу препарата Амоксиклав 2х, могут возникнуть проблемы с желудком (тошнота, рвота или диарея), нарушения водно-электролитного баланса или судороги. Обратитесь к врачу как можно скорее. Возьмите с собой флакон препарата или листок-вкладыш и покажите его врачу.

Если вы пропустили прием препарата Амоксиклав 2х

Если ваш ребенок пропустил прием, дайте ему пропущенную дозу, как только вы вспомните об этом. Следующую дозу нельзя давать слишком рано – должно пройти

приблизительно 4 часа. Не вводите двойную дозу, если пропустили прием предыдущей дозы.

Если ваш ребенок прекратил прием препарата Амоксиклав 2х

Вводите препарат Амоксиклав 2х своему ребенку до тех пор, пока лечение не будет завершено, даже если ваш ребенок почувствовал себя лучше. Для борьбы с инфекцией ребенку необходимы все назначенные дозы. Если некоторые бактерии выживут, они могут привести к повторному возникновению инфекции.

Если у вас есть другие вопросы касательно приема данного лекарственного препарата, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Амоксиклав 2х может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции, на которые необходимо обратить внимание

Аллергические реакции:

- Кожная сыпь
- Воспаление кровеносных сосудов (васкулит), которое может проявляться в виде красных или фиолетовых выпуклых пятен на коже, но также может затрагивать и другие области тела
- Лихорадка, боль в суставах, увеличенные лимфатические узлы в области шеи, подмышек или паха
- Отеки, иногда лица или горла (ангионевротический отек), вызывающие проблемы с дыханием
- Обморок
- Боль в груди на фоне аллергических реакций, может быть симптомом инфаркта миокарда, спровоцированного аллергической реакцией (синдром Коуниса).

Незамедлительно свяжитесь с врачом, если у вашего ребенка появился один из этих признаков. **Больше не давайте ему Амоксиклав 2х.**

Воспаление толстой кишки

Воспаление толстой кишки, которое обычно вызывает водянистую диарею с примесью крови и слизи, боль в желудке и/или лихорадку.

Острое воспаление поджелудочной железы (острый панкреатит)

Если беспокоит сильная и постоянная боль в области выше пупка, это может быть признаком острого панкреатита.

Синдром энтероколита, индуцированного лекарственным препаратом

О синдроме энтероколита, индуцированного лекарственным препаратом, сообщалось главным образом у детей, получавших амоксициллин/клавуланат. Это аллергическая реакция с ведущим симптомом повторяющейся рвоты (через 1-4 часа после приема препарата). Дополнительные симптомы могут включать боль в животе, вялость, диарею, низкое кровяное давление

Если у вашего ребенка возникли такие симптомы, **как можно скорее обратитесь к врачу.**

Возможные нежелательные реакции включают в себя:

Очень часто (могут возникать у 1 и более человек из 10)


- Диарея (у взрослых)

Часто (могут возникать менее чем у 1 человека из 10)

- Грибковая инфекция (грибковая инфекция в области влагалища, полости рта или кожных складок, вызванная Candida)
- Тошнота, особенно при приеме высоких доз. Если у вашего ребенка возникает тошнота, вводите ему препарат Амоксиклав вместе с едой.
- Рвота
- Диарея (у детей)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

9819 - 2023



Нечасто (могут возникать менее чем у 1 человека из 100)

- Кожная сыпь, зуд
- Выпуклая зудящая кожная сыпь (папулы)
- Нарушения пищеварения (диспепсия)
- Головокружение
- Головная боль
- Увеличение активности ферментов, вырабатываемых печенью, указывающих на повреждение печени (обнаруживается при анализах крови)

Редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 1000)

- Сыпь, возможно, с волдырями, которые выглядят как маленькие мишени (центральное темное пятно с окружающей более бледной областью и темным кольцом снаружи – многоформная эритема)

Незамедлительно свяжитесь с врачом, если у вашего ребенка возникла такая нежелательная реакция.

- Низкое количество тромбоцитов - клеток, участвующих в свертывании крови (обнаруживается при анализах крови)
- Низкое количество лейкоцитов (обнаруживается при анализах крови)

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно).

- Аллергические реакции (см. выше)
- Воспаление толстой кишки (см. выше)
- Кристаллы в моче, приводящие к острому повреждению почек
- Сыпь с везикулами и пузырями с корками в центре, с тенденцией к группировке и образованию гирляндоподобной формы или в виде «нити жемчуга» (IgA зависимый линейный дерматоз)
- Воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг (асептический менингит)
- Серьезные кожные реакции:
 - Распространенная кожная сыпь с волдырями и отслаиванием кожи, особенно вокруг рта, носа, глаз и половых органов (синдром Стивенса-Джонсона), а также более серьезная форма, вызывающая обширное шелушение кожи (более 30 % поверхности тела) (токсический эпидермальный некролиз)
 - Обширная красная кожная сыпь с небольшими гнойными волдырями (буллезный эксфолиативный дерматит)
 - Красная шелушащаяся кожная сыпь с шишками под кожей и волдырями (экзантематозный пустулез)
 - Гриппоподобные симптомы с кожной сыпью, лихорадкой, отеком желез и аномальными показателями крови (включая увеличение количества типа белых клеток крови (лейкоцитов), которые называются эозинофилы и активности ферментов печени) (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами [DRESS-синдром])

Незамедлительно свяжитесь с врачом, если у вашего ребенка появилась одна из этих нежелательных реакций.

- Чрезмерное размножение невосприимчивых к препарату микроорганизмов
- Воспаление печени (гепатит)
- Желтуха, вызванная увеличением уровня билирубина (вещества, вырабатываемого печенью) в крови, что может вызвать пожелтение кожи и белков глаз у вашего ребенка
- Воспаление почечных канальцев
- Замедление свертываемости крови
- Гиперактивность
- Судороги (у людей, принимающих препарат Амоксиклав 2х в высоких дозах или имеющих проблемы с почками)
- Синдром «черного волосатого языка»
- Изменение цвета зубов (у детей), которое, как правило, устраняется чисткой зубов

- Сильное снижение количества лейкоцитов (обнаруживается при анализах крови)
- низкое количество эритроцитов из-за чрезмерного их распада, что вызывает развитие анемии, или малокровия (гемолитическая анемия).

Сообщение о нежелательных реакциях

При возникновении любых нежелательных реакций обратитесь к вашему лечащему врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

факс: +375 (17) 242-00-29

Эл. почта: rcpl@rceth.by

Веб-сайт: www.rceth.by.



5. Хранение препарата Амоксиклав 2х

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не принимайте данный лекарственный препарат после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и флаконе. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Порошок для приготовления суспензии храните при температуре ниже 30°C.

Готовую суспензию храните при температуре 2 - 8 °C не более 7 дней. Сразу после приема препарата флакон необходимо плотно закрывать.

Лекарственный препарат нельзя использовать, если перед приготовлением во флаконе видны комки порошка.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав препарата Амоксиклав 2х

Действующие вещества:

5 мл суспензии для приема внутрь содержат 400 мг амоксициллина в виде амоксициллина тригидрата и 57 мг клавулановой кислоты в виде калия клавуланата.

Вспомогательные вещества:

кремния диоксид коллоидный безводный,
ксантановая камедь,
ароматизатор клубничный*,
кросповидон,
аспартам,
кармеллоза натрия,
кремния диоксид (безводный).

*Состав клубничного ароматизатора: кукурузный мальтодекстрин, триэтилцитрат, ароматизирующие вещества, пропиленгликоль, ароматическая композиция.

Описание внешнего вида

Препарат Амоксиклав 2х представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета.

После приготовления готовая суспензия имеет цвет от белого до светло-желтого.

Характер и содержимое упаковки

Флакон из темного стекла с герметизирующей прокладкой, с навинчивающейся крышкой из полиэтилена/полипропилена с контролем первого вскрытия.

1 флакон в комплекте с дозирующим шприцом объемом 5 мл (с градуировкой 0,1 мл) из полиэтилена/полипропилена с адаптером из полиэтилена и листком-вкладышем в картонной пачке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Slovenia,

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, Ljubljana.

Производитель:

Austria,

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl.

Представитель держателя регистрационного удостоверения в Республике Беларусь:

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения.

Республика Беларусь

Представительство АО «Сандоз Фармасьютикалз д. д.» (Словения) в Республике Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Академика Купревича, 3, помещение 49.

тел. +375 (17) 370 16 20,

факс +375 (17) 370 16 21,

E-mail: patient.safety.cis@sandoz.com (для нежелательных явлений),

E-mail: complaint.eaeu@sandoz.com (для технических жалоб).


Листок-вкладыш пересмотрен:

05.2024

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте <https://www.rceth.by>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте <https://www.rceth.by>



Общие медицинские рекомендации по рациональному использованию антибиотиков

Антибиотики применяют для лечения бактериальных инфекций. Они неэффективны против вирусных инфекций.

Иногда бактериальная инфекция не реагирует на лечение антибиотиками. Одной из наиболее распространенных причин этого является приобретение бактериями, вызывающими инфекционное заболевание, устойчивости к используемому антибиотику. Это означает, что они способны выживать и даже размножаться, несмотря на прием антибиотика.

Бактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам по разным причинам. Рациональное использование антибиотиков может помочь снизить риск развития устойчивости бактерий.

Если врач назначает лечение антибиотиками, оно предназначено только для лечения имеющегося в настоящее время заболевания. Соблюдение следующих указаний поможет предотвратить появление резистентных бактерий, которые могут нейтрализовать действие антибиотика.

1. Очень важно, чтобы антибиотик принимался в правильной дозе, в правильное время и с правильной продолжительностью приема. Внимательно прочтите листок-вкладыш, если у вас есть вопросы, задайте их врачу или работнику аптеки.
2. Нельзя использовать антибиотик, если он не был назначен именно вашему ребенку, вы должны использовать его только для лечения инфекции согласно назначению врача.
3. Нельзя использовать антибиотики, назначенные другим людям, даже если у них была аналогичная инфекция.
4. Нельзя давать антибиотики, которые были назначены вашему ребенку, другим людям.
5. Если после завершения лечения, проведенного согласно указанию врача, у вас осталось какое-то количество антибиотиков, не выбрасывайте остатки в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат надлежащим образом.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь