


НДРБ

9836 - 2023

**Листок-вкладыш: Информация для пациента****Хепарил 1000, 1000 МЕ/г, гель для наружного применения**
Гепарин натрия

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтите весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

Данный препарат следует использовать строго в соответствии с указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с назначениями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если Вам нужна дополнительная информация или совет, проконсультируйтесь у работника аптеки.
- При появлении каких-либо нежелательных реакций, обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных нежелательных реакций, в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если по истечении 7 дней симптомы усугубились или улучшение не наступило, обратитесь к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что представляет собой препарат Хепарил 1000 и для чего он используется
2. Что нужно знать перед использованием препарата Хепарил 1000
3. Как использовать препарат Хепарил 1000
4. Возможные нежелательные реакции
5. Как хранить препарат Хепарил 1000
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Хепарил 1000 и для чего он используется

Действующим веществом препарата Хепарил 1000 является гепарин натрия. Препарат Хепарил 1000 выпускается в виде геля, предназначенного для нанесения на кожу. При нанесении на пораженные участки, гепарин предотвращает образование тромбов в поверхностных венах, улучшает местную микроциркуляцию (циркуляцию крови в малых сосудах) и уменьшает отечность.

Хепарил 1000 используется для:

- симптоматического лечения при заболеваниях поверхностных вен (такие заболевания, для которых характерно варикозное расширение вен, и их осложнения, образование тромбов в пораженных венах с воспалением или без воспаления стенки вен, воспаление тканей, окружающих вены, а также язвы, появляющиеся на коже в области вен, расширенных вследствие варикоза);
 - лечения при воспалении стенки вены, пораженной вследствие оперативных вмешательств;
 - уменьшения выраженности явлений, имеющих место после оперативных вмешательств, проведенных на венах (например, синяки и отеки);
 - устранения отеков и синяков в области суставов и мышц после их травм и растяжений.
- Хепарил 1000 можно использовать в качестве отдельно взятого препарата при наличии показаний к местному лечению, или же в комбинации с системным лечением.

2. Что нужно знать перед использованием препарата Хепарил 1000

Хепарил 1000 нельзя использовать:

- при наличии аллергии на гепарин натрия или любые другие компоненты данного лекарственного препарата (перечислены в разделе 6);

Предупреждения и меры предосторожности

Перед началом применения препарата Хепарил 1000 обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

-Если у Вас имеется повышенная склонность к кровотечениям. В этом случае Вашему врачу необходимо тщательно взвесить возможность применения препарата Хепарил 1000;

-Если у Вас после использования препарата Хепарил 1000 появляются признаки аллергии (гиперчувствительность). В этом случае использование препарата Хепарил 1000 должно быть немедленно прекращено;

-Если у Вас в области, где наносится препарат, есть открытые раны, кровотечения на коже или же имеет место кожная инфекция: Хепарил 1000 на такие места наносить нельзя. Хепарил 1000 также не следует использовать на участках, не покрытых кожей (например, половые органы, рот, глаза).

Дети и подростки

Хепарил 1000 не следует использовать у детей и подростков, поскольку безопасность и эффективность препарата в этой возрастной группе не выяснена.

Другие лекарственные препараты и Хепарил 1000

Если Вы в настоящее время принимаете, принимали в недавнем прошлом или могли принимать любые другие лекарственные препараты, сообщите об этом врачу или работнику аптеки.

Соблюдайте особую осторожность, если Вы принимаете пероральные антикоагулянты (т.е. лекарства для профилактики образования тромбов). В этих случаях нанесение гепарина на кожу может способствовать удлинению времени свертывания крови.

Хепарил 1000 с пищей, напитками и алкоголем

Нет никаких ограничений.

Беременность, грудное вскармливание и детородная функция

Данные по использованию препарата Хепарил 1000 в период беременности или грудного вскармливания отсутствуют.

В случае беременности или кормления грудью, а также при наличии возможной или планируемой беременности перед применением данного препарата обращайтесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов

Хепарил 1000 не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и обслуживать механизмы.

В препарате Хепарил 1000 содержатся метилпарагидроксибензоат (E218), пропилпарагидроксибензоат (E216) и лавандовое масло (содержит линалоол, d-лимонен, гераниол и кумарин).

Препарат содержит метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат (E216) в качестве консервантов. Они могут вызвать аллергические реакции, возможно, замедленного типа.

Лекарственный препарат содержит лавандовое масло (содержит линалоол, d-лимонен, гераниол и кумарин), компоненты которого могут вызвать аллергические реакции.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

3. Как использовать препарат Хепарил 1000

Данный препарат следует использовать строго в соответствии с назначениями лечащего врача или указаниями, полученными от работника аптеки. Если у Вас имеются сомнения, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дозировка и способ применения

Наносите гель на пораженный участок от одного до трех раз в сутки и втирайте массажными движениями. Рекомендуется выдавливать из тюбика полоску геля длиной 3-10 сантиметров. Если симптомы, наблюдаемые у Вас, усугубились или же по истечении 7 дней улучшение не наступило, обратитесь к врачу.

Если Вы нанесли большее количество препарата Хепарил 1000, чем следовало

О случаях передозировки препарата Хепарил 1000 сообщений не поступало. В случае передозировки возможна нейтрализация действия гепарина протамина сульфатом.

Если Вы забыли нанести Хепарил 1000

Если вы забыли нанести препарат Хепарил 1000, нанесите его, как только об этом вспомните. Не используйте препарат в двойной дозе для компенсации пропущенного нанесения.

Если у Вас есть какие-либо иные вопросы о применении этого препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и все лекарственные препараты, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, хотя они возникают не у всех.

Аллергические реакции на гепарин после его нанесения на кожу наблюдаются очень редко (менее чем у 1 из 10 000 пациентов).

В единичных случаях (неизвестно: на основании имеющихся данных частота оценки не поддается) могут развиваться реакции повышенной чувствительности, такие как покраснение кожи и зуд. Эти реакции, обычно, исчезают вскоре после отмены препарата.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше. Вы можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным в Республике Беларусь (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата».

5. Как хранить препарат Хепарил 1000

Хранить в недоступном для детей месте.

При температуре не выше 25 °С.

Период применения после первого вскрытия тубы - 1 месяц.

По истечению срока годности, указанного на картонной упаковке и тубе, данное лекарственное средство больше не используйте. Датой окончания срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте никакие лекарственные препараты в канализацию или в контейнер для домашних отходов. Проконсультируйтесь с работником аптеки в отношении того, как

утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6. Содержание упаковки и прочие сведения

Что содержится в препарате Хепарил 1000

- Действующим веществом является гепарин натрия: 1000 МЕ (международных единиц) на 1 г геля.
- Вспомогательные вещества: карбомер 940, этанол 96%, троламин, метилпарагидроксибензоат (E218), пропилпарагидроксибензоат (E216), лавандовое масло (содержит линалоол, d-лимонен, гераниол и кумарин), вода очищенная.

Внешний вид препарата Хепарил 1000 и содержимое упаковки

Хепарил 1000 представляет собой бесцветный или слегка желтоватого оттенка почти прозрачный гель вязкой консистенции с приятным запахом.

Первичная упаковка представляет собой алюминиевую тубу, с мембраной и уплотняющим кольцом, с полиэтиленовым навинчивающимся колпачком.

В одной оригинальной упаковке содержится:

Туба по 50 г №1 с листком-вкладышем.

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель:

ВЕТПРОМ АД (Vetprom AD),

Болгария, 2400, г. Радомир, ул. «Отец Паисий» № 26.

Листок-вкладыш пересмотрен:

