

НД РБ

9859 - 2023



Листок-вкладыш – информация для потребителя
ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара для внутреннего применения
плюща листьев сухой экстракт

Перед приёмом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если вам нужны какие-либо дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед приёмом препарата ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара.
3. Приём препарата ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 4-5 дней, то необходимо обратиться к врачу.

Действующим веществом лекарственного препарата является экстракт листьев плюща. Механизм действия не установлен. Отхаркивающее действие предположительно связано с раздражением слизистой оболочки желудка, при котором рефлекторно стимулируются секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов.


ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара показан к применению для взрослых и детей старше 2 лет в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся продуктивным кашлем.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЁМОМ ПРЕПАРАТА ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара

Не принимайте препарат ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара:

- если у вас повышенная чувствительность (аллергия) к препаратам на основе листьев плюща или к любым другим компонентам препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у вас повышенная чувствительность (аллергия) к растениям семейства аралиевых (*Araliaceae*);
- если у вас имеется наследственный дефицит фермента аргининсукцинатсинтетазы (нарушение обмена веществ в цикле мочевины);
- в детском возрасте до 2 лет.

НД РБ
9859 - 2023



Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если во время приема лекарственного препарата в течение 4-5 дней симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Одновременное применение с противокашлевыми лекарственными препаратами, не рекомендовано без консультации врача.

Необходимо с осторожностью назначать препарат пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

В связи с содержанием сорбитола (Е420) и изомальта (Е 935) лекарственное средство не следует принимать пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы.

В связи с содержанием глицерина лекарственное средство может вызывать головную боль, расстройство желудка и диарею (понос).

Указание для пациентов с сахарным диабетом. 5 мл сиропа содержат 2,142 мл сахарозаменяющего вещества сорбитола = 0,259 хлебные единицы.

Дети

Лекарственное средство противопоказано детям до 2 лет из-за рисков утяжеления симптомов респираторного заболевания.

Применение лекарственного препарата у детей в возрасте 2-4 лет возможно только после консультации врача.

Другие препараты и препарат ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не рекомендовано одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, такими как, кодеин или декстрометорфан без консультации врача.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Безопасность применения в период беременности и грудного вскармливания не установлена.

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по оценке влияния приема лекарственного препарата на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами не проводились.

Препарат ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара в 5 мл содержит 2,124 мл сахарозаменителя сорбитола, что составляет 0,259 хлебных единиц. Сорбитол – источник фруктозы. Если врач установил ранее у вас (у вашего ребёнка) непереносимость некоторых сахаров или у вас (у вашего ребёнка) была диагностирована наследственная непереносимость фруктозы, редкое генетическое нарушение, при котором фруктоза не может быть расщеплена, обратитесь к лечащему врачу перед тем как начать принимать данный лекарственный препарат. Сорбитол может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и легкий слабительный эффект.

3. ПРИЁМ ПРЕПАРАТА ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Лекарственный препарат предназначен для приёма внутрь. Рекомендуется запивать сироп достаточным количеством тёплой воды.

Взрослым и подросткам принимать препарат рекомендуется в неразбавленном виде.

Маленьким детям сироп рекомендуется разбавлять в небольшом количестве воды.

Перед употреблением флакон необходимо встряхнуть.

Для обеспечения точности дозирования необходимо использовать мерный стаканчик, входящий в состав упаковки.

Рекомендуемая доза устанавливается в зависимости от возраста.

Взрослым и детям старше 11 лет принимать по 5 мл сиропа 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 6 до 11 лет принимать по 5 мл сиропа 2 раза в сутки.

Детям в возрасте от 2 до 5 лет принимать по 2,5 мл сиропа 2 раза в сутки.

Не следует принимать ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара без консультации врача дольше 4-5 дней.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата. Если во время приема лекарственного препарата в течение одной недели симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу.

Если вы приняли препарат ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара больше, чем следовало, обратитесь к врачу. При передозировке возможно появление следующих симптомов: тошнота, рвота, диарея, возбуждение. Лечение симптоматическое.

Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную. Если вы забыли принять дозу препарата, сделайте это как только вспомните. Если уже практически наступило время приема следующей дозы, не принимайте дозу препарата, которую вы пропустили.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по применению данного лекарственного препарата, пожалуйста, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота возникновения нежелательных реакций, приведенных ниже, оценивается следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1\,000$, но $< 1/100$), редко ($\geq 1/10\,000$, но $< 1/1\,000$), очень редко ($< 1/10\,000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Желудочно-кишечные нарушения: тошнота, рвота, диарея (понос). Частота неизвестна.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции, такие как крапивница, кожная сыпь, одышка, анафилактические реакции. Частота неизвестна.

Дополнительные нежелательные реакции у детей

Сообщалось о случае развития агрессивного поведения и диареи у 4-летнего ребенка после случайного приёма внутрь экстракта плюща в количестве, соответствующем 1,8 г растительного вещества.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше, следует прекратить прием лекарственного препарата и сообщить об этом своему лечащему врачу или работнику аптеки.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственный препарат, включая сообщения о неэффективности лекарственного препарата (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»): <http://www.rceth.by>.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИНКАС ПЛЮЩ, сироп без сахара

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Срок годности 3 года.

Срок хранения флакона после вскрытия 8 недель при температуре не выше 25 °С.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Состав

Действующее вещество: 5 мл сиропа содержат Плюща листьев экстракт сухой (10:1), экстрагент этанол 30% (об/об) - 35 мг.

Вспомогательные вещества: изомальт (Е 953), лимонная кислота безводная (Е 330), стевии листьев экстракт сухой (стевиолгликозид 95%, декстрин 5%), бензоат натрия (Е 211), калия сорбат (Е 202), сорбитола раствор не кристаллизующийся (Е 420), глицерин (Е 422), медовый ароматизатор (монопропилен гликоль – 30%; ароматизирующая добавка - 70%), вода очищенная.

Внешний вид и содержимое упаковки

От светло-коричневого до темно-коричневого цвета, однородный раствор с характерным запахом. Допускается образование осадка и мутность раствора в процессе хранения ввиду содержания экстрактивных веществ.

По 90 мл лекарственного препарата в стеклянном флаконе янтарного цвета с металлической навинчивающей крышкой, оснащенной защитным кольцом. Флакон с листком-вкладышем и стаканчиком мерным полипропиленовым в картонной коробке.

По 120 мл или по 150 мл лекарственного препарата в стеклянном флаконе янтарного цвета с крышкой навинчивающейся полимерной с защитным замком от детей. Флакон с листком-вкладышем и стаканчиком мерным полипропиленовым в картонной коробке.

Порядок реализации

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

«Herbion Pakistan Private Limited», 30/28, Промышленная зона Коранги, Карачи, Пакистан
Website: www.herbion.com

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения: «Herbion Pakistan Private Limited» в Республике Беларусь, 220030 г. Минск, пр. Независимости, д. 25, к. 131, тел./факс +375 17 379 44 01.