НД РБ

9926 -2024

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «12» 09. 2025 № 1043

Листок-вкладыш - информация для потребителя

Ибупрофен Дансон, 100 мг/ 5 мл, суспензия для приема внутрь [для детей]

со вкусом тутти-фрутти

Действующее вещество: ибупрофен.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочитать его заново.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка- вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается в течение 24 часов (у детей в возрасте 3-5 месяцев) или в течение 3 дней (у детей в возрасте 6 месяцев и старше) применения препарата, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ибупрофен Дансон и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Ибупрофен Дансон.

3. Прием препарата Ибупрофен Дансон.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Ибупрофен Дансон.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Ибупрофен Дансон и для чего его применяют

Действующим веществом (которое вызывает лечебный эффект) препарата является ибупрофен, который относится к классу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Показания к применению

- Снижение температуры тела при лихорадке, в том числе поствакцинальной.

- Облегчение симптомов простуды и гриппа.

- Лечение болевого синдрома от слабой до умеренной интенсивности (например, боль во время прорезывания зубов, зубная боль, боль в ухе, головная боль, боль при незначительных травмах и растяжениях связок и мышц).

Если улучшение не наступило через 24 часа (у детей в возрасте от 3 до 5 месяцев) или через 3 дня (у детей в возрасте от 6 месяцев и старше), или Вы или Ваш ребенок чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Ибупрофен Дансон

НД РБ
9926 -2024
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Этот лекарственный препарат подходит для большинства людей, но в некоторых случаях его не следует использовать. Побочные действия препарата можно свести до минимума, если применять препарат в наименьшей эффективной дозе и в течение минимального времени, необходимого для устранения симптомов. Если Вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с работником аптеки или врачом.

Противопоказания

Не давайте препарат Ибупрофен Дансон ребенку, если:

- у него когда-либо возникали реакции (например, бронхиальная астма, насморк, сыпь, отек лица, языка, губ или горла) после применения ибупрофена, аспирина или других НПВП;

- он весит менее 5 кг или ему меньше 3 месяцев;

- он получает любые другие НПВП или аспирин в дозе более 75 мг в сутки;

- у него имеет место (или в прошлом было два или более эпизода) язвы желудка, перфорация или кровотечение;

- у него имеется тяжелая почечная, сердечная или печеночная недостаточность;

- у него имеется врожденное нарушение метаболизма фруктозы/фруктового сахара (наследственная непереносимость фруктозы). Это связано с тем, что организм может превращать мальтитол во фруктозу;

- у него в прошлом возникали кровотечения или перфорация желудка после приема ибупрофена или других НПВП;

- у него имеется нарушение процесса свертываемости крови и повышенная кровоточивость (в том числе по причине гемофилии, геморрагического диатеза).

Не принимайте препарат Ибупрофен Дансон:

- в последние три месяца беременности.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки, если:

- у Вашего ребенка есть (или было) высокое артериальное давление, имеются проблемы с сердцем или он перенес инсульт, поскольку при приеме ибупрофена есть небольшой риск возникновения проблем с сердцем;

- у Вашего ребенка заболевание, которое может подвергнуть его риску возникновения проблем с сердцем, например, сахарный диабет или повышение уровня холестерина;

- у Вашего ребенка бронхиальная астма или любое другое аллергическое заболевание легких;

- у Вашего ребенка есть или были проблемы с печенью, почками, сердцем или кишечником;

- Ваш ребенок обезвожен, так как при этом повышается риск поражения почек;

- у Вашего ребенка имеется системная красная волчанка или любое подобное заболевание иммунной системы;

- Ваш ребенок страдает хроническим воспалительным заболеванием кишечника, таким как болезнь Крона или язвенный колит;

- у Вашего ребенка ветряная оспа. Желательно избегать применения препарата Ибупрофен Дансон при ветряной оспе.

Были получены сообщения о развитии аллергических реакций при применении ибупрофена, включая проблемы с дыханием, отек лица и области шеи (ангионевротический отек), боль в

НД РБ
9926 -2024
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

груди. Следует немедленно прекратить прием Ибупрофен Дансон и связаться с врачом или обратиться за медицинской помощью, если вы заметили любой из этих признаков.

Были получены сообщения о развитии тяжелых кожных нежелательных реакций, включая эксфолиативный дерматит, эритему мультиформную, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и DRESS синдром (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами), острый генерализованный экзантематозный пустулез, связанные с применением ибупрофена. Если вы заметили какие-либо симптомы серьезных кожных реакций, описанных в разделе 4, необходимо прекратить применение Ибупрофен Дансон и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Вам необходимо сообщить врачу, если у Вас инфекция. Применение препарата Ибупрофен Дансон может скрывать признаки и симптомы инфекции, такие как лихорадка и боль. В результате возможна задержка в назначении адекватного лечения инфекции, что может повысить риск развития осложнений. Это наблюдается при бактериальной пневмонии, а также при бактериальной инфекции кожи на фоне ветряной оспы. Если Вы принимаете Ибупрофен Дансон при инфекционном заболевании и отмечаете сохранение или ухудшение симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Дети

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 3 месяцев и массой тела менее 5 кг (см. раздел «Противопоказания»). Применение лекарственного препарата у детей от 3 до 6 месяцев возможно только по назначению врача, после оценки врачом соотношения польза/риск.

Следующие предупреждения скорее касаются взрослых. В любом случае внимательно ознакомьтесь с ними, прежде чем начинать лечение препаратом.

- Такие лекарственные препараты как Ибупрофен Дансон, могут незначительно повышать риск возникновения сердечного приступа («инфаркт миокарда») или инсульта.

Этот риск повышается при применении высоких доз и длительном лечении. Не следует превышать рекомендуемую дозу или продолжительность лечения.

- Если Вы имеете проблемы с сердцем, перенесли инсульт или думаете, что можете подвергаться риску этих состояний (например, у Вас высокое артериальное давление, сахарный диабет, повышение уровня холестерина или Вы курите), Вам следует обсудить свое лечение с врачом или работником аптеки.

- Ибупрофен в незначительных количествах может проникать в грудное молоко без каких-либо отрицательных последствий для здоровья грудного ребенка.

- Если Вы пожилой человек, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.

Другие препараты и Ибупрофен Дансон

Сообщите Вашему врачу или работнику аптеки, если Вы или Ваш ребенок принимаете, недавно принимали или Вам может потребоваться прием каких-либо других лекарственных препаратов:

- другие лекарственные препараты, содержащие ибупрофен или другие НПВП, в том числе те, которые можно приобрести без рецепта;

- аспирин в низких дозах (до 75 мг в сутки);

- диуретики (помогают выводить воду);

- антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь, например, варфарин);

- препараты, снижающие артериальное давление (например, каптоприл, атенолол, лозартан);

НД РБ

9926 -2024

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- литий (при расстройствах настроения);

- метотрексат (при псориазе, артрите или злокачественных новообразованиях);

- зидовудин (для лечения ВИЧ-инфекции);

- кортикостероиды (противовоспалительные препараты);

- сердечные гликозиды (при заболеваниях сердца);

- циклоспорин или такролимус (для предотвращения отторжения органа после трансплантации);

- мифепристон (для прерывания беременности);

- антибиотики хинолонового ряда (для лечения инфекций);

- антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина;

- антитромбоцитарные препараты, например, дипиридамол, клопидогрел.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам или Вашему ребенку, сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки.

Если Вы не знаете точно, какие лекарственные препараты получает Ваш ребенок, покажите их врачу или работнику аптеки.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

- Ибупрофен Дансон относится к группе препаратов, которые могут нарушать репродуктивную функцию у женщин. Это полностью обратимо при прекращении лечения препаратом. Маловероятно, что этот лекарственный препарат, который используется время от времени, способен повлиять на Ваши шансы забеременеть, однако если Вы не можете забеременеть, то проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем начинать лечение препаратом.

- Вы можете принимать Ибупрофен Дансон в первые 6 месяцев беременности только по назначению врача после тщательной оценки соотношения предполагаемой пользы для матери и потенциальных рисков для эмбриона/плода. Ибупрофен Дансон противопоказан в третьем триместре беременности, так как может нанести серьезный вред ребенку и отсрочить начало родов с риском развития кровотечения как у матери, так и у плода (возможное развитие маловодия и/или патологии почек у новорожденных). Не принимайте Ибупрофен Дансон в последние 3 месяца беременности.

Согласно ограниченным данным, очень низкие концентрации ибупрофена обнаруживались в грудном молоке. Развитие нежелательных реакций у детей, находящихся на грудном вскармливании, маловероятно. Однако рекомендуется прекратить грудное вскармливание в период применения ибупрофена.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат может вызывать нежелательные эффекты, которые нарушают способность к управлению транспортными средствами. Не следует управлять транспортными средствами и обслуживать машины, разве что больной уверен, что он хорошо чувствует себя.

Препарат Ибупрофен Дансон содержит мальтитол жидкий (Е965), натрий, пропиленгликоль

НД РБ
9926 -2024
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Данный лекарственный препарат содержит мальтитол (Е965). В 5 мл лекарственного препарата содержится 2,2 г мальтитола жидкого. Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу. Мальтитол жидкий может оказывать слабое слабительное действие. Калорийность мальтитола (изомальта): 2,3 ккал/г.

Данный лекарственный препарат содержит 9,67 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) в 5 мл. Это эквивалентно 0,48 % от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

Данный лекарственный препарат содержит пропиленгликоль (в составе ароматизатора). Данный лекарственный препарат содержит 2,817 мг пропиленгликоля в 5 мл.

3. Прием препарата Ибупрофен Дансон

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для купирования симптомов следует применять наименьшую эффективную дозу в течение минимального времени – это поможет свести к минимуму нежелательные реакции.

Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг/кг массы тела ребенка с интервалами между приемами препарата 6–8 часов.

Дозировка для детей зависит от возраста и массы тела ребенка.

Для точного дозирования препарата используйте мерный шприц, входящий в комплект.

В зависимости от возраста и массы тела, наберите препарат до нужной отметки (риски) на шприце. Каждые 5 мл препарата содержат 100 мг ибупрофена.

Рекомендуемые дозы

Возраст (масса тела)	**Разовая доза**	**Максимальная суточная доза**
3-6 месяцев (5-7,6 кг)	2,5 мл	3 раза по 2,5 мл
6-12 месяцев (7,7-9 кг)	2,5 мл	3-4 раза по 2,5 мл
1-3 года (10-16 кг)	5,0 мл	3 раза по 5,0 мл
4-6 лет (17-20 кг)	7,5 мл	3 раза по 7,5 мл
7-9 лет (21-30 кг)	10,0 мл	3 раза по 10,0 мл
10-12 лет (31-40 кг)	15,0 мл	3 раза по 15,0 мл

При необходимости вторую дозу следует давать через 6 часов после приема первой дозы.

Применение у детей

Не давайте препарат Ибупрофен Дансон детям в возрасте до 3 месяцев и с массой тела менее 5 кг, поскольку безопасность и эффективность препарата у данной возрастной группы не установлены.

Применение лекарственного препарата у детей Ибупрофен Дансон от 3 до 6 месяцев возможно только после консультации врача в соответствии с его указаниями.

- Не давайте ребенку больше 2 доз препарата в течение 24 часов.

- Не давайте препарат ребенку до 3 месяцев без рекомендации врача. Препарат следует давать ребенку каждые 6-8 часов.

НД РБ
9926 -2024
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- Между приемом отдельных доз должно пройти не менее 4 часов. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу.

- Препарат предназначен только для краткосрочного применения.

Поствакцинальная лихорадка: по 2,5 мл (50 мг) препарата. При необходимости, еще 2,5 мл (50 мг) через 6 часов.

Не допускается применять более 5 мл лекарственного препарата в течение 24 ч. Если повышенная температура тела не снижается, необходима консультация врача.

Особые группы пациентов

Пациенты с нарушением функции почек или печени:

Не применяйте препарат у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью тяжелой степени тяжести (см. раздел «Противопоказания»).

Сообщите своему врачу, если:

- состояние Вашего ребенка не начинает улучшаться или ухудшается.

- Вы точно не уверены, какое заболевание у Вашего ребенка, или оно сопровождается сыпью, затруднением дыхания, диареей или чрезмерной утомляемостью. В этом случае Вам следует немедленно обратиться к врачу.

Путь и (или) способ введения

Для приема внутрь.

Перед употреблением взболтать до получения однородной суспензии.

Пациенты с чувствительным желудком могут принимать препарат во время или после еды.



Инструкция по применению шприца-дозатора

1. Отвинтить колпачок у флакона (нажать, вдавливая вниз, и провернуть против часовой стрелки).
2. Сильно вдавить шприц-дозатор в отверстие горловины флакона.
3. Содержимое флакона энергично взболтать.
4. Чтобы наполнить шприц-дозатор, флакон необходимо повернуть вверх дном, а затем осторожно перемещать поршень дозатора вниз, влить содержимое до достижения желаемой отметки на шкале.
5. Перевернуть флакон в исходное положение и извлечь из него шприц-дозатор, осторожно откручивая его.
6. Наконечник дозатора расположить в ротовой полости ребенка, а затем, медленно нажимая на поршень, ввести содержимое шприца-дозатора.

НД РБ
9926 -2024
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

7. После применения флакон следует закрыть, завинчивая крышку, а шприц-дозатор промыть водой и высушить.

Продолжительность терапии

Только для кратковременного применения.

Если при применении препарата в течение 24 часов (у детей в возрасте 3–5 месяцев) или в течение 3 дней (у детей в возрасте от 6 месяцев и старше) симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.

Если Вы дали ребенку больше препарата Ибупрофен Дансон, чем следовало

Если кто-то принял больше лекарственного препарата чем следовало, или если ребенок случайно принял этот препарат, следует обратиться к своему врачу или в ближайшую больницу, чтобы узнать мнение специалиста о возможных рисках и получить рекомендации.

Симптомы передозировки могут включать тошноту, боль в животе, рвоту (иногда с прожилками крови), головную боль, звон в ушах, спутанность сознания и дрожание глаз. При приеме высоких доз препарата сообщалось о развитии таких симптомов как сонливость, боль в груди, сердцебиение, потеря сознания, судороги (в основном у детей), общая слабость и головокружение, появление крови в моче, чувство холода и нарушение дыхания.

Если Вы забыли принять препарат Ибупрофен Дансон

Если Вы забыли принять дозу препарата, примите следующую дозу в положенное для нее время, при условии, что последняя доза была принята не менее 4 часов назад. Не удваивайте дозу.

Если у Вас остались вопросы о применении этого лекарственного препарата, задайте их Вашему врачу или работнику аптеки.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Риск возникновения нежелательных реакций можно свести к минимуму, если принимать препарат коротким курсом в минимальной эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов.

Серьезные нежелательные реакции

Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения у Вас или у Вашего ребенка одного из следующих признаков серьезных нежелательных реакции, которые наблюдались:

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- отек лица, языка, внутренних отделов гортани с сужением дыхательных путей, затруднением дыхания; учащение сердцебиения (тахикардия); падение артериального давления вплоть до угрожающего жизни шока (тяжелые общие аллергические реакции); состояние может развиться даже при первом применении препарата;

- достаточно сильная боль в области живота, рвота с кровью или частицами черного цвета, напоминающими кофейную гущу, дегтеобразный черный стул (мелена) (признаки кишечного кровотечения);

НД РБ
9926 -2024
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- необъяснимая лихорадка, боль в горле, появление эрозий слизистой оболочки полости рта, «грипподобные» симптомы, выраженная утомляемость, носовые кровотечения, внезапное и легкое образование синяков (кровоизлияния в кожу) – данные симптомы сопровождаются изменениями в анализах крови (по причине нарушения кроветворения), таких, как снижение числа лейкоцитов (лейкопения, агранулоцитоз), снижение числа эритроцитов (анемия), снижение числа тромбоцитов (тромбоцитопения), снижение числа клеток крови (панцитопения);

- покраснение кожи, красноватые не выступающие мишенеобразные или круглые пятна на туловище, часто с волдырями в центре, шелушение кожи, сильный кожный зуд, язвы в ротовой полости, горле, носу, глазах и на гениталиях, отслаивание кожных лоскутов. Серьезной кожной сыпи может предшествовать лихорадка и гриппоподобные симптомы (эксфолиативный дерматит, эритема мультиформная, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса- Джонсона);

- скованность мышц шеи, головная боль, тошнота, рвота, лихорадка и дезориентация (могут быть признаками асептического менингита);

- ухудшение симптомов инфекционного воспалительного процесса кожи и подкожных тканей: усиление боли, припухлости, покраснения, повышение температуры тела;

-отечность век, лодыжек, ног, пенистая моча, увеличение массы тела вследствие отеков, слабость, потеря аппетита (признаки острого поражения почек);

- а также необъяснимые приступы свистящего дыхания, затруднение дыхания (приступ бронхиальной астмы, бронхоспазм); возможно выраженное снижение артериального давления.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- кожная аллергическая реакция тяжелой степени, симптомы которой включают в себя кожную сыпь, повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов и увеличение числа эозинофилов (тип белых кровяных телец) в анализе крови (DRESS-синдром);

- красные, шелушащиеся, распространенные высыпания с шишками под кожей и волдырями, сопровождаются лихорадкой (острый генерализованный экзантематозный пустулез);

- боль в груди, которая может быть признаком серьезной аллергической реакции (синдром Коуниса).

Прочие возможные нежелательные реакции:

Если Вы заметили у своего ребенка любой из следующих симптомов, не давайте ему этот препарат и свяжитесь со своим врачом:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- самым частым нежелательным эффектом является раздражение желудка, которое может вызвать такие проблемы, как нарушение пищеварения и изжога.

- головная боль;

- кожная сыпь, кожный зуд, крапивница.

Редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000:

- диарея, метеоризм или запор. Пронсультируйтесь с врачом, если они длятся более нескольких дней или вызывают беспокойство.

Очень редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000:

НД РБ

9926 -2024

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения

- ибупрофен может вызвать инсульт или проблемы с сердцем. При использовании доз, предназначенных для детей, вероятность этого очень мала;

- обострение колита и болезни Крона;

- высокое артериальное давление;

- нарушения кроветворения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз);

Частота неизвестна - на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- реакции повышенной чувствительности к свету;

- сердечная недостаточность;

- при длительном применении - риск тромботических осложнений (инфаркт, инсульт);

- влияние на лабораторные показатели: гематокрит или гемоглобин (могут уменьшаться), время кровотечения (могут увеличиваться), концентрация глюкозы в плазме крови (может снижаться), клиренс креатинина (может уменьшаться), плазменная концентрация креатинина (может увеличиваться), активность «печеночных» трансаминаз (может повышаться).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон +375 (17) 2420029, факс +375 (17) 2420029

Эл. почта rcpl@rceth.by

https://www.rceth.by

5. Хранение препарата Ибупрофен Дансон

Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре ниже 25 °С.

Срок годности (срок хранения) после первого вскрытия - 6 месяцев.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работников аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Ибупрофен Дансон содержит

Действующее вещество: ибупрофен.

Каждые 5 мл препарата Ибупрофен Дансон содержат 100 мг ибупрофена.

НД РБ
9926 -2024
СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) препарата являются: полисорбат-80, глицерин, мальтитол жидкий Е965, сахарин натрия, лимонной кислоты моногидрат, натрия цитрата, камедь ксантановая, натрия хлорид, домифена бромид, ароматизатор тутти-фрутти (содержит пропиленгликоль), вода очищенная.

Внешний вид препарата Ибупрофен Дансон и содержимое упаковки

Белая или почти белая суспензия сиропообразной консистенции с фруктовым запахом. Допускается расслоение суспензии, которое устраняется при взбалтывании.

По 100 мл препарата во флаконы из полиэтилентерефталата и укупоривают винтовой полиэтиленовой крышкой с функцией защиты от вскрытия детьми.
По 1 флакону с листком-вкладышем и шприцем-дозатором объемом 5 мл с нанесенными делениями через каждые 0,5 мл в картонной пачке.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Республика Болгария

«ДАНСОН – БГ» ООД

Адрес: 2400 г. Радомир, ул. «Отец Паисий», № 26.

Производитель

Республика Болгария

ВЕТПРОМ АД

Адрес: 2400 г. Радомир, ул. «Отец Паисий», № 26.

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

ООО «ДАНСОН-БГ»

Адрес: 220126, г. Минск, пр. Победителей, д.31, корпус 1, пом. 416, 418

Телефон: +375-17-367-85-88

Электронная почта: hulaknatalya@gmail.com

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: https://rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации), сайт уполномоченного органа https://rceth.by.