


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (информация для пациента)

по медицинскому применению лекарственного средства

ПАПАЗОЛ

Торговое название: Папазол.

Лекарственная форма: таблетки.

Описание: таблетки белого или почти белого цвета, слегка мраморные, плоскоцилиндрические, с фаской.

Состав: одна таблетка содержит *действующие вещества* – бендазола - 30 мг, папаверина гидрохлорида - 30 мг; *вспомогательные вещества*: крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие периферические вазодилаторы.

Код АТХ: C04AX.

Показания к применению

Умеренно выраженные спазмы периферических и церебральных сосудов, легкие формы артериальной гипертензии, спазмы гладких мышц внутренних органов (спазм привратника желудка, почечная и печеночная колики, холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастический колит).

С осторожностью

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

С осторожностью следует ~~назначать и предпочтительно~~ использовать короткие курсы Папазола при лечении лиц старше 60 лет, в связи с возможностью снижения у них сердечного выброса и ухудшения показателей электрокардиограммы (ЭКГ).

Следует использовать только малые дозы Папазола у лиц с черепно-мозговой травмой, нарушениями функции печени и почек, гипотиреозом, недостаточностью функции надпочечников, поскольку у них усиливается гипотензивное действие лекарственного средства. У лиц с доброкачественной гиперплазией предстательной железы высокие дозы Папазола могут спровоцировать развитие острой задержки мочи.

С осторожностью применять при почечной и/или печеночной недостаточности; заболеваниях бронхов, сопровождающихся чрезмерным скоплением секрета; присутствующем в анамнезе желудочном кровотечении.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в сут. Продолжительность курса терапии устанавливают индивидуально, в зависимости от эффективности и переносимости терапии. Максимальный курс лечения составляет 3-4 нед.

Особые указания


Применение в период беременности или кормления грудью. Прием препарата во время беременности противопоказан. При необходимости лечения препаратом кормление грудью необходимо прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. При применении препарата желательно воздержаться от управления автотранспортом и работы со сложными механизмами.

Побочное действие

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, запор.

Со стороны центральной нервной системы: сонливость, повышенная потливость.



Со стороны сердечно-сосудистой системы: **нарушения сердечного ритма**, уменьшение сердечного выброса, вследствие чего возможно ухудшение показателей ЭКГ.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений больному необходимо посоветоваться с врачом!

Противопоказания

Артериальная гипотензия, нарушения атриовентрикулярной проводимости, повышенный тонус мышц, судорожный синдром, детский возраст до 18 лет, эозинофилия, повышение уровня трансаминаз крови, возраст старше 60 лет, беременность, период кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение функции печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При совместном применении с фентоламином, β -блокаторами и другими антигипертензивными средствами, диуретиками усиливается гипотензивный эффект. Одновременный прием препарата с β -адреноблокаторами предотвращает усиление общего периферического сопротивления сосудов, вызываемого β -адреноблокаторами. При одновременном применении уменьшает эффект метилдопы. Эффективность препарата снижается при табакокурении.

Передозировка

Симптомы: артериальная гипотензия, повышенная потливость, чувство жара, головокружение, тошнота, нарушение зрения. Лечение: отмена препарата, промывание желудка с активированным углем, применение солевых слабительных. Симптоматическая терапия. Специфического антидота нет.

Упаковка

В контурной ячейковой упаковке №10, в упаковке №10×1, №10×2.

В контурной безъячейковой упаковке №6, в упаковке №6×1.

Для стационаров:

В контурной ячейковой упаковке №10, в упаковке №10×1000.

В контурной безъячейковой упаковке №6, в упаковке №6×1400.

Условия хранения

В защищенном от света и влаги месте, при температуре от 5 °С до 30 °С.


Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

**Производитель**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27, тел/факс +375(177)735612.