



## Листок-вкладыш – информация для пациента

### Монурал 3 г гранулы для приготовления раствора для приема внутрь Фосфомицин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат предназначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

## СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

- Что из себя представляет препарат Монурал и для чего его применяют.
- О чем следует знать перед приемом препарата Монурал.
- Прием препарата Монурал.
- Возможные нежелательные реакции.
- Хранение препарата Монурал.
- Содержимое упаковки и прочие сведения.

### 1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ МОНУРАЛ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Монурал содержит действующее вещество фосфомицин (в виде фосфомицина трометамола). Фосфомицин – это антибиотик, который убивает бактерии, вызывающие инфекции.

Женщинам и девушкам-подросткам старше 12 лет Монурал назначают для лечения острого неосложненного цистита.

Мужчинам Монурал назначают перед обследованием предстательной железы (трансректальная биопсия простаты) для профилактики возможных инфекций.

### 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА МОНУРАЛ

#### **Не принимайте препарат Монурал,**

если у Вас аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).


#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Монурал проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой, если у Вас:

- хроническая инфекция мочевого пузыря,
- в прошлом после приема любых других антибиотиков возникала диарея,
- нарушение функции почек (клиренс креатинина < 10 мл/мин).

Немедленно сообщите врачу, если во время или после завершения лечения Монуралом у Вас возникнет тяжелая и стойкая диарея для получения незамедлительной адекватной терапии.





Для лечения диареи не принимайте лекарственные препараты, подавляющие перистальтику кишечника (движения кишечника).

Монурал может вызывать тяжелые аллергические реакции.

**Препарат Монурал содержит сахарозу.** Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что один пакет препарата Монурал содержит 2,3 г усвояемых углеводов.

#### **Дети и подростки**

Не применяйте этот препарат у детей младше 12 лет, поскольку его безопасность и эффективность для этой возрастной группы не установлены.

#### **Другие препараты и препарат Монурал**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Это особенно важно, если Вы принимаете:

- Метоклопрамид или другие стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта (препараты, усиливающие продвижение пищи по желудку и кишечнику), потому что они могут снизить всасывание фосфомицина. Монурал следует принимать с этими препаратами с разницей во времени не менее чем в 2-3 часа.
- Антикоагулянты (препараты, снижающие вязкость крови), так как их способность предотвращать свертывание крови может быть изменена фосфомицином и другими антибиотиками.

#### **Препарат Монурал с пищей**

Пища может замедлить всасывание фосфомицина. Поэтому этот препарат следует принимать натощак (за 2-3 часа до или через 2-3 часа после еды).

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Во время беременности Монурал назначают только в случае крайней необходимости. Монурал проникает в грудное молоко. Во время грудного вскармливания не следует принимать Монурал, за исключением случаев острой необходимости.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Монурал может вызывать такую нежелательную реакцию, как головокружение, которая может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.


### **3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА МОНУРАЛ**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза:**

- Лечение острого неосложненного цистита у женщин и девушек-подростков (старше 12 лет): 1 пакет (3 г фосфомицина) однократно.
- Антибиотикопрофилактика при трансректальной биопсии простаты у мужчин: 1 пакет (3 г фосфомицина) за 3 часа до проведения процедуры и 1 пакет (3 г фосфомицина) через 24 часа после проведения процедуры.





**Применение у пациентов с нарушением функции почек**

Монурал не следует применять у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина < 10 мл/мин).

**Применение у детей**

Монурал не следует применять у детей младше 12 лет.

**Способ применения**

Препарат Монурал принимают внутрь.

Содержимое одного пакета растворите в стакане воды и сразу же выпейте приготовленный раствор.

Принимайте препарат натощак (примерно за 2-3 часа до или через 2-3 часа после еды), предпочтительно перед сном, после опорожнения мочевого пузыря.

**Если Вы приняли препарата Монурал больше, чем следовало**

Если Вы случайно приняли дозу, превышающую рекомендуемую, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

**4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Серьезные нежелательные реакции**

**Прекратите прием препарата Монурал и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов:**

- анафилактический шок – опасный для жизни тип аллергической реакции (частота неизвестна). Симптомы включают внезапное появление сыпи, зуда или крапивницы на коже, а также одышку, хрипы или затрудненное дыхание;
- отек лица, губ, языка или горла с затрудненным дыханием (англоневротический отек) (частота неизвестна);
- умеренная или сильная диарея, спазмы в животе, кровавый стул и/или лихорадка могут означать, что у Вас инфекция толстой кишки (антибиотик-ассоциированный колит) (частота неизвестна). Для лечения диареи не принимайте лекарственные препараты, подавляющие перистальтику кишечника (антиперистальтические препараты).

**Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Монурал**

**Часто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль
- головокружение
- диарея
- тошнота
- нарушение пищеварения (диспепсия)
- боль в животе


**воспаление женских половых органов (вульвовагинит)**

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- рвота
- сыпь
- крапивница
- зуд

**Неизвестно** (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):





*Неизвестно* (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

### **5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МОНУРАЛ**

Храните препарат при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте.  
Срок хранения – 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.  
Датой истечения срока годности является последний день месяца.  
Препарат принимают сразу после восстановления (растворения).

### **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

#### **Препарат Монурал содержит**

Действующим веществом является фосфомицин.

Каждый пакет содержит 3 г фосфомицина (в виде 5,631 г фосфомицина трометамола). Вспомогательными веществами являются: ароматизатор мандариновый, ароматизатор апельсиновый, сахарин, сахароза.

#### **Внешний вид Монурала и содержимое упаковки**

Гранулированный порошок белого цвета с характерным запахом мандаринового ароматизатора.

Внешний вид приготовленного раствора: гомогенный, опалесцирующий раствор.  
По 8 г препарата помещают в пакеты из 4-х слойной ламинированной фольги (бумага-полиэтилен-алюминий-полиэтилен). 1 или 2 пакета помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

#### **Условия отпуска из аптек**

По рецепту врача.

#### **Держатель регистрационного удостоверения**

Замбон С.П.А.

Via Lillo del Duca, 10 20091 Bresso, Milan, Italy

#### **Производитель**

Замбон Світцерланд Лтд.

Via Industria 13, CH-6814 Cadempino, Switzerland

**За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:**

Россия

Представительство АО «Замбон С.П.А.» (Италия)


119002 Москва, Глазовский пер., д. 7, офис 17

Тел.: + 8 (495) 933-38-30/32



НД РБ

3850 - 2020



**Листок-вкладыш пересмотрен**  
<{месяц ГГГГ}>

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: [www.rceth.by](http://www.rceth.by)

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by)

