



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Антиоксикапс с селеном

Торговое название: Антиоксикапс с селеном

Лекарственная форма: капсулы.

Состав: одна капсула содержит: бета-каротина в виде 30% суспензии в масле – 6 мг, альфа-токоферолаацетата – 30 мг, кислоты аскорбиновой – 100 мг, селена (в виде селена дрожжевого 0,1% - 30 мг или селена дрожжевого 0,2% - 15 мг) - 0,03 мг.

Вспомогательные вещества: подсолнечное масло рафинированное, воск пчелиный, лецитин.

Состав оболочки желатиновой капсулы: желатин, глицерин, метилпарагидроксибензоат Е-218, пропилпарагидроксибензоат Е-216, вода очищенная, титана диоксид Е-171, краситель: красный очаровательный Е-129.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые продолговатой формы со швом, упругие, красного цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Поливитамины в комбинации с микро-элементами.

Код АТХ А11АА04.

Показания к применению

Как поливитаминный антиоксидантный препарат Антиоксикапс с селеном показан:

- для профилактики и лечения витаминной (С, Е и А) недостаточности и недостаточности селена;
- для повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям;
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- при несбалансированном и неполноценном питании;
- в период восстановления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных.

Способ применения и дозы

Антиоксикапс с селеном принимают после еды, запивая водой.

С профилактической целью и в комплексном лечении препарат рекомендуется назначать детям с 14 лет и взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 1-3 месяцев.

Дозы Антиоксикапса с селеном и продолжительность его применения устанавливает врач в зависимости от характера и степени выраженности патологии, а также с учетом потребности организма в витаминах А, С и Е.

Побочное действие

Диарея, изменение цвета кожи – появление желтого оттенка, редко: головокружение, боли в суставах. Прием лекарственного средства в больших дозах может привести к появлению боли в животе, возникновению кровоточивости у пациентов с дефицитом витамина К, повышению риска тромбозов у пациентов, принимающих эстрогены, гипероксалурии и увеличению риска образования камней в почках – ок-

салатов, у пациентов с дефицитом Г6ФД повышение риска развития гемолиза, а также к возникновению затуманивания зрения, головокружения, повышенной утомляемости и слабости.

Возможны аллергические реакции к отдельным компонентам препарата, исчезающие после его отмены.

При применении препарата в рекомендуемых дозах побочных эффектов не наблюдалось.

Применение во время беременности и лактации

Применение Антиоксикапса с селеном противопоказано при беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Кортикостероидные препараты, антибиотики тетрациклиновой группы, а также этанол и этанолсодержащие препараты при совместном применении снижают терапевтический эффект провитамина А.

Токоферол может повышать эффективность противосудорожных средств у больных эпилепсией с повышенным содержанием в крови продуктов перекисного окисления липидов, а также витамина А и Д.

Всасывание кислоты аскорбиновой уменьшается при одновременном применении оральных контрацептивов. Витамин С повышает всасывание железа, увеличивает риск возникновения кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия.

Холестирамин, орлистат снижают всасывание витаминов А и Е.

Передозировка

При передозировке возможно появление запаха чеснока в выдыхаемом воздухе. В этом случае препарат следует отменить.

Особые указания

Применять с осторожностью у пациентов с гипероксалурией.

Противопоказания

Противопоказанием к применению препарата являются:

- гипervитаминоз А и Е;
- беременность и период лактации;
- детский возраст (до 14 лет);
- гиперчувствительность.

Влияние на способность к вождению автомобиля, работу с техникой

Не влияет.

Форма выпуска

Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C.

Хранят в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Название и адрес изготовителя

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26
тел./факс (+ 37517) 344-18-66
e-mail: info@mic.by, www.mic.by

