

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

### ЭВКАМИНТ

**Торговое название:** Эвкаминт

**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав:** одна капсула содержит: масла мяты перечной – 100 мг, эвкалиптового масла – 100 мг.

**Вспомогательные вещества:** кремния диоксид коллоидный, полисорбат 80, подсолнечное масло.

**Состав оболочки капсулы:** желатин, глицерин, вода очищенная, натрия бензоат Е-211.

**Описание.** Капсулы мягкие желатиновые овальной формы, светло-желтого цвета, прозрачные, упругие, со швом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

Код АТХ R05X.

#### **Показания к применению**

Лекарственное средство Эвкаминт применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (синуситов, трахеитов, фарингитов, острого и хронического бронхита).

#### **Способ применения и дозы**

*Взрослым и детям старше 12 лет*

По 1 капсуле 4-5 раз в сутки.

Капсулы следует принимать до еды, запивая небольшим количеством воды (1/4 стакана) комнатной температуры.

Длительность приема определяется индивидуально с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Если после 7 дней приема симптомы сохраняются, рекомендуется обратиться к врачу.

#### **Особые указания**

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 12 лет не рекомендуется.

Капсулы следует проглатывать целиком, не раскусывать и не разжевывать во рту, чтобы предотвратить преждевременное высвобождение масла мяты перечной, которое может оказывать местно-раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта и пищевода. У пациентов, страдающих от изжоги или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, прием масла мяты перечной может привести к обострению симптомов заболевания. Лечение у таких пациентов должно быть прекращено.

Если во время приема препарата состояние ухудшилось (развилась одышка, повысилась температура, появилась мокрота с примесью гноя или крови, ухудшилось общее самочувствие), необходимо немедленно обратиться к врачу.


Пациенты с респираторными заболеваниями с признаками гиперчувствительности дыхательных путей могут принимать препарат только после консультации с врачом.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Эвкалиптовое масло стимулирует ферментную систему печени, участвующую в детоксикационных процессах. Поэтому фармакологические эффекты других лекарств могут ослабевать и/или возрастать.

Одновременный прием лекарственного средства Эвкаминт с приемом пищи или антацидами может привести к более быстрому высвобождению содержимого капсулы и вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.

Одновременный прием с лекарственными средствами, уменьшающими кислотность желудочного сока, такими как блокаторы H<sub>2</sub> гистаминовых рецепторов или ингибиторы протонной помпы также может привести к быстрому высвобождению содержимого капсулы.



### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, отек лица, спазм бронхов), одышка, сухость во рту, гастралгия, боль в животе, диспепсия, повышение подвижности камней в почках и желчном пузыре.

Масло мяты перечной при пероральном приеме может вызывать следующие побочные реакции: запах ментола в моче и стуле; дизурические расстройства. Сообщается об аллергических реакциях на ментол, которые могут сопровождаться головной болью, брадикардией, мышечной дрожью, атаксией, анафилактическим шоком и эритематозной кожной сыпью. Имеются сообщения об изжоге, перианальном зуде, нечеткости зрения, тошноте и рвоте. Частота всех перечисленных побочных эффектов не известна.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо обратиться к врачу.

### **Передозировка**

#### **Случайная передозировка масла эвкалипта**

Случайная передозировка может вызвать рвоту, диарею, тошноту, потерю сознания, апноэ, тахипноэ, атаксию и другие неврологические нарушения, расширение или сужение зрачков.

#### **Случайная передозировка масла мяты перечной**

Случайная передозировка может привести к тошноте, диарее, ректальным язвам, эпилептическим судорогам, потере сознания, апноэ, нарушению сердечного ритма, атаксии и другим неврологическим нарушениям, которые, вероятно, связаны с наличием ментола.

В случае передозировки необходимо провести промывание желудка. Лечение симптоматическое.

### **Противопоказания**

- воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и билиарной системы;
- заболевания печени тяжелой степени;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гиперчувствительность к действующим веществам и 1,8-цинеолу;
- дети с наличием судорог (фебрильных и нефебрильных) в анамнезе;
- холангит, ахлоргидрия;
- желчекаменная и мочекаменная болезни;
- беременность и период кормления грудью;
- детский возраст до 12 лет.


### **Беременность и период грудного вскармливания**

В связи с отсутствием достаточных данных применять препарат во время беременности и лактации не рекомендуется.

**Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой**  
Не влияет.

**Форма выпуска**

Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, светло-желтого цвета; по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке.



**Условия хранения**

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.  
Хранят в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,  
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26  
тел./факс (+ 37517) 344-18-66  
e-mail: [info@mic.by](mailto:info@mic.by), [www.mic.by](http://www.mic.by)