

Листок - вкладыш

Трависил, сироп без сахара Travisil sugar free

Общая характеристика. Описание. Раствор зеленого цвета с растительно-ментоловым запахом. Допускается в процессе хранения образование осадка, исчезающего при встряхивании.

Состав. 5 мл сиропа содержат:

Активные компоненты:

экстракт сухой юстиции адатоды листьев, (20:1)	5 мг
(Justicia adhatoda L., сем. акантовых - Acanthaceae Juss.)	
экстракт сухой перца длинного плодов, (20:1)	25 мг
(Piper longum Blume, сем. перцевых- Piperaceae C.A. Agardh)	
экстракт сухой перца черного плодов, (20:1)	20 мг
(Piper nigrum Blume, сем. перцевых- Piperaceae C.A. Agardh)	
экстракт сухой имбиря лекарственного корневища, (20:1)	12 мг
(Zingiber officinale Roscoe, сем. имбирных - Zingiberaceae Lindl.)	
экстракт сухой солодки голой корней, (20:1)	10 мг
(Glycyrrhiza glabra L., сем. бобовых - Fabaceae Lindl.)	
экстракт сухой эмблики лекарственной плодов, (20:1)	16 мг
(Embllica officinalis Gaertn., сем. молочайных - Euphorbiaceae Juss)	
экстракт сухой куркумы длинной корневища, (20:1)	15 мг
(Curcuma longa L., сем. имбирных - Zingiberaceae Lindl.)	
экстракт сухой акации катеху коры, (20:1)	17 мг
(Acacia catechu (L. f.) Willd., сем бобовых - Fabaceae Lindl.)	
экстракт сухой фенхеля обыкновенного плодов, (20:1)	18 мг
(Foeniculum vulgare Mill., сем. сельдерейных - Apiaceae Lindl.)	
экстракт сухой базилика священного листьев, корней, семян, (20:1)	5 мг
(Ocimum sanctum L., сем. яснотковых - Lamiaceae Lindl.)	
экстракт сухой терминалии чебулы плодов, (20:1)	5 мг
(Terminalia chebula (Gaertn.) Retz., сем. комбретовых - Combretaceae R. Br)	
экстракт сухой терминалии беллерика плодов, (20:1)	5 мг
(Terminalia bellerica (Gaertn.) Roxb., сем. комбретовых - Combretaceae R. Br)	
экстракт сухой альпинии лекарственной корневища, (20:1)	20 мг
(Alpinia officinarum Hance, сем имбирных - Zingiberaceae Lindl.)	
экстракт сухой абрюса молитвенного листьев, (20:1)	20 мг
(Abrus precatorius L., сем. бобовых - Fabaceae Lindl.)	

Вспомогательные вещества: сорбитол 70 % раствор (E 420), ментол, натрия метилпарагидроксибензоат (натрия метилпарабен) E 218, натрия пропилпарагидроксибензоат (натрия пропилпарабен) E 216, вода очищенная.

Примечание

Органические растворители не используются.

Форма выпуска. Сироп без сахара.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства в комбинации.

Показания к применению.

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (ларингит, фарингит, трахеит).

Способ применения и дозировка.

Внутрь, запивая небольшим количеством воды:

Взрослым – по 5-10 мл 3 раза в день.

Курс лечения 2-3 недели.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Применение у детей. Безопасность и эффективность применения препарата Трависил у детей и подростков до 18 лет не установлены. Ввиду недостатка данных не рекомендовано принимать препарат детям и подросткам до 18 лет.

Пациенты с нарушением функции почек. Лекарственное средство не рекомендовано пациентам с заболеваниями почек (см. раздел «Меры предосторожности»).

Пациенты с нарушением функции печени. Лекарственное средство противопоказано пациентам с заболеваниями печени (см. раздел «Противопоказания»).

Пациенты пожилого возраста. Информация отсутствует.

Сироп рекомендуется дозировать при помощи прилагаемого дозирующего устройства.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Возможно развитие расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта: дискомфорт, боли в брюшной полости, сухость во рту, отрыжка, диспепсия, тошнота, метеоризм. При возникновении побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Детский возраст (до 18 лет), беременность, период лактации. Заболевания печени, желчнокаменная болезнь, обструкция желчевыводящих путей, холангит.

Передозировка.

Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.


Меры предосторожности.

В связи с содержанием сorbitola прием сиропа не рекомендован пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы. В связи с содержанием сorbitola сироп может оказывать слабительное действие.

С осторожностью применять лекарственное средство у пациентов с повышенным риском кровотечений.

Препараты солодки не рекомендуется принимать пациентам с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипокалиемией, заболеваниями почек и печени, так как данные пациенты более предрасположены к неблагоприятным последствиям приема солодки.

Пациентам, принимающим корень солодки, не следует принимать другие средства, содержащие солодку, из-за риска развития серьезных побочных реакций, таких как, задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма.



Лекарственное средство не рекомендуется применять при беременности и в период лактации в связи с отсутствием клинических данных.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развивается нарушение дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Перед употреблением флакон следует хорошо встряхнуть.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми лекарственными средствами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты. Корень солодки, входящий в состав лекарственного средства, может препятствовать действию антигипертензивных средств.

При одновременном применении с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, кортикоステроидами и слабительными средствами возможно усиление гипокалиемии. Совместный прием с данными средствами не рекомендован.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения и срок годности.

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.

Вскрытый флакон хранить в холодильнике при температуре от 2 °C до 8 °C не более 10 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска.

Без рецепта врача.

Упаковка.

Сироп по 100 мл в бутылки из полиэтилентерефталата с завинчивающимися пробками из полиэтилена низкого давления. Бутылки вместе с листком-вкладышем и дозирующим устройством упаковывают в картонную пачку.

Информация о производителях.

Произведено.

«Плетхико Фармасьютикалз» Лтд., Индия.

Расфасовано и упаковано.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

