

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ СОГЛАСОВАНО
(информация для пациента)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

№ _____ от _____ г. № _____

№ _____ от _____ г.

**Череды трава,
измельченное сырье 50 г**
Bidentis herba

Общая характеристика:

кусочки листьев, стеблей, бутонов и цветков, проходящие сквозь сито (5600). Цвет зеленый, буровато-зеленый или зеленовато-фиолетовый с грязно-желтыми вкраплениями. Запах слабый.

Череды трава содержит флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, эфирное масло, каротиноиды, аскорбиновую кислоту, полисахариды, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие лекарственные средства для применения в дерматологии.

Фармакологические свойства.

Лекарственное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным, диуретическим, потогонным и противомикробным действием.

Показания к применению.

Внутрь: в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Наружно: экссудативный диатез, пиодермия.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 10 г (3 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/4-1/3 стакана 2-3 раза в день после еды.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству. При применении внутрь – беременность; период лактации; детский возраст до 12 лет; заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца и/или почек).

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей. В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 12 лет не рекомендуется.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует.

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Не изучалось.


Условия и сроки хранения. В защищенном от влаги и света месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 3 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».



Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.
Тел. 8 (0152) 68-45-79.
Сайт: www.biotest.by

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗАРАДООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь