


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



**ИНСТРУКЦИЯ**

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства  
**ЛЕЙАРГУНАЛ**

**Торговое название:** Лейаргунал.

**Международное непатентованное название:** нет.

**Форма выпуска:** порошок для приготовления раствора для внутреннего применения.

**Описание:** смесь порошка и мелких гранул белого или почти белого цвета.

**Состав:** один пакет содержит:

*действующие вещества:* L-лейцина – 1000,0 мг, L-аргинина гидрохлорида – 600,0 мг, рибоксина – 400,0 мг.

*вспомогательные вещества:* метилцеллюлоза, кальция стеарат.

**Фармакотерапевтическая группа:** Иммуномодуляторы, адаптогены.

**Код АТС:** L03AX

**Фармакологические свойства**

Иммуностимулирующее, иммуномодулирующее, адаптогенное и анаболическое действие. Стимулирует гуморальный иммунитет и образование естественных киллеров, обеспечивая повышение неспецифической резистентности организма. Одновременно оказывает адаптогенное и анаболическое действие за счет комплексного действия инозина с L-аргинином и L-лейцином. Это способствует повышению устойчивости организма к бактериям, вирусам и негативным проявлениям стресса, ускорению регенераторных процессов.

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии следующих состояний:

- хронический периодонтит;
- у пациентов с клиникой затяжных пневмоний и хронических бронхитов.

**Способ применения и дозы**

Внутрь по 1 пакету в сутки после еды, содержимое пакета растворяют при помешивании в 1 стакане теплой кипяченой воды. Курс – 21 день. При необходимости повторные курсы приема через 3-6 месяцев.

**Побочное действие**

Редко при применении Лейаргунала может повышаться концентрация мочевой кислоты в крови и развиваться обострение подагры. Головная боль.

Возможны аллергические реакции в виде крапивницы, кожного зуда, гиперемии кожи (требуется отмена препарата).

*В случае возникновения вышеперечисленных побочных реакций или побочных реакций, не указанных в данной инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, необходимо обратиться к врачу.*

**Противопоказания**

Постинфарктный период, подагра, гиперурикемия, беременность, период лактации, почечная недостаточность, при активном проявлении заболеваний вирусом простого герпеса, шизофрения, детский возраст до 18 лет.

**Передозировка**

При использовании в рекомендуемых дозах как острое, так и хроническое отравление маловероятно.

**Меры предосторожности**

С осторожностью назначают при нарушениях функции почек.

*Применение во время беременности и в период лактации: противопоказано.*

*Не противопоказан лицам, работа которых связана с управлением транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.*

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Усиливает эффекты анаболических стероидов и нестероидных анаболических средств при одновременном применении. Ослабляет бронхолитический эффект теофиллина и психостимулирующее действие кофеина.

**Упаковка**

По 2,016 г в пакеты из материала комбинированного на бумажной и картонной основе. 10 пакетов вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

По рецепту.

---

**Производитель:**  
РУП "Белмедпрепараты",  
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,  
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,  
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

---

