

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



**Кукурузы столбики с рыльцами,
измельченное сырье 25 г или 40 г в пачке
*Zea mays styli cum stigmatis***

Общая характеристика:

нитевидные кусочки, проходящие сквозь сито (5600). Цвет коричневый, коричнево-красный, светло-желтый. Запах слабый, своеобразный.

Кукурузы столбики с рыльцами содержат ситостерол, стигмастерол, витамины К и С, жирные масла, эфирное масло, каротиноиды, сапонины и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые для лечения заболеваний желчевыводящих путей.

Фармакологические свойства. Средство растительного происхождения. Оказывает желчегонное и диуретическое действие, способствует повышению свертываемости крови.

Показания к применению. Внутрь: в комплексной терапии некалькулезного холецистита и дискинезии желчевыводящих путей; в качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 10 г (2-3 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Внутрь взрослые принимают в теплом виде по 1-3 столовые ложки 3-4 раза в день.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие. Аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Гиперчувствительность. Желчнокаменная болезнь, обтурационная желтуха, повышенная свертываемость крови, анорексия, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

Применение во время беременности и кормления грудью. Лекарственное средство не следует принимать во время беременности. В связи с отсутствием достаточных данных не рекомендуется принимать во время кормления грудью.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендуется в связи с отсутствием достаточных данных.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует. В связи с диуретическим действием длительный прием может привести к развитию гипокалиемии. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Нет данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный отвар при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 2 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 25 г или 40 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by