



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
лекарственного средства  
**КСИНАЗОЛ**

информация для пациентов

**Название лекарственного средства:** Ксиназол.

*Международное непатентованное название:* Xylometazoline.

**Описание:** Прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная жидкость.

**Состав:**

1 мл спрея назального содержит:

**активное вещество:** ксилометазолина гидрохлорид 1,00 мг или 0,50 мг;

**вспомогательные вещества:** натрия дигидрофосфат дигидрат, динатрия фосфат дигидрат, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, сорбитол, натрия хлорид, гипромеллоза, вода очищенная.

**Лекарственная форма:** Спрей назальный.

**Фармакотерапевтическая группа:** Деконгестанты и другие средства для местного применения. Симпатомиметики.

**Показания к применению:**

Различные виды ринитов, в том числе, при острых респираторных заболеваниях; аллергический ринит, поллиноз, синусит.

Средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки).

Подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

**Способ применения и дозировка:**

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 впрыскиванию 0,1 % спрея назального Ксиназол в каждый носовой ход 3 раза в сутки.

Детям от 2 до 12 лет следует применять спрей 0,05 % по рекомендации врача и под наблюдением взрослых по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-3 раза в сутки.

Интервал между приемами доз должен составлять 8-10 часов. Не следует применять более 3 раз в сутки. Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

**Побочные действия:**

Критерии частоты возникновения побочных реакций: очень часто (> 1/10); часто (> 1/100, < 1/10); нечасто (> 1/1000, < 1/100); редко (> 1/10000, < 1/1000); очень редко (< 1/10000).

*Со стороны дыхательной системы:*

Часто: легкое кратковременное раздражение в месте применения, жжение или сухость слизистой оболочки носа.

*Со стороны нервной системы:*

часто: головная боль.

*Со стороны ЖКТ:*

часто: тошнота.

*Со стороны органов зрения:*

очень редко: временное ухудшение зрения.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:*

очень редко: сердечная аритмия, учащение пульса.

*Со стороны иммунной системы:*

очень редко: аллергические реакции (сыпь, зуд, ангионевротический отек).

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома, атрофический ринит, сухой ринит, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), трансфеноидальное удаление гипофиза, детский возраст до 2 лет для Ксиназол, спрей назальный 0,05 %, детский возраст до 12 лет для Ксиназол, спрей назальный 0,1 %.

**Передозировка:**

Избыточное применение ксилометазолина или случайное проглатывание могут вызвать следующие симптомы: сильное головокружение, испарина, сильное снижение температуры тела, головная боль, брадикардия, гипертензия, угнетение дыхания, кома и судороги. За гипотензией может последовать гипертензия. Маленькие дети более чувствительны к токсическому действию, чем взрослые.

Требуется симптоматическое лечение под медицинским наблюдением. При этом потребуется наблюдение за пациентом в течение нескольких часов. В случае тяжелой передозировки с остановкой сердца, реанимационные мероприятия следует продолжить по меньшей мере в течение часа.

**Меры предосторожности:**

Не следует применять в непрерывном режиме более 7 дней: продолжительное или чрезмерное использование может вызвать усиленную секрецию слизи и отек слизистой оболочки. Не превышать рекомендованные дозы.

Следует с осторожностью применять у пациентов с повышенной чувствительностью к симпатомиметикам, что проявляется такими симптомами как бессонница, головокружение, тремор, сердечная аритмия и повышенное кровяное давление. Следует применять с осторожностью у пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, синдромом удлиненного интервала QT), гипертиреозом, сахарным диабетом, феохромоцитомой, гиперплазией предстательной железы.

*Если вы страдаете заболеваниями сердца (например, синдромом удлиненного интервала QT), то до начала применения ксилометазолина сообщите об этом своему лечащему врачу!*

**Применение в период беременности и лактации:**

В связи с возможным проявлением системного сосудосуживающего действия не рекомендуется принимать Ксиназол в период беременности.

Поскольку неизвестно проникает ли ксилометазолин в грудное молоко, не рекомендуется принимать Ксиназол в период грудного вскармливания.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами:**

Ксилометазолин в дозировках, превышающих рекомендуемые, может влиять на способность управлять транспортным средством или оборудованием, поскольку возможно развитие системного сосудосуживающего действия.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Системное действие ксилометазолина может усиливаться при одновременном применении с ингибиторами моноаминоксидазы и три- или тетрациклическими антидепрессантами, особенно в случае передозировки ксилометазолина. Не рекомендуется применять Ксиназол пациентам, получающим ингибиторы моноаминоксидазы или получавшим их в течение 2 недель, предшествующих началу применения Ксиназола.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.

*Хранить в недоступном для детей месте.*

**Срок годности:** 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска:** Без рецепта врача.

**Упаковка:** По 10 мл или по 25 мл во флаконе полиэтиленовом, укупоренном насадкой-распылителем с защитным колпачком, с инструкцией по применению в пачке картонной.

**Производитель:**

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62 Б, тел.: +375 (212) 36-47-77, тел./факс: +375 (212) 36-37-06, [www.rubikon.by](http://www.rubikon.by), e-mail: [secretar@rubikon.by](mailto:secretar@rubikon.by)

