



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)  
лекарственного средства  
**ЧЕРЕДЫ ТРАВА**  
(*BIDENTIS HERBA*)

*Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.*

*Сохраняйте этот листок – вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Торговое название.** Череды трава.

**Международное непатентованное название (МНН).** Отсутствует.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Состав.** Череды трава, 50,0 г.

**Описание.** Цвет зеленый, буровато-зеленый или зеленовато-фиолетовый с грязновато-желтыми вкраплениями. Запах слабый. Вкус горьковатый, слегка вяжущий.

Трава череды содержит флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, эфирное масло, каротиноиды, аскорбиновую кислоту, полисахариды, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые в дерматологии.

**Код ATX.** D11AX.

**Фармакологические свойства.** Лекарственное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным, диуретическим, потогонным и противомикробным действием.

**Показания к применению:**



*Внутрь:*

- в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

*Наружно:*

- экссудативный диатез, пиодермия.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** 10 г (3 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре, процеживают. Оставшееся сырьё отжимают. Объём полученного настоя доводят кипячёной водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по ¼-1/3 стакана 2-3 раза в день после еды.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

**Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.**

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к лекарственному средству. При применении внутрь – беременность; период лактации; детский возраст до 12 лет; заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца и/или почек).

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Информация отсутствует.

**Меры предосторожности.** Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Применение в период беременности и кормления грудью.** В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и



лактации не рекомендуется.

**Применение у детей.** В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 12 лет не рекомендуется.

**Влияние на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами.** Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Условия хранения.** В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °C до 15 °C) не более 2 суток.

**Условия отпуска из аптек.** Отпускают без рецепта врача.

**Срок годности.** 3 года.

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

**Упаковка.** В пакеты бумажные по 50,0 г (первичная упаковка). Пакет бумажный вместе с листком-вкладышем помещают в пачку (вторичная упаковка).

**Производитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, 223043, Минская область, Минский район, Папернянский с/с, д. Цнянка, ул. Армейская, д. 8, ком. 7. Тел. (017) 500 33 01, тел./факс (017) 500 33 46.