


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



**Сенны листья,
порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке**
Sennae folium

Общая характеристика:

кусочки хрупких листочков (редко бутонов, цветков, плодов, черешков) различной формы, проходящие сквозь сито (2000). Цвет порошка серовато-зеленый, желтовато-зеленый или коричневатозеленый. Возможны желтые вкрапления.

Сенны листья содержат гидроксиантраценовые гликозиды (алоэ-эмодин, сеннозиды А и В), растительные слизи и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах.

Фармакотерапевтическая группа. Слабительные средства контактного действия.

Фармакологические свойства.

Лекарственное средство растительного происхождения, оказывающее слабительное действие. Лечебный эффект развивается через 8-12 часов после приема препарата в зависимости от времени, необходимого для осуществления транспорта в толстую кишку и метаболизма в активное соединение.

Показания к применению.

Кратковременное применение при случайных запорах.

Способ применения и дозы. 1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают до полного охлаждения. Фильтр-пакет отжимают.

Свежеприготовленное водное извлечение (чай) принимать внутрь по 1 стакану на ночь.

Детям старше 12 лет, по рекомендации врача, в зависимости от возраста принимать внутрь по 1/4-1/2 стакана на ночь.

Рекомендовано принимать наименьшую дозу, достаточную для достижения необходимого эффекта, не более 2-3 раз в неделю. Не рекомендовано применять лекарственное средство более одной недели.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства. Использование лекарственного средства более 1-2 недель, требует медицинского наблюдения.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. Спастический запор, спастический колит, стеноз и атония кишечника, кишечная непроходимость, боли в животе неясного генеза, ущемленная грыжа, воспалительные заболевания брюшной полости (язвенный колит, болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, энтерит, колит, аппендицит, перитонит), прободная язва, желудочно-кишечные и маточные кровотечения, нарушения водно-электролитного обмена, нарушение функции почек, цистит, панкреатит, проктит и геморрой в фазе обострения, трещины прямой кишки.

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей. В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 12 лет не рекомендуется. Перед применением у детей старше 12 лет необходима консультация врача.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции (зуд, крапивница, сыпь), дискомфорт, боли в животе спастического характера, диспепсия, метеоризм, тенезмы, жидкий водянистый стул. В случае передозировки могут развиваться нарушения водно-электролитного баланса, альбуминурия, гематурия. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Основные симптомы передозировки - боль в животе и сильная диарея с последующей потерей жидкости и электролитов. Диарея может привести к гипокалиемии, сердечным расстройствам и мышечной слабости, особенно при сопутствующем приеме сердечных гликозидов, диуретиков, кортикостероидов или препаратов корня солодки. Лечение передозировки должно включать возмещение потери жидкости и электролитов. Следует контролировать электролиты крови, особенно калий, что особенно важно у лиц пожилого возраста. При длительном применении больших доз может развиваться токсический гепатит.

Меры предосторожности. Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом. Во избежание привыкания, препараты сенны следует чередовать с другими слабительными средствами. Лекарственное средство противопоказано пациентам с нарушениями функции почек из-за возможных электролитных нарушений. Пациенты, принимающие сердечные гликозиды, антиаритмические средства, лекарственные средства, вызывающие удлинение интервала QT, диуретики, кортикостероиды или корень солодки перед приемом лекарственного средства должны проконсультироваться с врачом. Лекарственное средство не должно приниматься более 2 недель в связи с

риском развития электролитного дисбаланса. Длительный прием может привести к дисфункции толстой кишки (атонии) и усугублению запора.

После приема лекарственного средства моча может приобретать желто-коричневый или красно-коричневый цвет.

При длительном применении может развиваться пигментация слизистой оболочки толстой кишки (псевдомеланоз), которая обычно проходит после прекращения приема лекарственного средства. Кровотечение из прямой кишки или отсутствие дефекации после приема слабительного средства может указывать на наличие серьезного заболевания.

Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственного средства или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Ускорение транзита кишечного содержимого может привести к снижению всасывания принимаемых внутрь лекарственных средств. Электролитный дисбаланс (гипокалиемия) может влиять на эффекты сердечных гликозидов, антиаритмических средств (например, хинидина) и лекарственных средств, вызывающих удлинение интервала QT. Одновременное применение диуретиков, кортикостероидов, корня солодки повышает вероятность развития электролитных нарушений.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Срок годности. 1,5 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пакете бумажном с последующим вложением в пачку картонную. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8(0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

