


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ЛИСТОК – В КЛАДЫШ по медицинскому применению лекарственного средства **Диаротокан-Ферейн** экстракт жидкий для местного применения

**Название лекарственного средства** Диаротокан-Ферейн.

**Название лекарственной формы** Экстракт жидкий для местного применения.

**Общая характеристика** Прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

### **Состав лекарственного средства**

Экстракт жидкий из смеси (2:1:1) ромашки аптечной цветков, календулы лекарственной цветков, тысячелистника обыкновенного травы (DER: 1:3,6), экстрагент – этиловый спирт 70 %.

Лекарственное средство содержит не менее 65 % спирта этилового.

**Фармакотерапевтическая группа** Прочие средства для местного применения при заболеваниях полости рта.

### **Фармакологические свойства**

Комбинированное средство на основе компонентов растительного происхождения. Биологически активные вещества, входящие в состав лекарственного средства, обладают местным противовоспалительным действием.

### **Показания к применению**

В стоматологии в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

### **Способ применения и дозировка**

*В стоматологии применяют местно.*

Перед применением 1 чайную ложку (5 мл) лекарственного средства разводят в стакане теплой кипяченой воды. При стоматитах и других заболеваниях слизистой оболочки полости рта назначают полоскания (1-2 минут) или аппликации лекарственного средства (15-20 минут) 2-3 раза в день в течение 2-5 дней. При лечении маргинального периодонта, после удаления зубного камня и кюретажа зубодесневых и костных карманов вводят в карманы тонкие турунды с раствором лекарственного средства на 20 минут. Процедуру проводят ежедневно или через день (4-6 раз).

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости лекарственного средства.

### **Побочное действие**

Возможны реакции гиперчувствительности, включая тяжелые аллергические реакции после контакта лекарственного средства со слизистыми оболочками (нарушение дыхания, ангионевротический отек, сосудистый коллапс, анафилактический шок). Частота не известна. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема;

- период беременности и лактации;
- детский возраст до 12 лет.

### **Передозировка**

Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае приема внутрь возможно развитие симптомов алкогольной интоксикации. Лечение симптоматическое.

### **Меры предосторожности**

Лекарственное средство содержит не менее 65 % этилового спирта, то есть 2565 мг на разовую дозу 5 мл, что равно 65 мл пива, 27 мл вина на дозу. Не рекомендовано применение лекарственного средства пациентам с алкоголизмом, заболеваниями печени, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

Из-за содержания этилового спирта не рекомендуется применять средство в течение длительного времени.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

### **Применение у детей**

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта лекарственное средство не рекомендовано для применения у детей в возрасте до 12 лет.

### **Применение во время беременности и кормления грудью**

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта лекарственное средство не рекомендовано для применения женщинам во время беременности и кормления грудью.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! При местном применении может повлиять на результаты тестов по оценке содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. При случайном приеме внутрь необходимо отказаться от вождения автотранспортом и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При местном применении информация о взаимодействиях отсутствует. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Условия и срок хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Упаковка**

50 мл во флаконы, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчивающимися с листком-вкладышем в упаковке № 1.

### **Информация о производителе**

СОАО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,  
тел. + 375 17 222-97-73, + 375 17 213-12-58; тел./факс + 375 17 222-92-18

E-mail: office@ferane.by.